

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРИРОДЫ РОССИИ



ПТИЦЫ



ОПИСАНИЯ И ЦВЕТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ВСЕХ ВИДОВ ПЕРНАТЫХ
НАШЕЙ СТРАНЫ





**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ПРИРОДЫ
РОССИИ**

**РЮРИК БЁМЕ
ВЛАДИМИР ДИНЕЦ
ВЛАДИМИР ФЛИНТ
АЛЕКСАНДР ЧЕРЕНКОВ**

ПТИЦЫ

**под общей редакцией
Владимира Флинта**

**Издание второе,
дополненное и переработанное**

Москва



1998

Редактор серии
доктор биологических наук
кандидат географических наук
Александр Минин

Художественное оформление серии
Григорий Бойко, Виктор Монетов

Научный редактор
Евгений Ротшильд

Иллюстрации
ЮЛИЙ КОСТИН
СЕРГЕЙ КОСТИН

Графика
АРТЕМ ЗУБКОВ

**R.BOEME
A.CHERENKOV
V.DINEZ
V.FLINT**

BIRDS OF RUSSIA

(guide)

**Chief-editor
V.Flint**

Second edition

Moscow



1998

ББК 28.693.35

Д 46

Бёме Р.Л., Динец В.Л., Флинт В.Е., Черенков А.Е.
Птицы. Энциклопедия природы России (под общей
ред. В.Е. Флинта). Изд. 2-е, дополненное и перерабо-
танное.—М.: 1998.— 432 с.; 56 цв. илл.

В популярной форме авторы рассказывают обо
всех видах птиц, обитающих на территории России.

Для каждого вида приводятся важнейшие опреде-
лительные признаки, сведения по биологии, а также
карты гнездовых ареалов и основных мест зимовки на
территории страны.

Книга содержит 56 цветных таблиц с изображени-
ем большинства российских пернатых.

Издание адресовано самому широкому кругу лю-
бителей природы и рекомендуется в качестве учебно-
справочного пособия.

ISBN 5-87484-045-1

Д 2404010000 - 047
ОШ4(03) - 98

ISBN 5-87484-045-1

© ABF, 1998

Предисловие ко второму изданию

Из всех обитателей планеты именно птицы символизируют Свободу. Наверное потому, что дается нам она не легче, чем способность летать. А они, от крошки коралка до могучего беркута, делают это с такой легкостью, что кажется и надо-то совсем немного... Но наши попытки неуклюжи, и трагичны, увы, нередко. Видимо недостойны мы этой чести - так вот запросто оторваться от земли, а может быть недостойны и самой Свободы? Как распорядились бы мы ею? Научиться бы сперва пользоваться свободой мечтать! Не о низком, суетном, корыстном - о высоком, о крылатом. Не зря ведь издревле на Руси восхищение и любовь звались птичьими именами: сокол, голубь, пава, лебедушка, ласточка, горлянка...

Существовая по тем же законам, что и другие животные - добывая пищу, защищая себя и семью - птицы остаются ещё и самыми неагрессивными, по отношению к человеку. Разве что самооборона да воодражение Хитрика могут заставить их пролить нашу кровь. Наоборот, поют соловьи влюбленным, да множат нам неблагодарный вид нейтральные аисты.

Природа обращается к нам их голосами - ведь редко кому довелось услышать дикого зверя, а вот птиц - каждому. В лютую стужу полон лес синичьим посвистом, в знойный полдень звенит жаворонком поле, да и гол городского дня предваряется бодрой перекличкой: "Живы мы, живы. Не помни ни рогаток ваших, ни силков, ни дробы. Живите, живите и нам жить да жить..."

Спокойных вам гнезд, птицы России. Удачи вам и счастливых открытий, любители птиц.

Директор Издательства
Редактор серии

Александр Абалиц
Александр Минин

Авторы выражают благодарность орнитологам В.Бабенко, Р.Йозефу, Е.Коблику, А.Мосалову, Ю.Морозову, И.Титову, В.Фридману и особенно П.Томковичу за помощь в сборе информации для данной книги. Иллюстрации выполнены Ю.Костиным при участии М.Дементьева, Н.Диевой, В.Динца, С.Костина, Д.Лушиной, А.Мосалова и Е.Строевой.

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя	3
Наблюдение птиц в природе	17
КЛАСС ПТИЦЫ	23
1. ОТРЯД ГАГАРООБРАЗНЫЕ	27
1.1. <i>Семейство Гагаровые</i>	28
1.1.1. Род Гагары	28
2. ОТРЯД ПОГАНКООБРАЗНЫЕ	31
2.2. <i>Семейство Поганковые</i>	32
2.2.1. Род Поганки	32
2.1.2. Род Малые поганки	34
3. ОТРЯД БУРЕВЕСТНИКООБРАЗНЫЕ	36
3.1. <i>Семейство Альбатросовые</i>	37
3.1.1. Род Альбатросы	37
3.2. <i>Семейство Буревестниковые</i>	39
3.2.1. Род Глупыши	39
3.2.2. Род Буревестники	40
3.2.3. Род Пестрые буревестники	42
3.2.4. Род Тайфунники	42
3.3. <i>Семейство Качурковые</i>	44
3.3.1. Род Качурки	44
4. ОТРЯД ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ	47
4.1. <i>Семейство Пеликановые</i>	48
4.1.1. Род Пеликаны	48
4.2. <i>Семейство Баклановые</i>	49
4.2.1. Род Бакланы	50
4.3. <i>Семейство Олушевые</i>	52
4.3.1. Род Олуши	53
4.4. <i>Семейство Фрегатовые</i>	53
5. ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ	54
5.1. <i>Семейство Аистовые</i>	55
5.1.1. Род Аисты	55

5.2. Семейство Цаплевые	56
5.2.1. Род Цапли	57
5.2.2. Род Белые цапли	58
5.2.3. Род Египетские цапли	60
5.2.4. Род Косматые цапли	61
5.2.5. Род Кvakвы	61
5.2.6. Род Зеленые кvakвы	62
5.2.7. Род Выпи	63
5.2.8. Род Волчки	64
5.3. Семейство Ибисовые	65
5.3.1. Род Колпицы	65
5.3.2. Род Каравайки	66
5.3.3. Род Японские ибисы	66
5.3.4. Род Белые ибисы	67
5.4. Семейство Фламинговые	67
5.4.1. Род Фламинго	67
6. ОТРЯД ГУСЕОБРАЗНЫЕ	69
6.1. Семейство Утиные	70
6.1.1. Род Лебеди	70
6.1.2. Род Гуси	73
6.1.3. Род Казарки	77
6.1.4. Род Красные утки	80
6.1.5. Род Речные утки	82
6.1.6. Род Красноносые нырки	88
6.1.7. Род Нырки	89
6.1.8. Род Гаги	92
6.1.9. Род Турпаны	94
6.1.10. Род Каменушки	96
6.1.11. Род Морянки	97
6.1.12. Род Гоголи	98
6.1.13. Род Мандаринки	99
6.1.14. Род Крохали	100
6.1.15. Род Савки	102
7. ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ	104
7.1. Семейство Ястребиные	105
7.1.1. Род Скопы	106
7.1.2. Род Настоящие орлы	106
7.1.3. Род Ястребиные орлы	110
7.1.4. Род Хохлатые орлы	110
7.1.5. Род Канюки	111
7.1.6. Род Ястребиные сарычи	113
7.1.7. Род Осоеды	114

7.1.8. Род Орланы	116
7.1.9. Род Коршуны	118
7.1.10. Род Ястребы	119
7.1.11. Род Змееяды	122
7.1.12. Род Луни	123
7.1.13. Род Бородачи	125
7.1.14. Род Стервятники	126
7.1.15. Род Грифы	127
7.1.16. Род Сипы	127
7.2. Семейство Соколиные	128
7.2.1. Род Соколы	129
8. ОТРЯД КУРООБРАЗНЫЕ	134
8.1. Семейство Тетеревиные	135
8.1.1. Род Рябчики	135
8.1.2. Род Дикуши	136
8.1.3. Род Тетерева	136
8.1.4. Род Глухари	138
8.1.5. Род Белые куропатки	140
8.2. Семейство Фазановые	142
8.2.1. Род Перепела	142
8.2.2. Род Серые куропатки	143
8.2.3. Род Кеклики	144
8.2.4. Род Улары	145
8.2.5. Род Фазаны	146
9. ОТРЯД ЖУРАВЛЕОБРАЗНЫЕ	147
9.1. Семейство Журавлиные	148
9.1.1. Род Журавли	148
9.1.2. Род Журавли-красавки	151
9.2. Семейство Пастушковые	152
9.2.1. Род Коростели	152
9.2.2. Род Пастушки	153
9.2.3. Род Погоныши	153
9.2.4. Род Камышницы	156
9.2.5. Род Рогатые камышницы	156
9.2.6. Род Белогрудые пастушки	157
9.2.7. Род Султанки	157
9.2.8. Род Лысухи	158
9.3. Семейство Трехперстковые	158
9.3.1. Род Трехперстки	158
9.4. Семейство Дрофиные	159
9.4.1. Род Дрофы	159
9.4.2. Род Дрофы-красотки	160

10. ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ	161
10.1. <i>Семейство Авдотковые</i>	162
10.1.1. Род Авдотки.....	162
10.2. <i>Семейство Ржанковые</i>	162
10.2.1. Род Чибисы.....	163
10.2.2. Род Ржанки.....	164
10.2.3. Род Зуйки.....	166
10.3. <i>Семейство Шилоклювковые</i>	170
10.3.1. Род Шилоклювки.....	171
10.3.2. Род Ходулочники.....	171
10.4. <i>Семейство Кулики-сороки</i>	171
10.4.1. Род Кулики-сороки.....	172
10.5. <i>Семейство Плавунчиковые</i>	172
10.5.1. Род Плавунчики.....	173
10.6. <i>Семейство Бекасовые</i>	173
10.6.1. Род Камнешарки.....	174
10.6.2. Род Песочники.....	175
10.6.3. Род Желтозобики.....	182
10.6.4. Род Грязовики.....	183
10.6.5. Род Турухтаны.....	184
10.6.6. Род Улиты.....	184
10.6.7. Род Бекасовидные веретенники.....	190
10.6.8. Род Веретенники.....	191
10.6.9. Род Кроншнепы.....	192
10.6.10. Род Бекасы.....	194
10.6.11. Род Гаршнепы.....	197
10.6.12. Род Вальдшнепы.....	197
10.7. <i>Семейство Цветные бекасы</i>	198
10.8. <i>Семейство Якановые</i>	198
10.9. <i>Семейство Тиркушковые</i>	199
10.9.1. Род Тиркушки.....	199
10.10. <i>Семейство Поморниковые</i>	200
10.10.1. Род Поморники.....	201
10.10.2. Род Большие поморники.....	202
10.11. <i>Семейство Чайковые</i>	203
10.11.1. Род Чайки.....	204
10.11.2. Род Моевки.....	214
10.11.3. Род Крачки.....	215
10.11.4. Род Болотные крачки.....	219
10.12. <i>Семейство Чистиковые</i>	220
10.12.1. Род Кайры.....	220
10.12.2. Род Гагарки.....	222
10.12.3. Род Люрики.....	222

10.12.4. Род Чистики	223
10.12.5. Род Пыжики	224
10.12.6. Род Старики	225
10.12.7. Род Алеутские пыжики	226
10.12.8. Род Конюги	227
10.12.9. Род Тупики-носороги	228
10.12.10. Род Тупики	229
10.12.11. Род Топорки	230
11. ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ	231
11.1. <i>Семейство Голубиные</i>	231
11.1.1. Род Голуби	232
11.1.2. Род Зеленые голуби	234
11.1.3. Род Горлицы	235
11.2. <i>Семейство Рябковые</i>	236
11.2.1. Род Саджи	237
11.2.2. Род Рябки	237
12. ОТРЯД КУКУШКООБРАЗНЫЕ	239
12.1. <i>Семейство Кукушковые</i>	240
12.1.1. Род Кукушки	240
12.1.2. Род Широкрылые кукушки	242
13. ОТРЯД СОВООБРАЗНЫЕ	243
13.1. <i>Семейство Совиные</i>	244
13.1.1. Род Филины	244
13.1.2. Род Рыбные совы	245
13.1.3. Род Белые совы	245
13.1.4. Род Неясыти	246
13.1.5. Род Ушастые совы	248
13.1.6. Род Ястребиные совы	249
13.1.7. Род Совки	249
13.1.8. Род Иглоногие совы	251
13.1.9. Род Мохноногие сычи	251
13.1.10. Род Сычи	252
13.1.11. Род Сычики	253
13.2. <i>Семейство Сипуховые</i>	253
13.2.1. Род Сипухи	253
14. ОТРЯД КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ	255
14.1. <i>Семейство Козодоевые</i>	256
14.1.1. Род Козодои	256
15. ОТРЯД СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ	257
15.1. <i>Семейство Стрижиные</i>	257

15.1.1. Род Стрижи	258
15.1.2. Род Колючехвостые стрижи	259
15.2. Семейство Колибри	260
16. ОТРЯД РАКШЕОБРАЗНЫЕ	261
16.1. Семейство Зимородковые	261
16.1.1. Род Голубые зимородки	262
16.1.2. Род Пегие зимородки	262
16.1.3. Род Красноносые зимородки	263
16.2. Семейство Щурковые	263
16.2.1. Род Щурки	264
16.3. Семейство Сизоворонковые	264
16.3.1. Род Сизоворонки	265
16.3.2. Род Широкороты	265
16.4. Семейство Удодовые	266
16.4.1. Род Удоды	266
17. ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ	267
17.1. Семейство Дятловые	267
17.1.1. Род Черные дятлы	268
17.1.2. Род Зеленые дятлы	268
17.1.3. Род Трехпалые дятлы	269
17.1.4. Род Пестрые дятлы	270
17.1.5. Род Вертишейки	273
18. ОТРЯД ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ	275
18.1. Семейство Ласточковые	276
18.1.1. Род Касатки	277
18.1.2. Род Воронки	278
18.1.3. Род Береговые ласточки	279
18.1.4. Род Горные ласточки	280
18.2. Семейство Жаворонковые	280
18.2.1. Род Полевые жаворонки	281
18.2.2. Род Лесные жаворонки	282
18.2.3. Род Малые жаворонки	282
18.2.4. Род Хохлатые жаворонки	283
18.2.5. Род Степные жаворонки	284
18.2.6. Род Рогатые жаворонки	285
18.3. Семейство Трясогузковые	286
18.3.1. Род Коньки	286
18.3.2. Род Трясогузки	290
18.3.3. Род Древесные трясогузки	292
18.4. Семейство Личинкоедовые	293
18.4.1. Род Личинкоеды	293

18.5. Семейство Бюльбюлевые.....	294
18.5.1. Род Короткопалые бюльбюли	294
18.6. Семейство Сорокопутовые.....	295
18.6.1. Род Сорокопуты.....	295
18.7. Семейство Свиристелевые.....	298
18.7.1. Род Свиристели.....	299
18.8. Семейство Иволговые.....	300
18.8.1. Род Иволги	300
18.9. Семейство Трупаловые.....	301
18.10. Семейство Скворцовые.....	301
18.10.1. Род Скворцы	301
18.10.2. Род Майны	304
18.11. Семейство Дронговые.....	304
18.12. Семейство Врановые.....	304
18.12.1. Род Вороны	305
18.12.2. Род Клушицы	309
18.12.3. Род Кедровки	310
18.12.4. Род Кукши.....	311
18.12.5. Род Сойки.....	311
18.12.6. Род Сороки.....	312
18.12.7. Род Голубые сороки.....	313
18.13. Семейство Крапивниковые.....	313
18.13.1. Род Оляпки.....	314
18.13.2. Род Крапивники.....	315
18.14. Семейство Завирушковые	316
18.14.1. Род Завирушки	316
18.15. Семейство Дроздовые	318
18.15.1. Род Дрозды	319
18.15.2. Род Малые дрозды	325
18.15.3. Род Земляные дрозды	326
18.15.4. Род Лесные дрозды	327
18.15.5. Род Каменные дрозды	327
18.15.6. Род Каменки.....	328
18.15.7. Род Чеканы.....	330
18.15.8. Род Горихвостки.....	332
18.15.9. Род Зарянки.....	334
18.15.10. Род Соловьи.....	335
18.15.11. Род Тугайные соловьи.....	338
18.16. Семейство Суторовые.....	339
18.16.1. Род Длиннохвостые синицы.....	339
18.16.2. Род Усатые синицы.....	340
18.16.3. Род Тростниковые сutory	340
18.16.4. Род Сutory	341

18.17. Семейство Славковые.....	341
18.17.1. Род Славки	342
18.17.2. Род Пеночки.....	345
18.17.3. Род Пересмешки	351
18.17.4. Род Камышевки	353
18.17.5. Род Сверчки	357
18.17.6. Род Пестрогрудки.....	360
18.17.7. Род Широкохвостки.....	361
18.17.8. Род Полосатые камышевки	362
18.17.9. Род Короткохвостки.....	362
18.18. Семейство Корольковые	363
18.18.1. Род Корольки	363
18.19. Семейство Мухоловковые	364
18.19.1. Род Серые мухоловки	364
18.19.2. Род Пестрые мухоловки.....	366
18.19.3. Род Синие мухоловки.....	368
18.19.4. Род Райские мухоловки	368
18.20. Семейство Белоглазковые.....	369
18.20.1. Род Белоглазки.....	370
18.21. Семейство Древесницевые.....	370
18.22. Семейство Ремезовые	371
18.22.1. Род Ремезы	371
18.23. Семейство Синицевые	372
18.23.1. Род Синицы.....	372
18.24. Семейство Поползневые.....	376
18.24.1. Род Поползни.....	376
18.25. Семейство Пищуховые	378
18.25.1. Род Пищухи.....	378
18.25.2. Род Стенолазы.....	379
18.26. Семейство Вьюрковые	379
18.26.1. Род Вьюрки	380
18.26.2. Род Щеглы.....	381
18.26.3. Род Чечетки.....	383
18.26.4. Род Канареечные вьюрки	385
18.26.5. Род Горные вьюрки	386
18.26.6. Род Пустынные вьюрки.....	388
18.26.7. Род Чечевицы	388
18.26.8. Род Урагусы.....	390
18.26.9. Род Шуры	391
18.26.10. Род Клесты	391
18.26.11. Род Снегири.	393
18.26.12. Род Дубоносы	394
18.26.13. Род Черноголовые дубоносы	394

18.27. Семейство Ткачиковые	395
18.27.1. Род Воробьи	396
18.27.2. Род Каменные воробьи.....	398
18.27.3. Род Снежные воробьи	399
18.28. Семейство Овсянковые.....	400
18.28.1. Род Овсянки	400
18.28.2. Род Подорожники.....	409
18.28.3. Род Пуночки.....	410
18.28.4. Род Саванные овсянки	411
18.28.5. Род Воробьиные овсянки	412
18.28.6. Род Серощекие овсянки	412
Рекомендуемая литература	414
Указатель русских названий	415
Указатель латинских названий	423

***Светлой памяти Петра Петровича СМОЛИНА,
воспитателя блестящей плеяды российских орнитологов,
посвящается эта книга***

НАБЛЮДЕНИЕ ПТИЦ В ПРИРОДЕ

Боги дали нам птиц, чтобы мы видели каждый день, что такое красота. Но мы редко смотрим в небо, и забываем про красоту и свободу.

Конфуций

Птицы, пожалуй, самые заметные из диких обитателей нашей страны. Звери редко попадают на глаза, а птицы то и дело оказываются на виду, хотя многие стороны их жизни не так-то просто подсмотреть. Этот справочник поможет вам узнать, как называется встреченная в природе птица, а если вы будете часто практиковаться в определении птиц, то скоро будете сразу узнавать по крайней мере многих из них.

В России обитает около 720 видов птиц, и на первый взгляд научиться ориентироваться в этом многообразии почти невозможно. Тем не менее вам хватит одного года, чтобы познакомиться с большинством птиц, встречающихся в вашем районе.

Зимой птиц почти везде мало, а наблюдать за ними легко — птицы часто собираются ближе к человеку, к кормушкам. Есть возможность хорошо рассмотреть их и получить первые навыки в определении. Весной и в первой половине лета, по мере прилета все новых и новых видов, появления густой травы и листьев, задача заметно усложняется. Но зато птицы в это время "одеты" в наиболее характерный и яркий брачный наряд, они очень подвижны, часто попадают на глаза и более строго придерживаются типичных для каждого вида местообитаний. Кроме того, пение и другие звуки, издаваемые птицами, могут очень помочь в оп-

ределении. Поэтому всегда старайтесь запомнить голос птицы — это важный признак вида, хотя, к сожалению, голоса плохо передаются буквами. Многие виды, например, семейства славковых в природе вообще можно различить только по пению.

Наименее благоприятна для наблюдений осень. В это время появляется множество молодых птиц, которые окрашены не так характерно. Да и взрослые часто одевают скромный осенний наряд. Кроме того, именно осенью птиц часто можно встретить в нетипичных для вида районах и местобитаниях. Впрочем, к осени у вас уже будет определенный опыт в определении, так что многих птиц вы сможете просто "узнавать в лицо".

Для определения пользуйтесь цветными таблицами. Просмотрите их перед тем, как отправляться "в поле". Не стоит пытаться сразу зазубрить мелкие отличия близких видов. Постарайтесь сначала запомнить общий облик птиц из разных отрядов и семейств, чтобы при встрече узнавать их "в лицо". Иногда и совсем не родственные птицы похожи друг на друга — например, стрижи на ласточек, журавли на аистов или буревестники на чаек. Но все же их не так уж сложно различить, если присмотреться к пропорциям тела, форме крыльев, хвоста, клюва и ног. Некоторые птицы имеют настолько характерные облик и окраску, что даже после беглого просмотра таблиц с рисунками можно сразу назвать вид — фламинго, угод или, например, сорока. Но в большинстве случаев приходится внимательно вглядываться в детали окраски и строения, чтобы отличить птицу от ее "близких родственников".

Птицы обычно не ждут, пока вы сумеете их подробно рассмотреть. Поэтому постарайтесь сразу запомнить наиболее бросающиеся в глаза детали окраски и строения, манеру поведения птицы. Например: окраска контрастная или однотонная; нет ли ярких пятен на крыльях, груди или хвосте либо темных пестрин на груди и спине; есть ли хохол и какой он формы; какой формы хвост (см. форзац); какой формы клюв (длинный, короткий, прямой или слегка изогнутый); какой формы крылья (широкие или узкие, острые или закругленные, короткие или длинные). Каков характер полета; как птица сидит на ветке или на воде (посадка высокая или низкая, хвост приподнят или опущен).

Иными словами, надо быстро составить как можно более подробный "словесный портрет" птицы, и потом искать со-

ответствующий рисунок на таблицах. Если таких рисунков окажется несколько, постарайтесь поточнее вспомнить детали, прочитайте описания местообитаний и просмотрите карты ареалов. Ареал — территория на которой обитает тот или иной вид животных. Различают гнездовые ареалы — территории, на которых данный вид гнездится, и зимние — на которых птицы проводят зиму.

Некоторые виды, к сожалению, почти не поддаются надежному определению в полевых условиях. В любом случае рекомендуется внимательно прочитать описание рода и всех входящих в него видов.

Напомним, что наиболее близкие виды объединяются в роды, например, серая славка (*Sylvia communis*) и славка-черноголовка (*Sylvia atricapilla*) вместе с другими славками входят в род Славки (*Sylvia*). Близкие роды образуют семейства. Как правило, птицы из одного семейства имеют общие внешние черты, например, все рода семейства Славковых (славки, пеночки, камышевки, сверчки) несколько похожи друг на друга окраской и сложением (Таблицы 47, 48). Наконец, несколько семейств образуют отряд (в фауне России их 18). Птицы, относящиеся к одному отряду, могут быть совсем не похожи внешне, но имеют общие черты во внутреннем строении и характере развития. Например, славковые и врановые сильно отличаются по внешнему виду, но и те и другие имеют сложное устройство гортани и вылупляются из яиц слепыми и голыми, как и птицы других семейств, относящихся к отряду Воробьеобразных (*Passeriformes*).

Для наблюдения птиц в природе, кроме наблюдательности и быстрой реакции, желательно иметь хороший шестивосьмикратный бинокль. Научитесь подносить его к глазам, не теряя из виду объект наблюдения. Старайтесь, чтобы ваша одежда была не слишком яркой и по возможности соответствовала краскам окружающего ландшафта. Учитесь ходить бесшумно и избегать резких движений. Тогда у вас будет больше шансов увидеть интересные моменты из жизни птиц или встретить какую-нибудь редкость.

Лучшее время суток для наблюдений за мелкими птицами — раннее утро. Умение подражать их голосам очень вам пригодится, хотя этим талантом обладают далеко не все. Ночных птиц иногда удастся увидеть у фонарей, где они ловят слетевшихся на свет насекомых. На пролете огромные стаи из года в год собираются в одних и тех же из-

любленных местах, знание которых очень вам поможет, как и традиционные охотничьи приемы: манки, скрадки, засады на токах.

Карты ареалов могут оказать помощь при определении, но пользоваться ими следует с осторожностью, поскольку отдельные особи часто оказываются очень далеко от обычных мест гнездования и зимовки. Тем не менее встретить дальневосточный вид в Европейской части или кавказский — за Уралом и на Севере России практически невероятно. Поэтому перед экскурсией стоит посмотреть по картам, какие виды можно ожидать встретить в вашем районе.

Просмотрев карты, вы заметите, что ареалы многих видов похожи или совпадают. Это связано с тем, что большинство птиц в своем распространении связано с определенными природными зонами — берегами холодных или теплых морей, тундрой, тайгой, лиственными лесами (европейскими или дальневосточными), степью, полупустыней, высокогорьями. На самом деле границы между ними редко бывают резкими. Например, островки степи могут заходить в лес, участки тайги встречаться в зоне смешанных лесов. При этом некоторые птицы проникают в другие природные зоны по цепочке привычных ландшафтов. Скажем, многие степные виды заходят в лесную зону по полям и пустошам, а тундровые — в тайгу по верховым болотам.

Особенно много видов встречается там, где смыкаются различные ландшафты: по берегам водоемов, на опушках, в степных лесополосах. Верховые болота, глухие леса, сухие степи и тундры населены не такой разнообразной, но очень характерной и интересной фауной.

Когда мы наблюдаем птиц в природе, невольно бросается в глаза, насколько они соответствуют своей среде обитания. Благодаря миллионам лет сурового отбора птицы как бы "вписаны" в ландшафт. Некоторые виды способны жить в самых разнообразных условиях, другие жестко связаны с определенным типом растительности или рельефа. Небольшое изменение среды может неожиданно привести к исчезновению даже обычного и широко распространенного вида. Например, многие птицы-дуплогнезdnики перестают встречаться там, где прошли так называемые санитарные рубки, лишаящие их убежищ в дуплах старых деревьев. Бродячие кошки и собаки резко снижают численность птиц вблизи населенных пунктов.

С другой стороны, "выпадение" из природных сообществ того или иного вида ведет к разрыву тончайших связей в сложнейшем "механизме" леса, степи или реки. Поэтому так важно сохранить все виды, даже те, которые на первый взгляд кажутся нам бесполезными или вредными.

Деятельность человека приводит к тому, что разнообразная дикая фауна сменяется сообществом нескольких видов, способных жить в культурном ландшафте, таких, как вороны, голуби, воробьи. Многие виды вообще исчезли или стали крайне редкими по вине человека. Почти повсюду снизилась численность самых красивых и ценных птиц — журавлей, дроф, куриных, гусей, хищных птиц. Сохранение той или иной птицы в вашей области может зависеть лично от вас. Недопустимо беспокоить птиц у гнезд — это часто приводит к гибели кладки. Особо бережного отношения требуют редкие виды, занесенные в Красную книгу России, а также места массовой остановки птиц на пролете и зимовках.

Собираясь в отпуск, пролистайте книгу и узнайте, что интересного можно встретить в новых для вас местах. Не забудьте, что многие виды в разных частях страны окрашены несколько по-разному, например, белая трясогузка, снегирь, сойка или ремез.

Данный справочник содержит лишь самые краткие сведения по биологии птиц. Определив вид, обратитесь к специальной литературе, если хотите узнать побольше о его жизни. Список рекомендуемых изданий приведен в конце книги.


Общие характеристики отрядов, семейств и родов относятся только к видам, обитающим на территории России.

Взгляды разных специалистов на детали систематики птиц порой сильно отличаются. При наличии разночтений авторы, как правило, выбирали тот вариант систематики и порядок изложения, который, на их взгляд, позволяет проще и нагляднее сформулировать "алгоритм" определения. Списки некоторых вариантов систематики приводятся в конце описания тех отрядов, к которым эти разночтения относятся.

Познакомиться с названиями частей тела птиц и значением других терминов можно по рисунку на форзаце 2.

Желаем вам хорошей погоды, удачи и незабываемых минут общения с природой и ее прекрасными творениями — птицами.

Обозначения на картах:



область (места) гнездования

область (места) зимовки

КЛАСС ПТИЦЫ — AVES

*В ущелье лежа,
Уж долго думал... о страсти к небу.*

Максим Горький. "Песня о Соколе".

На первый взгляд, трудно поверить, что из всех ныне живущих существ ближайшими родственниками птиц являются "рожденные ползать" пресмыкающиеся. Но птиц сближает с рептилиями целый ряд особенностей анатомии: "сухая", т.е. почти лишенная желез кожа, сохранившиеся на лапах роговые чешуи, особенности строения скелета и кровеносной системы. Механизм размножения птиц практически не отличается от свойственного рептилиям, вплоть до таких деталей, как наличие "яйцевого зуба" у птенцов (этим известковым зубчиком птенцы, а также детеныши крокодилов и змей вскрывают скорлупу при вылуплении, а затем он отпадает).

Однако современные птицы, в отличие от всех ныне живущих рептилий, обладают рядом важных особенностей, прежде всего постоянной температурой тела (теплокровностью) и способностью к полету.

Постоянная температура обеспечивается более высоким, чем у рептилий, энергетическим уровнем и совершенными механизмами терморегуляции. В отличие от рептилий, птицы, за немногими исключениями, не способны остывать и впадать в спячку при охлаждении. Интенсивный обмен веществ требует усиленного снабжения организма не только кислородом, но и питательными веществами. Для поддержания высокого уровня обмена птицам требуется много калорийного корма, особенно в холодную погоду. Поэтому лишь немногим птицам удалось стать по-настоящему травоядными, а большинство из них нуждается в более калорийных животных кормах, семенах или плодах. Пищеварение птиц протека-

ет очень быстро. В большой степени это также позволяет им экономить силы в полете, поскольку отходы сразу удаляются и мускульная энергия не тратится на перевозку шлаков.

Все птицы нашей фауны способны к полету. Поэтому в их строении много общих черт, связанных с аэродинамическими и другими "техническими" требованиями. С точки зрения авиаконструктора птица — это как бы совершенный летательный аппарат с переменной формой крыла, экономичным "двигателем", сложным навигационным оборудованием и надежным устройством взлета и посадки.

Птичье крыло, возникшее из передней конечности рептилий, служит одновременно несущей плоскостью и пропеллером, причем его концевая часть — в основном движущийся взад-вперед "винт", а прилегающая к телу — создает подъемную силу. При этом гибкие перья гораздо лучше "учитывают" завихрения воздуха, чем металлические конструкции рукотворных летательных аппаратов. Чем больше крыло, тем оно эффективней, поэтому мелкие птицы машут крыльями относительно чаще, чем крупные.

Форма крыла определяется образом жизни птицы. Лесные виды обычно имеют короткие широкие крылья, они могут быстро взлетать и ловко маневрировать среди густых ветвей. У обитателей открытых пространств крылья чаще длинные и узкие, позволяющие летать очень быстро и экономично. Птицы открытого моря, проводящие в воздухе большую часть жизни, пользуются динамическим парением, используя разницу в скорости ветра на разной высоте. Крупные сухопутные виды применяют статическое парение, набирая высоту с помощью восходящих потоков воздуха, поднимающихся от нагретой солнцем земли. Особенно мастерски владеют этим искусством грифы, орлы и аисты с их широкими крыльями.

Мощная летательная мускулатура составляет до 30% веса птицы. Она крепится к килю — специальному выросту грудины. Грудные мышцы некоторых птиц, способных к быстрому взлету, но не летающих на большие расстояния, плохо снабжаются кровью ("белое мясо" курицы), но у большинства видов они густо пронизаны кровеносными сосудами. Снабжение кислородом осуществляют не только легкие, но и связанные с ними воздушные мешки, гораздо большие по объему. Благодаря воздушным мешкам птицы получают кислород не только во время вдоха, но и на выдохе. Изменяя объем этих мешков, водоплавающие птицы могут отчасти регулировать собственную плавучесть.

Кости конечностей у всех наших птиц полые, и скелет иногда весит меньше, чем перья той же птицы. Прочность костей не снижается благодаря находящимся внутри "ребрам жесткости". Позвоночник неподвижен (кроме шейного отдела) — это как бы жесткая рама, к которой крепится вся "конструкция".

Перья птиц — уникальное "изобретение" с технической точки зрения. Они сочетают необыкновенную легкость с прочностью и теплоизолирующими свойствами. За миллионы лет эволюции бывшие чешуи приобрели сложную структуру, детали которой видны только под микроскопом. Обычно у птицы бывает от одной до десяти тысяч перьев. С течением времени они изнашиваются, и их замена происходит во время линьки (один-два, иногда три раза в год). У большинства птиц, особенно водных, они покрыты жиром из так называемой копчиковой железы и обладают водоотталкивающими свойствами. Распушая или прижимая перья, птицы могут регулировать температуру тела.

Способность птиц к полету позволяет им совершать дальние миграции. Обычно птицы северного полушария осенью мигрируют на юг, хотя для многих видов характерны перелеты в западном, восточном, и даже северном направлениях, при этом морские птицы часто следуют линии берегов, а сухопутные стараются избегать морей, хотя и не всегда. Иногда птицы, относительно недавно расселившиеся на север, летят туда, где обитали в прошлом: например, многие европейские виды славковых проделывают долгий путь до Юго-Восточной Азии, а некоторые тундровые летают на американские зимовки.

Умение птиц находить дорогу при перелетах на огромные расстояния остается отчасти загадкой, хотя уже установлено, что роль встроенного компаса выполняет аппарат внутреннего уха, а базовым направлением этого компаса является направление восток-запад, определяющееся вращением земли. Птицы могут также ориентироваться по солнцу и звездам. Условно птиц делят на перелетных, зимующих далеко от мест гнездования; кочующих, которые не совершают целенаправленных перелетов, но все же широко путешествуют вне времени гнездования; и оседлых, круглый год живущих практически на одном месте. Способность к полету и самостоятельному нахождению зимовок и места рождения являются чисто врожденными, инстинктивными, а не передаются с родительским опытом.

Из органов чувств у большинства птиц наиболее развито зрение. Как правило, их глаза видят в несколько раз дальше

наших и лучше фокусируются при изменении расстояния до объекта. Слух особенно развит у сов, но и другие птицы слышат по крайней мере не хуже нас. Правда, звуки они воспринимают несколько иначе, чем человек. Обоняние у птиц лучше, чем считалось до недавних пор, но все же обычно намного слабее, чем у большинства млекопитающих.

Все птицы откладывают яйца, живородящих среди них нет. Обычно у видов, гнездящихся в дуплах и других укрытиях, яйца бывают белыми или однотонными и яркоокрашенными; а у тех, чьи гнезда расположены открыто — маскировочной окраски; но это правило выполняется далеко не всегда. В период насиживания у большинства птиц образуются наседные пятна — участки голой кожи на брюшке, служащие для обогрева яиц. В жару, впрочем, родителям часто приходится не обогревать яйца, а защищать от перегрева.

Откладке яиц обычно предшествует сложный брачный ритуал и строительство гнезда. Гнезда различаются у разных видов: это может быть просто ямка в песке, а иногда сложное сооружение из различных материалов. Некоторые птицы используют чужие гнезда или подкладывают яйца другим видам. Птенцы многих птиц почти сразу покидают гнездо и следуют за матерью (у некоторых видов птенцов водят оба родителя или самец). Такие птенцы с первого дня покрыты пухом, зрячие и подвижные. Про этих птиц говорят, что у них выводковый тип развития. Птенцы других появляются на свет голыми, слепыми и долго остаются совершенно беспомощными. Это развитие птенцового типа. Бывают и всевозможные переходные варианты.

В России встречаются птицы восемнадцати отрядов, почти половина видов относится к отряду Воробьеобразных. Число видов достигает 720, что составляет примерно 7% от мировой фауны. На берегах морей и в тундрах преобладают Ржанкообразные, а в открытом океане — Буревестникообразные. Некоторые виды гнездятся только в нашей стране, в том числе белоплечий орлан и краснозобая казарка, которых можно отнести к числу красивейших птиц мира.

1. Отряд Гагарообразные — *Gaviiformes*

*Живет в тех краях птица гагара. Из шкур
сей птицы камчадалы шьют одежду, кою превы-
ше морского бобра и соболя почитают... Шаманы
же сию птицу за колдовскую держат.*

*Степан Крашенинников.
“Описание земли Камчатки”.*

Если вы летней северной ночью просыпаетесь от леденящих душу воплей и стонов за стенкой палатки, значит на ближайшем озере живет пара гагар. Эти птицы настолько приспособлены к водной среде, что по суше передвигаются с большим трудом, и увидеть их на берегу удастся очень редко. Зато они прекрасно ныряют и могут проплыть под водой до 300 м.

Полет гагар быстрый и, в отличие от уток, маломаневренный, с частыми взмахами крыльев, несколько опущенной головой. На воде сидят низко и при опасности чаще ныряют, а не взлетают. Клюв острый, шиловидный, на лапах — перепонка, соединяющая три передних пальца. Больше или меньше прижимая перья к телу, гагары регулируют количество остающегося под оперением воздуха и тем самым меняют свою плавучесть.

Голос очень громкий и разнообразный, состоит из пронзительных воплей и стонов. В полете характерен громкий крик “га-га-га-ррра”.

Кормятся в основном мелкой рыбой и беспозвоночными, которых ловят на крупных озерах, реках и в море. На пролете встречаются по всей территории страны, но летят преиму-

шественно ночью, так что увидеть их удастся редко. Зимуют гагары по берегам незамерзающих морей, где в это время их трудно определить до вида из-за однотонного зимнего оперения. Летом они легко узнаются по характерной окраске и силуэту и служат прекрасным украшением северных озер.

Гнезда строят в непосредственной близости от воды, на берегах озер в тундре и тайге. В кладке 2 оливково-бурых с черными крапинками яйца удлинённой формы. При приближении к гнезду человека насиживающая птица тихо уплывает. Покрытые темно-коричневым пухом птенцы умеют плавать и нырять с первого дня жизни.

В прошлом прочные шкурки гагар служили в качестве мехового сырья, сейчас они лишь изредка используются народами Крайнего Севера. Мясо жесткое и малосъедобное. В России встречаются все пять видов гагар, принадлежащих к единственному роду.

1.1. Семейство Гагаровые — *Gaviidae*

1.1.1. Род Гагары — *Gavia*



Краснозобая гагара
[1] — *Gavia stellata*
(Таблица 1)

Самая мелкая гагара, размером с домашнюю утку. Клюв тонкий, сбоку кажется несколько вздернутым. Летом на горле каштановое пятно. Характерна тусклая окраска спины. В зимнем наряде на спине рисунок из мелких белых пятен. Единственная из гагар умеет взлетать почти без разбега, поэтому часто гнездится на совсем небольших, до 10-15 метров диаметром, озерках. Как правило, эти озера совершенно бескормны, и птицы совершают регулярные перелеты к водоемам, богатым рыбой. В полете поднимает крылья вертикально вверх.

Обитает по всей Арктике, реже встречается в зоне тайги. Зимует на Каспийском, Черном и Азовском морях, у берегов Камчатки и Сахалина. Питается мелкой рыбой и рачками, изредка водными растениями.


Чернозобая гагара
[2] — *Gavia arctica*
 (Таблица 1)



Самая обычная и широко распространенная гагара. Немного больше домашней утки. Голова и шея светло-серые, горло и передняя часть шеи летом черные с металлическим отливом, зимой белые. Клюв прямой, темный. Зимой спина однотонная.

Гнездится на средних и крупных озерах от тундр до гор и лесостепей Южной Сибири. Мелких озер избегает, поскольку для взлета ей необходим длинный разбег по воде. Молодые птицы проводят первое лето на местах зимовок по морским побережьям. Зимует на Черном, Каспийском, Охотском морях. Питается мелкой рыбой, рачками и водными растениями. В Европейской части страны в последние годы стала редка и нуждается в охране.


Белошейная гагара
[3] — *Gavia pacifica*
 (Таблица 1)



Очень похожа на чернозобую гагару [2], но оперение головы и задней стороны шеи летом почти белое, пушистое. Зимой отличается только по более короткому и тонкому клюву и более толстой шее.

Гнездится на тундровых озерах крайнего северо-востока России. Зимует в морях от Камчатки до Сахалина.

Белоклювая гагара
[4] — *Gavia adamsii*
 (Таблица 1)



Самая крупная из гагар, величиной почти с гуся. Отличается желтовато-белым, слегка вздернутым

клювом. Голова летом черная, зимой белая с коричневой шапочкой. Характерен хриплый и очень громкий голос.

Гнездится по берегам богатых рыбой водоемов в тундре и лесотундре. Зимует у берегов Камчатки и Курильских островов. Повсюду встречается реже, чем другие виды гагар. Питается рыбой, реже водными беспозвоночными.

Занесена в Красную книгу России.

На Дальний Восток и, возможно, северо-запад России залетает полярная гагара — *Gavia immer* [5], (Таблица 1), гнездящаяся в Северной Америке и Исландии. Похожа на белоклювую гагару [4], но отличается темным прямым клювом, от других гагар — крупными размерами, летом — черной головой, зимой — серой шапочкой с размытыми краями. На воде держит клюв слегка приподнятым.

2. Отряд Поганкообразные — *Podicipediformes*

Сначала земли не было, всюду одна вода. Попросили звери Чомгу земли со дна достать. Нырнула птичка — не смогла до дна донырнуть. Второй раз нырнула — опять не достала, только кровь из ноздрей выступила. Третий раз нырнула — принесла ила щепотку и водорослей пучок. Из того ила сделали звери сушу, а из водорослей — лес и травы. С тех пор у птенцов Чомги красные пятнышки на клюве.

Легенда коренных жителей Приамурья.

Название "поганки" эти водные птицы получили от охотников за то, что их мясо пахнет рыбой. Поганки несколько напоминают гагар, но значительно мельче. Пальцы снабжены складными кожистыми лопастями, не образующими сплошной перепонки. Рулевые перья хвоста отсутствуют, вместо них лишь мягкие щетинкообразные перышки. Самцы и самки окрашены сходно. По суше передвигаются с трудом, а взлетают только с воды после длительного разбега. Полет быстрый, маломаневренный. Шея в полете вытянута и наклонена немного вниз. При опасности обычно не взлетают, а ныряют и затем незаметно выныривают или высовывают из воды только голову, чтобы осмотреться.

Гнездятся отдельными парами, изредка разреженными колониями на заросших водоемах, где строят плавучие или лежащие на отмели гнезда. Масса мокрой водной растительности, составляющая гнездо, выделяет при разложении тепло, так что даже в отсутствие родителей в гнезде бывает на

7-8 градусов теплее окружающей среды. В кладке 3-6, изредка до 10 грязно-белых или буроватых яиц. Птенцы с яркими полосками на голове и шее. Весной можно увидеть своеобразный и очень красивый брачный танец поганок, а позже — наблюдать, как они плавают с пуховыми птенцами на спине. При опасности птенцы часто прячутся под перьями родителей, не покидая их даже при нырянии. Взрослые птицы могут погружаться на глубину до 25 м. Питаются в основном водными беспозвоночными и мелкой рыбой.


В прошлом поганки промышлялись ради прочной шкурки. В России два рода.

2.1. Семейство Поганковые — *Podicipedidae*

2.1.1. Род Поганки — *Podiceps*

Птицы размером с небольшую утку или чирка. Самцы несколько крупнее самок. В брачном наряде легко различимы по яркому оперению головы и шеи, зимой определить вид несколько труднее. В полете видно светлое прямоугольное пятно на заднем крае крыла, образованное белыми второстепенными и третьестепенными маховыми перьями. Зимуют по берегам морей. Голос — разнообразные визгливые или горловые крики.

В России четыре вида, широко распространенных в основном в Средней полосе и на юге.




Чомга [6] — *Podiceps cristatus*
(Таблица 9)

Самая крупная из наших поганок (немного мельче домашней утки) и самая обычная. Летом легко узна-

ется по черным "рожкам" и черно-рыжему "воротнику", зимой — по темной шапочке, не достигающей до глаз, и темным, более короткими чем летом "рожкам". Шея светлая, клюв красноватый. У молодых птиц на щеках черно-белые полосы. В полете держит ноги вытянутыми горизонтально (другие поганки — чуть опущенными).

Гнездится на крупных, как пресных так и соленых, водоемах лесной и степной зон. Зимует на Азовском и Каспийском морях, обычна у Черноморского побережья Кавказа. Питается в основном мелкой рыбой.

**Серошекая поганка [7]
— *Podiceps griseigena*
(Таблицы 9, 1)**




Чуть меньше чомги, темная шапочка на голове доходит до уровня глаз, щеки летом серые (у молодых птиц полосатые), зимой серо-белые, клюв черный с желтым основанием. Летом шея красно-коричневая. В полете белые пятна видны не только на заднем, но и на переднем крае крыла.

Гнездится на мелких заросших стоячих и слабо проточных водоемах от южных границ России и на север до лесотундры, иногда высоко в горах. Местами, например в дельте Волги, образует довольно плотные гнездовые поселения. На пролете встречается на крупных озерах и берегах морей. Почти всюду довольно редка. Питается мелкой рыбой, беспозвоночными, водными растениями.


Серошекая поганка, подобно другим рыбадным птицам, чувствительна к загрязнению воды пестицидами, которые накапливаются в организмах водных животных, а затем и у посядающих их птиц. За рубежом именно серошекая поганка служит одним из видов-индикаторов при оценке состояния природной среды.

**Красношейная поганка
[8] — *Podiceps auritus*
(Таблица 9)**



Размером с чирка. Весной и летом голова черная с пучками рыжих перьев над и за глазами, шея и бока рыжие. Осенью и зимой общая окраска светлая, на голове темно-серая шапочка, шея спереди белая. Клюв прямой, черный со светлым кончиком. Плывущая птица держит голову чуть откинутой назад.

Гнездится на небольших озерах, старицах в поймах рек на большей части страны к востоку до Анадыря, на Алтае иногда высоко в горах. Повсюду довольно редка. Зимой обычна у Черноморского побережья Кавказа. Менее осторожна, чем другие поганки. Питается водными беспозвоночными, на зимовке также мелкой рыбой.



Черношейная поганка
[9] — *Podiceps nigricollis*
(Таблица 9)


Чуть меньше красношейной поганки [8]. Весной и летом шея черная, за глазами пучки перьев золотистого цвета, торчащие назад и книзу. Зимой отличается слегка вздернутым темно-серым клювом, серой шапочкой, заходящей ниже уровня глаз, и серой спереди шейей. Плывущая птица держит шею вертикально. В полете видны темные концы крыльев.

Гнездится как отдельными парами, так и колониями на разнообразных водоемах, на пролете встречается даже на горных реках. Зимой возможны встречи на Черном море. Обычна в Средней полосе и на юге Европейской части России и в Западной Сибири. Питается в основном водными беспозвоночными.

Гнездится как отдельными парами, так и колониями на разнообразных водоемах, на пролете встречается даже на горных реках. Зимой возможны встречи на Черном море. Обычна в Средней полосе и на юге Европейской части России и в Западной Сибири. Питается в основном водными беспозвоночными.

2.1.2. Род Малые поганки — *Tachybaptus*

В России один вид.



Малая поганка [10] —
Tachybaptus ruficollis
(Таблица 9)

Мелкая поганка, размером заметно мельче чирка. Украшающих перьев на голове нет. Окраска весной и летом темно-бурая, щеки и горло ржаво-рыжие. Зимой серая, в том числе шея спереди и с боков, горло белое. Шея сравнительно короткая, крылья без белых пятен.

Мелкая поганка, размером заметно мельче чирка. Украшающих перьев на голове нет. Окраска весной и летом темно-бурая, щеки и горло ржаво-рыжие. Зимой серая, в том числе шея спереди и с боков, горло белое. Шея сравнительно короткая, крылья без белых пятен.

Обычна на западе и юге России, гнездится на Южных Курилах и в Приморье, но на глаза попадает редко. Обитает на мелких заросших озерах, в дельтах рек. На большей части ареала оседла при наличии незамерзающих водоемов. Зимой встречается на Азовском и Черном морях, незамерзающих озерах и прудах Предкавказья. Питается водными беспозвоночными, реже мелкой рыбой и головастиками. Активна в основном по ночам. Голос — громкая флейтовая трель.

3. Отряд Буревестникообразные — *Procellariiformes*

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит — и тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури!

Максим Горький. Песнь о буревестнике .

Тому, кто захочет познакомиться с этими птицами, придется привыкнуть к свисту штормового ветра и качке. Ведь альбатросы, буревестники и качурки — обитатели открытого моря, вечные странники, связанные с берегом только в гнездовой период, иногда годами не видящие суши. Эти птицы пользуются энергией ветра для полета, поэтому обычны в тех районах морей и океанов, где редко бывает штилевая погода.

На верхней стороне клюва у них две трубки — протоки солевыводящих желез, благодаря которым эти птицы могут пить морскую воду. Некоторые буревестники, на первый взгляд, похожи на чаек, но отличаются манерой полета, а вблизи — характерным клювом с крючком на конце и с трубочками на надклювье.

Гнездятся колониями, обычно на берегах морских островов. Гнездо с редкой выстилкой из травинки и перьев устраивают в ямке на земле или просто на уступе скалы. Некоторые виды роют норы. В кладке одно яйцо, как правило белое. Птенец, покрытый густым светло-серым пухом, рас-

тет быстро и постепенно обгоняет по весу родителей. На завершающей стадии развития птенцов вес их бывает вдвое больше веса взрослых птиц. У альбатросов и буревестников родители бросают таких откормленных птенцов и улетают. Живя за счет накопленных запасов жира, птенец линяет, сменяя пуховой наряд на перо, становится на крыло и самостоятельно покидает гнездовье.

Многие виды регулярно совершают кочевки из Южного полушария в Северное или вокруг света по субантарктическим широтам. Обладают хорошим обонянием.

В России встречаются виды трех семейств, большинство из них — в дальневосточных морях. У берегов Европейской части водятся только глупыш (на севере) и обыкновенный буревестник (на юге).

3.1. Семейство Альбатросовые — *Diomedidae*

Огромные птицы с очень длинными (размах около 2 м) узкими крыльями. На воде сидят высоко, взлетают с разбега. Питаются кальмарами, рыбой, плавающим мусором. Полет планирующий, скользящий. С помощью так называемого динамического парения, используя разницу в скорости ветра на разной высоте от поверхности моря, могут преодолевать тысячи километров с минимальными затратами энергии.

Многие альбатросы стали очень редки из-за истребления человеком. В настоящее время большинство гнездовий охраняется, но численность птиц восстанавливается очень медленно, ведь они становятся взрослыми только на 5-10 году жизни и выкармливают одного птенца в два года.

В российских дальневосточных водах встречаются на кочевках (в основном в летние месяцы) три вида, гнездящиеся на тропических островах Тихого Океана.

3.1.1. Род Альбатросы — *Diomedea*

Белоспинный альбатрос [11] — *Diomedea albatrus*
(Таблица 2)

Самая крупная морская птица России — размах крыльев выше 2 м. Взрослые птицы белые, на голове и шее желтый

налет, верх крыльев и хвост по краям черно-бурые. Клюв и ноги светлые, обычно розовые или голубоватые. Оперение молодых птиц темнее, поперек оснований крыльев белые полоски.

Гнездится на островах близ Южной Японии, кочует к северу до Чукотки. В прошлом был обычной птицей севера Тихого Океана, но к 60-м годам был практически истреблен японскими охотниками. В настоящее время в двух оставшихся колониях сохранилось лишь около 250 птиц.

Занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Темноспинный альбатрос [12] — *Diomedea immutabilis* (Таблица 2)

Отличается меньшими размерами (размах крыльев около 2 м), контрастной окраской (темно-бурый верх и белый низ), желтым клювом. Голова белая.

Гнездится на Гавайских островах, в период кочевок встречается чаще в зоне холодных течений над большими глубинами (до Командор к северу и Сахалина к западу). За судами следует реже, чем другие виды.

Черноногий альбатрос [13] — *Diomedea nigripes* (Таблица 2)

Темноокрашенный, с черным и клювом и ногами. Молодые с белым надхвостьем. Размах крыльев около 1,8 м.

Гнездится на островах Гавайских и Торисима. На кочевках встречается обычно в открытом океане в зоне теплых течений, лишь изредка проникая в Берингово и Охотское моря. Чаще других альбатросов следует за судами, питаясь пищевыми отходами.

В наших водах может быть встречен гнездящийся на островах Субантарктики странствующий альбатрос — *Diomedea exulans*. Он белый с черными концами и задним краем крыльев, ноги и клюв розовые (в отличие от белоспинного альбатроса). Молодые коричневые с белой головой, позже серые с белым хвостом. Из птиц мира у этого вида самый большой размах крыльев — 3 м.

3.2. Семейство Буревестниковые — *Procellariidae*

Среднего размера (размах крыльев 75-120 см) морские птицы, несколько напоминающие чаек. Отличаются характерной манерой полета: чередование скользящего планирования к самой поверхности воды и набора высоты с частыми резкими взмахами крыльев. В тихую погоду взлетают с разбега, летают низко и неуверенно. При сильном ветре полет стремительный и маневренный. На суше неуклюжи, передвигаются, опираясь на цевку.

Питаются мелкой рыбой, планктоном, отходами рыболовецкого промысла. Могут неглубоко нырять, но чаще подбирают корм, садясь на воду и фильтруя ее, как речная утка. Гнездятся в основном на островах.

В России встречаются буревестники четырех родов.


3.2.1. Род Глупыши — *Fulmarus*

В России один вид.

Глупыш [14] —
Fulmarus glacialis
(Таблица 2)

Размером с серебристую чайку, размах крыльев около метра. Одна из обычных птиц открытого моря на северо-западе Тихого океана, в Охотском и Беринговом морях. Единственный вид отряда, обитающий в арктических морях (только в Чукотском море можно встретить также и тонкоклювого буревестника [16]).

Телосложение плотное, клюв короткий и мощный, желтого цвета. Окраска двух типов: светлая (белые голова, шея и нижняя сторона тела, дымчатые верхняя сторона крыльев, спина и хвост) и темная (оперение темно-серое или буроватое, концы крыльев иногда почти черные). Встречаются всевозможные переходные варианты окраски. В колониях Курильских и Командорских островов, острова Ионы, Земли Франца-Иосифа гнездятся в основном темные птицы, а на




севере Охотского моря, Чукотке, Новой Земле — светлые. От чаек светлая форма глупыша отличается в основном скользящей манерой полета с плавно изогнутыми книзу крыльями.

Гнездится на уступах прибрежных скал большими колониями, иногда до сотен тысяч пар. На кочевках встречается как в открытом море, так и у побережий и даже в гаванях портов. Иногда собирается большими стаями, нередко вместе с чайками, у судов, ведущих промысел. Голос — низкий трубный гогот, слышится в основном в гнездовых колониях. Птицы очень доверчивы и почти не боятся человека, за что и получили свое название. Зиму проводят в прибрежных и открытых водах северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в незамерзающих акваториях Северного Ледовитого океана (могут быть встречены в Баренцевом, Японском и Беринговом морях).

3.2.2. Род Буревестники — *Puffinus*

Птицы темной окраски, с узкими крыльями и тонким слабым клювом. Гнездятся в норах на небольших островах. Питаются в основном крупным планктоном и мелкой рыбой. В России пять видов, встречающихся только на кочевках.



Обыкновенный буревестник [15] — *Puffinus puffinus*
(Таблица 3)

Единственный вид трубоносых Черного и Азовского морей. Встречается чаще зимой вдали от берега, но иногда летом и у самого побережья, где кормится, не обращая внимания на купающихся людей. Размах крыльев 60-75 см. Верхняя сторона тела от серой до черной, нижняя белая. Бока груди пестрые. Крылья черные или серые сверху, белые с черной каймой снизу. Клюв голубовато-серый с черным кончиком. Встречается поодиночке и небольшими стаями.

Гнездится на островах Атлантики, Средиземного моря и тропиков Тихого океана. Может быть встречен в Баренцевом море.

Тонкоклювый буревестник [16] — *Puffinus tenuirostris*
(Таблица 3)

Размах крыльев чуть меньше метра. Обычный вид дальневосточных вод, где летом иногда встречается огромными стаями. Встречается также в Чукотском море. Окраска бурая, снизу немного светлее, крылья и хвост черные. Клюв и ноги серые.

Гнездится на побережье и островах Австралии, где служит объектом массового промысла.

Серый буревестник [17] — *Puffinus griseus*
(Таблица 3)

Похож на тонкоклювого буревестника, но крылья снизу серебристо-серые. Клюв и ноги темно-серые. Размах крыльев чуть больше метра.

Летом обычен от пролива Лаперуза до Камчатки, а в южной части Охотского моря встречается огромными стаями. Залетает в Чукотское и Японское моря. Гнездится на островах близ Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки.

Буллеров буревестник [18] — *Puffinus bulleri*
(Таблица 3)

Светло-серый буревестник с темными верхом головы и хвостом, на спине и крыльях темный рисунок в форме буквы "М". Клюв голубоватый с черной вершиной. Хвост клиновидный. Размах крыльев чуть больше метра. От тайфунников отличается более тонким длинным клювом.

Обычен летом у Южных Курильских островов. Гнездится на островах у северного побережья Новой Зеландии.


Бледноногий буревестник [19] — *Puffinus carneipes*
(Таблица 3)

Крупный темный буревестник с хорошо заметными светло-розовыми ногами и клювом. Размах крыльев чуть больше метра.

Встречается летом и осенью в Японском море и у Южных Курильских островов. Гнездится на островах Южного полушария.

3.2.3. Род Пестрые буревестники — *Calonectris*

Два вида.



Пестролицый буревестник [20] — *Calonectris leucomelas*
(Таблица 3)

Размах крыльев около метра. Окраска темная с верхней стороны и свет-

лая — с нижней. Голова светлая с темными пестринами, клюв голубоватый, хвост клиновидный. В полете слегка покачивается.

В пределах России гнездится на двух маленьких островах в заливе Петра Великого близ Владивостока, где численность не превышает 150 пар. Гнезда устраивает в норах. Кладку насиживают оба партнера, но могут покидать ее на несколько дней. После вылупления птенца взрослые птицы у гнезда для кормления появляются только в сумерках, да и то не чаще чем раз в сутки. Кочующие особи регулярно встречаются летом в морях юга Дальнего Востока. Питается мелкой рыбой, кальмарами, отходами рыбного промысла. Голос — громкий свист, гортанное ворчание.

Занесен в Красную книгу России.

В Черном море может быть встречен **пестрый буревестник — *Calonectris diomedea***, гнездящийся на островах в Средиземном море и у Западной Африки. Он похож на пестролицего буревестника, но лоб серый, а клюв желтый с темной перевязью.

3.2.4. Род Тайфунники — *Pterodroma*.

От других буревестников отличаются коротким черным клювом. Гнездятся в норах и расщелинах скал на небольших океанических островах. Питаются в основном мелкими кальмарами. В России не менее трех видов, встречающихся только на кочевках.

Пестрый тайфунник [21] —***Pterodroma inexpectata***

(Таблица 2)

Размах крыльев 70-90 см. Сверху серый, снизу светлый с темным рисунком в виде буквы "М", который пересекает крылья и спину. Верх головы и пятно вокруг глаза темно-серые. Лоб и бока белые с темными пестринами.

Летом обычен над глубокими водами, особенно в южной части Берингова моря. Гнездится на островах у побережья Новой Зеландии.

Еще два вида залетают летом в территориальные воды России у Южных Курил.

Бонинский тайфунник [22] —***Pterodroma hypoleuca***

(Таблица 2)

Похож на пестрого тайфунника [21], но лоб и бока чисто-белые, размах крыльев 60-75 см. Гнездится на Гавайских островах и островках близ побережья Японии, возможно гнездование на Южных Курилах.

Тайфунник Соландра [23] —***Pterodroma solandri***

(Таблица 2)

Из-за темно-серой окраски моряки называют эту птицу "вестником несчастья". Узнается по треугольным белым пятнам на нижней стороне крыльев. Размах крыльев около метра. От антарктического поморника отличается коротким клювом и манерой полета. Гнездится на острове Лорд-Хау в Тасмановом море.

В Тихом Океане недалеко от наших территориальных вод встречаются еще несколько видов тайфунников:

Гавайский тайфунник — *Pterodroma phaeopygia*, гнездящийся на Галапагосских и Гавайских о-вах. Черный сверху и белый снизу, бока шеи и пятно вокруг глаза черные, лоб белый, размах крыльев около 90 см, полет очень быстрый и легкий.

Белошейный тайфунник — *Pterodroma externa*, гнездящийся на островах у побережий Новой Зеландии и Чили. Похож на

бонинского тайфунника [22], но отличается черной шапочкой, белым ошейником и палевым хвостом.

Тайфунник Кука — *Pterodroma cookii*, гнездящийся на островах в чилийских водах. Очень похож на пестрого тайфунника [21], но окраска сероватая, бока хвоста сверху белые.

Чернокрылый тайфунник — *Pterodroma nigripennis*, гнездящийся на островах Океании. Очень похож на бонинского тайфунника [22], но голова серая без темной полосы поперек затылка.

Длинноклювый тайфунник — *Pterodroma longirostris*, гнездящийся на островах Хуан-Фернандес. Очень похож на бонинского [22] и чернокрылого тайфунников, но на затылке темное пятно.

Любой из этих видов, особенно тайфунник Кука, может залетать в наши воды, с наибольшей вероятностью — к Южным Курилам. Там же и в Японском море может быть встречен **бульеров тайфунник** — *Bulweria bulwerii*, размахом крыльев 60-70 см, темно-бурый с длинным клиновидным хвостом, гнездящийся в теплых частях Тихого и Атлантического океанов.

3.3. Семейство Качурковые — *Oceanitidae*

Мелкие, мельче голубя, (размах крыльев около 40 см) морские птицы, в полете несколько напоминающие ласточек. Полет быстрый, маневренный, порхающий, обычно низко над поверхностью моря. Часто встречаются большими стаями, особенно когда слетаются ночью на свет судов. На суше передвигаются неуверенно. Нырять не способны.

Питаются крупным планктоном, мальками рыб или отходами рыбного промысла. Гнездятся колониями в норах, которые выкапывают в торфе или мягких грунтах; либо гнездо устраивается в трещинах скал и каменистых осыпях. Птенцов продолжают кормить до подъема их на крыло. Голос — тихий щебет, писк или тиканье.

Русское название происходит от слова "окочуриться": в старину качурок считали душами утонувших моряков.


В России не менее четырех видов.

3.3.1. Род Качурки — *Oceanodroma*

Хвост вильчатый. Гнездятся на островах дальневосточных морей.

Сизая качурка [24] —
Oceanodroma furcata
 (Таблица 3)


Пепельно-серая, со светлой полосой на крыльях. Молодые птицы с буроватым оттенком.



Зимой встречается в теплых водах вдоль течения Куросио, летом обычна над всеми глубокими водами Дальнего Востока, кроме Японского моря. Изредка удастся наблюдать, как сизые качурки ловят насекомых над прибрежными лугами. Гнезда устраивает в норах, трещинах скал и среди камней. В кладке одно белое, редко с мелкими темными крапинками яйцо. Самые крупные колонии находятся на Средних Курилах и острове Медный.

Северная качурка
[25] — *Oceanodroma*
leucorhoa
 (Таблица 3)

Темно-бурая (в полете кажется черной) со светлой косой полосой на крыльях.




Надхвостье белое с черной продольной полоской посередине.

Встречается летом над большими глубинами Тихого океана и южной части Берингова моря. Самые крупные колонии находятся на Средних и Малых Курилах. Яйца белые, изредка с мелким красноватыми пятнами на тупом конце. Сильными штормами иногда заносится вглубь суши.

Малая качурка [26] —
Oceanodroma monorhis
 (Таблица 3)

Похожа на северную качурку, но еще темнее, без белого цвета на надхвостье.



Гнездится на островах Верховского и Карамзина близ Владивостока. На кочевках встречается в основном у Южного Приморья, реже у Южных Курил. Занесена в Красную книгу России.

В территориальные воды России у Южных Курил залетает гнездящаяся в тропиках и субтропиках **мадейская качурка** — *Oceanodroma castro* [27]. Она похожа на северную качурку [25], но вырез на хвосте менее глубокий, надхвостье чисто-белое без черной продольной полосы. Там же может быть встречена **темная качурка** — *Oceanodroma tristrami*, гнездящаяся на островах Гавайских и Бонин. Она более крупная (размах крыльев до 60 см), черная со светлыми полосами на крыльях, образующими полукруг (видны только в полете).

На Дальнем Востоке может быть встречена гнездящаяся в Субантарктике **океаническая качурка** — *Oceanites oceanicus*, похожая на северную качурку [25], но хвост без выреза.

В морях Европейской части России может быть встречена **британская качурка** — *Hydrobates pelagicus*, гнездящаяся на островах северо-западной Атлантики и Средиземного моря. Также похожа на северную качурку, но хвост совсем без выреза, на крыле снизу белая полоса.

4. Отряд Пеликанообразные — *Pelecaniformes*

Птицы сии есть твари преудивительные, ибо ловят рыбу загоном, словно охотники. Всякий знает, что птенцов они кормят кровью из груди своей, а перья их — лучший амулет от утопления и кораблекрушения. Печень же сей птицы обладает свойством излечивать подагру и лихорадку, снимать наговор и размягчать алмаз.

Леопольд Берцелиус. Подлинные и достоверные сведения о тварях земных, морских и небесных.

Пеликаны не зря были окружены многочисленными легендами. Эти похожие на птеродактилей птицы действительно производят странное впечатление. Кроме них, отряд включает бакланов и других, более редких у нас обитателей морей и внутренних водоемов.

Крупные и очень крупные рыбацкие птицы, они гнездятся большими колониями, обычно недалеко от воды. Все четыре пальца на ноге соединены перепонкой. Самцы и самки окрашены одинаково. Гнезда из стеблей и веток. Яйца белые, удлиненной формы. У этих птиц нет копчиковой железы, поэтому их оперение намокает в воде, и птицам приходится подолгу сушить его, расправив крылья.

Птенцы вылупляются голыми и беспомощными, позже покрываются серым или буроватым пухом. Своеобразно выглядит кормление, когда птенец по плечи залезает в глотку одного из родителей. Когда-то считалось, что птенцы при

этом кормятся кровью родителей, поэтому пеликан считается символом бескорыстного самопожертвования.


В России встречаются пеликанообразные четырех семейств, резко отличающихся по внешнему виду, из них довольно обычны только большой баклан [30] на юге Европейской части и берингов баклан [33] — на дальневосточном побережье.

4.1. Семейство Пеликановые — *Pelecanidae*

Очень крупные, заметно крупнее гуся, светлоокрашенные птицы с длинной шеей, широкими крыльями и длинным клювом. Под клювом — кожистый мешок. Гнездятся небольшими колониями на маленьких островках по заросшим тростником озерам, в дельтах рек. Взлетают с разбега, полет быстрый, с глубокими резкими взмахами, часто парящий. Шея в полете сложена в виде буквы S, а длинные крылья в сочетании с коротким хвостом и ногами делают силуэт парящей птицы похожим на силуэт грифа. На воде сидят очень высоко, нырять не способны. Голос — глухой рев.

Питаются рыбой, причем иногда устраивают коллективные облавные охоты, загоняя ее к берегу. В кладке обычно 2-3 белых яйца. Очень осторожны, особенно в гнездовой период. В последние годы стали редкими, сохранились лишь отдельные колонии. В России два перелетных вида, иногда встречающихся совместно.

4.1.1. Род Пеликаны — *Pelecanus*



Кудрявый пеликан
[28] — *Pelecanus crispus*
(Таблица 4)


Оперение белое или светло-сероватое, концы крыльев серо-бурые. На затылке короткий хохол из курчавых

перьев. Ноги серые. На воде обычно держит шею вытянутой вертикально. Птенцы темно-бурые.

Гнездится в Предкавказье и Прикаспии, в Калмыкии на озере Маныч-Гудило. Часть птиц зимует в равнинном Даге-

стане. Всего у нас сохранилось около 500 пар. Занесен в Красную книгу России.

Розовый пеликан [29]
— *Pelecanus onocrotalus*
(Таблица 4)



Оперение белое с розовым оттенком, концы крыльев черно-серые. В полете заметен также черный задний край крыла. На голове острый короткий хохол. Ноги желтые или розоватые. На воде обычно кладет голову на спину. Птенцы буровато-серые.

Гнездится в дельте Волги и на озере Маныч-Гудило в Калмыкии, зимой встречается на Каспии у побережья Дагестана. Занесен в Красную книгу России. Численность не превышает нескольких сот пар.

4.2. Семейство Баклановые — *Phalacrocoracidae*


Крупные птицы размером с гуся или утку. Оперение в основном черное с металлическим блеском. Длинные крылья, шея и хвост делают их силуэт в полете крестообразным. Клюв с крючком на конце. У основания клюва участок голой кожи, форма которого позволяет различать близкие виды. Голова у сидящей, плывущей или летящей птицы обычно чуть приподнята. На суше сидят вертикально, вытянув шею, на воде — глубоко, опустив в воду хвост и приподняв клюв. Полет быстрый, прямолинейный. С воды взлетают с разбега.

Гнездятся колониями, часто крупными, обычно вместе с другими колониальными птицами. Гнездо из веток и травы на деревьях, реже на заломах тростника, плоских островках или на прибрежных скалах. Кладка из 4-6 матовых, голубоватых с белыми потеками яиц. Насиживание начинается с первого яйца, поэтому птенцы вылупляются в течение нескольких дней и сильно отличаются друг от друга размерами. Хорошо ныряют, при этом прозрачная мигательная перепонка служит как бы подводными очками. Утром и вечером можно видеть, как большие стаи бакланов летят цепоч-

ками с ночевки к местам охоты и обратно. Особенно эффектными бывают подобные ежедневные перелеты в плавнях Прикаспия. Голос — глухое карканье или стон. Мясо пахнет рыбой и малосъедобно.

В России шесть видов.


4.2.1. Род Бакланы — *Phalacrocorax*



Большой баклан [30] — *Phalacrocorax carbo*
(Таблица 1)

Размером с небольшого гуся. Самый обычный баклан юга России, гнездится также на Мурмане, в Южной Сибири и бассейне Амура. Черный с зеленоватым блеском, горло и щеки белые, голое пятно по бокам клюва желтое и заходит за угол рта. У части особей на бедре летом белое пятно. У взрослых голова и шея иногда седые. Молодые птицы серо-бурые со светлым брюхом.

В прошлом огромные колонии бакланов существовали на островах Байкала, но они были уничтожены в 50-х гг. Сейчас баклан на Байкале крайне редок и нуждается в охране. Прирученных бакланов можно использовать для ловли рыбы, при этом на шею птицы надевается ошейник, мешающий ей заглатывать добычу.




Уссурийский баклан [31] — *Phalacrocorax filamentosus*
(Таблица 1)

Размерами и внешним обликом похож на большого баклана, но голое желтое пятно по бокам клюва не заходит за угол рта. Молодые снизу не белые, а светло-серые.

Гнездится на прибрежных скалах Японского моря и на Южных Курильских островах, на внутренних водоемах не встречается.

Хохлатый баклан
[32] — *Phalacrocorax*
aristotelis
 (Таблица 1)




Похож на большого баклана [30], но меньше, весной на голове загнутый вперед хохол, белого пятна на щеках и горле нет. У молодых светлоокрашенных птиц это пятно бывает, но низ тела темный.

Гнездится на скалистых берегах Баренцева моря, обычно под скальными навесами и выступами, часто на птичьих базарах.

В последние годы стал редок и занесен в Красную Книгу России.


Берингов баклан [33] —
Phalacrocorax pelagicus
 (Таблица 1)



Голая кожа по бокам клюва черная с красными бугорками. На темени и затылке по короткому хохлу.

Гнездится на скалах по берегам дальневосточных морей и Чукотки. Гнездо из водорослей и травы. Обычный вид дальневосточных птичьих базаров. В небольших количествах зимует на назамерзающих участках Японского моря.

Краснолицый баклан
[34] — *Phalacrocorax*
urile
 (Таблица 1)




Похож на берингова баклана, но клюв светлый, летом голое красное пятно заходит за глаз. На горле кожа этого пятна синяя.

Гнездится на береговых скалах дальневосточных морей, встречается реже, чем берингов баклан. На кормежку летает дальше в море.

На Командорских о-вах может быть встречен **ушастый баклан** — *Phalacrocorax auritus*, гнездящийся в Северной Америке. Крупнее берингова баклана [33], оперение матовое, клюв желтый, пятно голой кожи у основания клюва оранжевое. Молодые с белой грудью.

В прошлом на о-ве Беринга гнезился **очковый баклан** — *Phalacrocorax perspicillatus* [35]. Этот нелетающий вид с укороченными крыльями был истреблен к середине XIX века.



Малый баклан [36] —
Phalacrocorax pygmaeus
(Таблица 1)

Размером с ворону. Голова и шея шоколадно-коричневые, у молодых светлое горло. Голого участка

кожи у клюва нет. Весной и летом оперение с металлическим блеском и в мелких светлых точках. Полет очень быстрый и легкий.

Гнездится в зарослях тростника, реже на деревьях в дельтах прикаспийских рек и на берегах Каспийского и Азовского морей. Редкая осторожная птица, встречается обычно поодиночке. Занесен в Красную книгу России.

4.3. Семейство Олушевые — *Sulidae*

Крупные белые с черными концами крыльев морские птицы с длинным, мощным, острым серым клювом без ноздрей. Молодые буроватые. Размах крыльев около полутора метров. Рыбу высматривают с воздуха и ловят, пикируя в воду. Полет парящий или машущий с долгим планированием, в полете птица имеет сигаровидный силуэт из-за острого клюва и хвоста.

Гнездятся большими колониями, в кладке 1 голубовато-зеленое яйцо. У олуш во время насиживания не образуется голых наседных пятен на брюхе, поэтому они согревают яйца наполненными кровью перепонками лап. В России два редких залетных вида.

4.3.1. Род Олуши — *Sula*

Северная олуша [37] — *Sula bassana*
(Таблица 4)

Ноги черные. Гнездится на скалистых островах Северной Атлантики, в период кочевок залетает на Баренцево море. В результате охраны на западноевропейских гнездовьях численность возросла, и в 1996 году олуши впервые загнездились на заповедном архипелаге “Семь Островов” в Белом море.

В Японское море залетает **красноногая олуша — *Sula sula* [38]** с красными ногами и черным задним краем крыла. Окраска иногда бывает палевой. Гнездится в тропиках всех океанов.

4.4. Семейство Фрегатовые — *Fregatidae*

Крупные темные морские птицы с длинными узкими крыльями (размах около полутора метров) и длинным вильчатым хвостом. Подбородок, горло и зоб голые. У самцов на горле красный кожистый мешок. Плавать и нырять не могут, рыбу схватывают на лету или отнимают у других морских птиц. Гнездятся на островах в тропиках.

На юг Дальнего Востока залетает **фрегат ариэль — *Fregata ariel* [39]**, (Таблица 4). Самцы черные, самки бурые с белым брюхом и шеей.

5. Отряд Аистообразные — *Ciconiiformes*

*Серая цапля грустно стоит
Под дождем среди рисовых полей.
Почему так тоскливо ты сгорбилась,
Серая цапля?*

*Танаку Яримото.
Осенние четверостишия.*

Цапля тоскливо горбится, потому что высматривает мелкую рыбешку у себя под ногами. Она проявляет чудеса терпения, часами стоя совершенно неподвижно в ледяной воде в ожидании добычи. К охоте на мелководье приспособлены и другие аистообразные — перелетные птицы от среднего до очень крупного размера с длинными ногами, шеей и клювом; большими широкими и закругленными крыльями.

Питаются они только животной пищей, некоторые виды — планктоном. Птенцы вылупляются беспомощными, родители долго кормят их в гнезде.

В плавнях Предкавказья и дельты Волги встречаются большие колонии, где совместно гнездятся разные виды цапель, ибисов, бакланов. Такие колонии нуждаются в охране, прежде всего в защите от беспокойства.

Всего у нас водятся представители четырех семейств аистообразных, но в средней полосе России единственный часто попадающийся на глаза вид — серая цапля [43].

5.1. Семейство Аистовые – *Ciconiidae*

Очень крупные птицы (размах крыльев около полутора метров) контрастной черно-белой окраски. Шея в полете вытянута. Внешне несколько напоминают журавлей, но отличаются более длинным тяжелым клювом, отсутствием удлиненных мягких перьев на крыльях. Полет машущий или парящий. На пролете иногда встречаются стаями, но в стае никогда не выстраиваются клином.

Строят крупные гнезда из сучьев с выстилкой из сухой травы. Гнезда используют много лет подряд, ежегодно подновляя постройку. В кладке 3-5 белых яиц. Питаются земноводными, мышевидными грызунами, змеями, рыбой, крупными насекомыми. Во многих районах стали редки в связи с осушением болот и распашкой пойменных лугов, где аисты добывают себе пищу.

В России три редких вида.

5.1.1. Род Аисты – *Ciconia*


Белый аист [40] —
Ciconia ciconia
(Таблица 19)


Белый с черными маховыми перьями, клюв и ноги красные.

Обитатель открытых пространств лесной и степной зон. В населенных пунктах на западе России гнездится на крышах строений, столбах, больших деревьях. На гнезде часто громко щелкает клювом, закинув голову.

Неизвестно почему именно этот вид научился жить рядом с человеком, в то время как другие аисты совершенно не выносят беспокойства.

О белом аисте существует множество легенд и поверий, издревле его считают символом долголетия и супружеской верности. На самом деле, хотя обычно пары у аистов образуются на всю жизнь, самец часто приглашает к гнезду новую самку, если старая запаздывает с зимовки. Если прежняя хозяйка гнезда все же прилетает, между самками нередко вспыхивает жестокая драка.






Дальневосточный аист [41] — *Ciconia boyciana*
(Таблица 19)

Очень похож на белого аиста, но заметно крупнее, клюв черный, маховые перья с белыми стержнями. От

японского журавля отличается отсутствием черного цвета на шее.

Гнездится на деревьях в пойменных лесах бассейна Амура. Крайне редкая, осторожная птица, избегающая близости человека.

Занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. У нас сохранилось около 300 пар, за пределами России — еще меньше.



Черный аист [42] — *Ciconia nigra*
(Таблица 19)

Черный с зеленоватым отливом, брюхо белое, клюв, ноги и кольцо вокруг глаза красные. У молодых клюв

черный, ноги зеленоватые.

Гнездится отдельными парами на большей части страны в глухих заболоченных и горных высокоствольных лесах, реже в скалах или участках леса среди сырых лугов и болот. Гнезда устраивает на больших деревьях или скалах. Голос — сиплый крик.

Хотя этот вид широко распространен, он повсюду очень редок. Занесен в Красную книгу России.

5.2. Семейство Цаплевые — *Ardeidae*

Крупные и средние птицы с длинным прямым острым клювом. Крайя клюва с мелкими зубчиками. Кормятся, бродя по мелководью и схватывая рыбу или водных насекомых молниеносными движениями головы. Часто подолгу стоят неподвижно в воде или на берегу водоема. Полет машущий, плавный. Шея в полете сложена в виде буквы S.

У цапель есть специальные перья — пудретки, кончики которых постоянно образуют сухой, похожий на пудру порошок. Этим порошком цапли покрывают перья, а затем удаляют его клювом, таким способом очищая перья от грязи и рыбьей слизи. Гнездятся отдельными парами или колониями. Нередко в колонии обитает несколько видов цапель и другие птицы. Гнезда в форме конуса из ветвей и стеблей тростника строят на деревьях и тростниковых заламах. У выпи и волчков гнезда плоские, на земле или на кочках в зарослях водной растительности.

Если вам в руки попала подраненная или больная цапля, обращаться с ней надо с большой осторожностью. Защищаясь от врага, цапля без промаха наносит удары клювом, целясь в глаза, и может нанести тяжелейшую травму.

Хотя рыболовы часто считают цапель вредителями рыбного хозяйства, на самом деле они ловят лишь сорную рыбу длиной до 10-15 см, а из более крупных рыб им достаются только больные или мертвые, да и то очень редко.

В России девять родов цапель.

5.2.1. Род Цапли — *Ardea*


Крупные птицы серой или рыжеватой окраски. Вдоль длинной тонкой шеи тянется цепочка черных пестрин. На затылке свисающий черный хохол. Концы крыльев черные. Полет плавный, с медленными взмахами широких полусогнутых крыльев. В кладке 4-5 зеленовато-голубых яиц.

В России два вида.

Серая цапля [43] —
Ardea cinerea
(Таблица 5)


Серая птица с белым брюхом и шеей.

Распространена в средней полосе России, на юге Сибири и Дальнего Востока. Гнездится обычно на деревьях близ водоемов, часто колониями, некоторые из которых существуют сотни лет. Если на гнездовые совместно с серой цаплей селятся и другие виды, она обычно строит гнезда



выше всех. Вокруг таких колоний почва обогащена азотом и другими веществами из помета птиц, поэтому там развивается своеобразная растительность. Голос — короткий пронзительный скрипучий крик.

В Средние века серая цапля считалась самой интересной дичью для соколиной охоты, поэтому колонии-цапельники были большой ценностью. Были случаи, когда феодалы ввязывались в вооруженный конфликт из-за клочка земли, на котором была расположена колония.



Рыжая цапля [44] —
Ardea purpurea
(Таблица 5)

Спина серая, бока шеи и груди рыжие, низ черноватый. Менее осторожна, чем серая цапля, и реже са-

дится на деревья. Гнездится в зарослях тростника и затопленных ивняках на степных и лесостепных водоемах и морских побережьях юга Европейской части России и Дальнего Востока. Встречается чаще в сумерках. Голос тише, чем у серой цапли, и не такой резкий.

На остров Ратманова в Беринговом проливе, возможно, залетает **большая голубая цапля** — *Ardea herodias*, гнездящаяся в Северной Америке. Похожа на серую цаплю [43], но крупнее, шея и оперение голени рыжие.


5.2.2. Род Белые цапли — *Egretta*

Крупные и средние цапли чисто-белой окраски, которая в сочетании с вытянутыми ногами придает им в полете некоторое сходство с ангелами. Весной и в начале лета на спине длинные рассученные перья — эгретки. В прошлом мода на украшение шляп этими перьями привела к почти полному уничтожению некоторых видов. Летящие стайки обычно выстраиваются цепочкой.

Гнездятся на тростниковых зарослях и невысоких деревьях по берегам водоемов с зарослями тростника. В кладке 3-6 зеленовато-голубых яиц.

В России четыре вида, каждый из которых имеет собственные способы охоты на рыбу.


Большая белая цапля
[45] — *Egretta alba*
 (Таблица 5)



Крупная птица (размах крыльев около 1,6 м). Вокруг глаза голубое летом и желтое осенью кольцо. Клюв летом черный, зимой желтый. Ноги черные.

Гнездится в плавнях и затопленных лесах по дельтам рек, озерам и берегам морей юга России. Встречается обычно поодиночке. Часами стоит неподвижно, поджидая добычу. Голос — грубый, хриплый треск.

Средняя белая цапля
**[46] — *Egretta*
*intermedia***




Похожа на большую белую цаплю, но мельче (размах крыльев до метра), и с более коротким клювом (короче, чем средний палец). Кольцо вокруг глаза всегда желтое.

Гнездится на Малых Курилах, в Приморье и, возможно, на островах Кунашир и Сахалин. Охотится, медленно расхаживая по отмелям или высматривая рыбу с низких веток кустарников. Голос — гортанное карканье.

Занесена в Красную книгу России.

Малая белая цапля
[47] — *Egretta garzetta*
 (Таблица 5)



Похожа на большую белую цаплю [45], но почти вдвое мельче (размах крыльев 60-90 см). Клюв чер-


ный, зимой и у молодых птиц подклювье желтое, кольцо вокруг глаза черное или желтое, ноги черные с желтыми пальцами. Весной на затылке 2-3 длинных узких пера. Шею в полете втягивает сильнее, чем большая и средняя белые цапли.

Гнездится на юге Европейской части России. Гнезда располагаются чаще на деревьях, иногда колониями совместно с бакланами и другими цаплями. В кладке 5-6 зеленовато-голубых яиц. Встречается обычно стайками. Часто устраивает коллективные "облавы" на мелкую рыбешку или подманивает рыбу на мелководье, шевеля желтыми пальцами ног, которые рыба принимает за червей. Голос — громкое карканье.

В Приморский край залетает из Восточной Азии очень редкая **желтоклювая цапля** — *Egretta eulophotes* [48], похожая на малую белую, но с желтым клювом, вокруг глаза голубое кольцо, весной на затылке 15-20 длинных острых перьев. Охотится, бегая по мелководью и вспугивая мелкую рыбешку. Занесена в Красную книгу России.

5.2.3. Род Египетские цапли — *Bubulcus*

Один вид, редкий в России.



Египетская цапля
[49] — *Bubulcus ibis*
(Таблица 5)

Среднего размера цапля, похожая на малую белую цаплю [47], но с более короткой шеей и клювом, большой головой, буровато-желтыми перьями на голове, груди и спине. Летом эти перья длинные и рассученные. Клюв желтый. Молодые чисто-белые, клюв черный с желтым концом. Полет порхающий, с частыми взмахами крыльев. Стайки летящих птиц почти никогда не выстраиваются цепочкой. Голос — глухое негромкое карканье.

Гнездится в дельтах рек бассейна Каспия. На пролете отмечена в Южном Приморье. В последние десятилетия расселяется, осваивая новые районы и даже континенты. В частности, сумела пересечь Атлантику и теперь обитает почти по всей Америке. В нашей стране пока что редка. Гнезда из сухих прутьев расположены низко на деревьях, отдельно стоящих среди заболоченных низменностей и пойменных лугов. В кладке 5-6 зеленовато-голубых яиц. Часто кормится возле пасущегося скота (иногда так ведут себя и малые белые цапли).

5.2.4. Род Косматые цапли – *Ardeola*

Размером чуть крупнее вороны, весной и летом на голове хохол из длинных мягких перьев. Зимой верх бурый. Полет легкий, с редкими взмахами коротких тупых крыльев, летящие птицы кажутся белыми. Встречаются чаще поодиночке.


Гнездятся на заболоченных равнинах, в поймах и дельтах рек. Гнезда на деревьях или в тростниках. В кладке 4-5 зеленовато-голубых яиц. Питаются в основном насекомыми и лягушками. Активны чаще в сумерки и ночью. Голос — грубое карканье.

В России два редких вида.

Желтая цапля [50] —
Ardeola galloides
(Таблица 5)

Голова, шея, грудь, спина и ноги желтые, клюв голубой с черным кончиком. Летом удлиненные перья затылка белые с черными каемками.


Гнездится в плавнях юга России.



Белокрылая цапля
[51] — *Ardeola bacchus*


Похожа на желтую цаплю, но спина бурая, клюв желтый с черным кончиком, ноги бледно-оранжевые. Летом удлиненные перья затылка черные, а голова, шея и грудь каштановые. Зимой голова и грудь пестрые.

Очень редкая птица заболоченных низменностей Южного Приморья.



5.2.5. Род Кваквы – *Nycticorax*

В России один вид.



Обыкновенная кваква
[52] — *Nycticorax*
nycticorax
(Таблица 5)


Среднего размера цапля с большой головой, сравнительно короткими ногами и клювом.

Верх головы и спина черные, крылья закругленные, серые, низ и шея белые, весной на затылке хохол из 2-4 узких длинных белых перьев. Клюв черный, ноги розовые или желтые, глаза красные. Молодые бурые со светлыми продольными пестринами (в том числе на спине) и желтыми глазами. Полет медленный, плавный, но взлетает быстро и почти вертикально.

Обычна в больших массивах плавней на юге России, особенно в дельте Волги. Активна ночью, тогда же бывает слышен крик — громкое "квау...квау..." День проводит, стоя неподвижно на дереве у воды, лишь изредка охотится в сумерках и днем. Гнездится на деревьях, реже в тростниках, чаще всего в колониях других цапель и бакланов. В кладке 3-5 светло-голубых яиц. Черная голова с белым хохлом, вероятно, служит опознавательным знаком для птенцов, позволяющим им узнавать родителей, прилетающих с кормом в ночной темноте.

5.2.6. Род Зеленые кваквы — *Butorides*

В России один дальневосточный вид.



Зеленая кваква [53] —
Butorides striatus
(Таблица 5)

Небольшая длинноклювая темноокрашенная цапля, гнездящаяся отдельными парами. Верх черновато-зеленоватый, низ дымчатый, горло белое, клюв черный, на голове небольшой хохол.

Молодые бурые с продольными пестринами на груди и брюхе. Полет быстрый, обычно

невысоко над землей, бросаются в глаза длиннопалые светло-оливковые ноги и острые темные крылья (в отличие от обыкновенной кваквы). Иногда летит с вытянутой шеей, чего никогда не делают другие цапли.


Обитает на юге Дальнего Востока. Гнезда устраивает на деревьях по берегам лесных рек с густой растительностью. Обычно пары встречаются на реках предгорий через каждые несколько километров. Голос — резкое "тиуу". В кладке 5-7 зеленовато-голубых яиц.

На юг Приморья залетает японская кваква — *Gorsachius goisagi* [54]. Спина рыже-бурая с мелким струйчатым рисунком, голова и шея ярко-рыжие, брюхо в бурых и белых продольных пятнах.

5.2.7. Род Выпи — *Botaurus*

В России один вид.

Выпь [55] — *Botaurus stellaris*
(Таблица 5)



Крупная, плотного сложения цапля со сравнительно короткими ногами, большой головой, длинным тяжелым клювом и толстой шеей. Окраска рыже-бурая с густым "тигровым" рисунком из поперечных и продольных пестрин. Ноги и клюв зеленовато-желтые. При опасности затаивается, вытянув вверх клюв и покачиваясь в такт с тростником, а потом неожиданно взлетает из-под ног. Полет вначале неуклюжий, потом легкий и быстрый, но обычно на небольшое расстояние.


Широко распространена в средней и южной России, на юге Сибири и Дальнего Востока, но редко попадает в глаза. Активна по ночам. Гнездится в зарослях тростника. Гнездо на земле в самых труднодоступных и густых участках крепей. Кладка из 3-6 глинисто-серых яиц. Голос — гулкий отрывистый рев, похожий на звук, который получается, если подуть в горлышко бутылки, а также редкое карканье.

5.2.8. Род Волчки — *Ixobrychus*

Самые мелкие (мельче вороны) цапли со сравнительно короткими ногами и шеей и длинным клювом. При опасности затаиваются, потом резко взлетают. Полет с частыми взмахами крыльев, перед посадкой планируют.

Гнездятся отдельными парами по берегам водоемов с густой растительностью. Голос весной — отрывистое бульканье, в другое время — резкое отрывистое "ке-ке-ке". Активны в сумерки и ночью. Умеют ловко лазать по стеблям тростника, обхватывая их длинными пальцами.


В России четыре вида.



**Волчок [56] —
Ixobrychus minutus
(Таблица 5)**

Верх головы и спина черные, шея и грудь охристые, крыло розовато-желтое с черным концом, клюв и ноги зеленоватые. Молодые птицы бурые с пестринами. Полет довольно быстрый.

Гнездится в тростниках и кустарниках у озер и прудов Европейской части России и Западной Сибири. В кладке 5-9 белых яиц. Попадает на глаза очень редко, обычно во время пролета, когда пережидает дневное время на дереве или кусте.



**Амурский волчок [57] —
Ixobrychus eurhythmus
(Таблица 5)**

Спина и голова каштановые, крылья зеленовато-серые с темными концами. У самок и молодых на спине темные и светлые пестрины. Клюв бурый с желтым, ноги зеленоватые. Полет довольно медленный.

Гнездится на земле по сырым лугам и травяным болотам юга Дальнего Востока и Забайкалья, может жить даже на деревенских прудах, но на глаза попадает очень редко, разве что в сумерках. В кладке 3-5 белых яиц.

Китайский волчок [58] — *Ixobrychus sinensis*

(Таблица 5)

Спина буро-серая, голова рыжеватая с темной шапочкой, крылья желтоватые с черными концами. Ноги розоватые, клюв бурый, на боках черные пятна. Полет довольно быстрый.

Гнездится на заболоченных низменностях южного Сахалина, Южных Курил и, возможно, Южного Приморья.

В Приморье залетает китайский **коричневый волчок** — *Ixobrychus cinnamomeus* [59], похожий на амурского волчка [57], но окраска более контрастная, верх коричневый, низ рыжий, крылья целиком каштановые. В некоторых изданиях он назван “охристый волчок”.

5.3. Семейство Ибисовые — *Threskiornitidae*

Крупные птицы болот и мелководий с длинными ногами, шей и клювом характерной для разных родов формы. Полет почти всегда машущий, шея и ноги вытянуты. Стаи выстраиваются в ровную цепочку.


Гнездятся колониями на деревьях и в зарослях тростника, часто вместе с цаплями и бакланами. Гнезда из стеблей и веток. Кормятся на отмелях мелкими беспозвоночными, чаще в сумерках и ночью.

В России встречаются виды четырех родов, все очень редкие.

5.3.1. Род Колпицы — *Platalea*

В России один или два вида.

Колпица [60] — *Platalea leucorodia*
(Таблица 5)



Белая птица с плоским прямым клювом, расширенным на конце в виде круглой лопатки. На голове у взрослых желтоватый хохол, клюв черный с желтым кончиком. У молодых концы крыльев черные, клюв красноватый.


Гнездится в плавнях Предкавказья, дельты Волги, Тувы и, возможно, юга Дальнего Востока. Питается, опустив клюв в воду и вода им из стороны в сторону. В кладке 3-4 белых с красно-бурыми пятнами яиц.

Занесена в Красную книгу России, у нас сохранилось всего несколько сотен пар.

На юг Приморья, возможно, залетает чрезвычайно редкая малая колпица — *Platalea minor*, гнездящаяся в немногих сохранившихся колониях на северо-западе Кореи. Она отличается полностью черными клювом и лицевой частью головы. Общая численность в мире, вероятно, около 50 птиц.

5.3.2. Род Каравайки — *Plegadis*

В России один вид.



**Каравайка [61] —
Plegadis falcinellus
(Таблица 5)**

Темно-коричневая с металлическим блеском птица. Клюв тонкий, изогнутый вниз. От куликов-кроншнепов [281-287] отличается однотонно темной окраской без пестрин. Голова, шея и брюхо красноватые, крылья и хвост зеленовато-черные. Зимой и у молодых оперение без блеска.

Гнездится в дельтах рек и на больших озерах Предкавказья и Прикаспия. Кормится стайками на илистых отмелях, иногда вылетает в степи за саранчой. В кладке 3-5 ярко-голубых яиц.

Занесена в Красную книгу России.

5.3.3. Род Японские ибисы — *Nipponia*

В Приамурье и Приморье в прошлом гнезился, а в последние десятилетия, возможно, лишь изредка залетает **красноногий ибис** — *Nipponia nippon* [62], (Таблица 5). Белая птица с тонким, изогнутым книзу клювом, черным с красным кончиком. На затылке хохол. Верхняя сторона головы голая, с

ярко-красной кожей. Ноги красные. Летом верх и голова сероватые, осенью и зимой оперение взрослых птиц розоватое.

Гнездится на деревьях среди заболоченных низменностей. Одна из самых редких птиц мира, общая численность в Японии и Китае не более 50. Занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

5.3.4. Род Белые ибисы – *Threskiornis*

Белые птицы с голыми черными головой и шеей. Клюв тонкий, загнутый книзу, черный. В Россию очень редко залетают два вида.

Священный ибис [63] — *Threskiornis aethiopica* с черными кончиками первостепенных маховых перьев, гнездящийся в Африке и южном Ираке, залетал в дельту Волги. Название "священный" связано с тем, что в Древнем Египте эта птица считалась земным воплощением бога познания Тота.

Черноголовый ибис [64] — *Threskiornis melanocephala* с полностью белыми крыльями, гнездящийся в Индии и Китае, залетает в Приморье.

5.4. Семейство Фламинговые – *Phoenicopteridae*

Клюв относительно короткий, массивный, изогнут вниз. Пальцы соединены плавательной перепонкой. В России один редкий вид.

5.4.1. Род Фламинго – *Phoenicopus*

Розовый фламинго [65] — *Phoenicopus roseus*
(Таблица 19)

Крупная, крупнее гуся, бледно-розовая птица с очень длинными, тонкими ногами и шеей (в полете вытянута). Клюв, ноги и заметные только в полете части крыльев красные, концы крыльев и клюва черные. Молодые буровато-серые.

Гнездится колониями на мелководьях соленых озерах Казахстана, побережьях Каспия. Гнездо представляет собой башневидное сооружение из ила высотой до полуметра. В кладке 1-2 белых яйца. На осеннем пролете регулярно встречается на побережье Дагестана, залетает в районы, пограничные с Казахстаном, и очень редко в Среднюю полосу. Питается в основном планктоном, который отцеживает из воды с помощью специального фильтра в клюве, сходного с таковым у уток. Пигменты, содержащиеся в микроскопических водорослях, которыми питается фламинго, придают его оперению розовую окраску. Голос — негромкий гогот.

Редок, занесен в Красную книгу России.

Примечание. Фламинго занимают как бы промежуточное положение между Аистообразными и Гусеобразными, в связи с чем их иногда считают особым отрядом Фламингообразных — *Phoenicopteriformes*.

6. Отряд Гусеобразные — *Anseriformes*

Дважды в год Господь посылает москвитам перелет дичи, коего и вообразить себе нельзя, не увидав. Тучи лебедей, гусей и прочей птицы наполняют небеса денно и нощно. Даже беднейшие из жителей Москвы обедают в эти дни дичью, сотнями возов доставляемую из ближних предместий, славя милость Создателя. Умелые охотники бьют гусей и уток прямо со дворов городских. Река под Кремлем черна бывает от водной птицы".

Густав фон Клаусбург. Путешествие в Московию, Валахию и Литву.

Хотя такое количество дичи под Москвой уже давно не увидишь, кое-где осенний пролет гусеобразных по-прежнему остается впечатляющим явлением природы. Из птиц России к этому отряду относятся лебеди, гуси, казарки, утки и крохали.

У уток клюв плоский, края его усажены тонкими пластинками (другое название отряда — пластинчатоклювые), образующими своего рода сито для процеживания воды. Язык служит "поршнем насоса", который всасывает воду с планктоном и затем проталкивает ее сквозь пластинки закрытого клюва, отсеживая лишнюю воду и отправляя пищу в глотку. У гусей, лебедей и казарок клюв более массивный (короткий и толстый), не так уплощен и больше приспособлен к питанию растениями. У рыбадных крохалей клюв узкий, с крючком на конце. Пластинки по краям клюва у них превратились в зубчики, более пригодные для удерживания рыбы.

Хотя все птицы этого отряда в общем похожи и относятся к одному семейству, их биология довольно разнообразна. Полет машущий. Шея в полете вытянута. Самцы несколько

крупнее самок. У многих видов уток на крыле несколько ярко окрашенных, часто с металлическим блеском, второстепенных маховых перьев. Это так называемое зеркальце, цвет которого часто служит видовым признаком. Три передних пальца соединены перепонкой.

Гнезда строят чаще на земле у воды, но некоторые виды гнездятся в дуплах деревьев или на скалах, и тогда только что вылупившиеся утята бесстрашно прыгают вниз, парашютируя лапами и крыльями. Некоторые виды устраивают гнезда в норах. Самки обычно выстилают гнездо пухом, который выщипывают у себя на брюшке. Уходя с гнезда, насиживающая птица прикрывает кладку этим пухом, чтобы защитить ее от переохлаждения и замаскировать.

У ряда видов гусеобразных при летней линьке маховые перья выпадают почти одновременно, и птицы частично или полностью теряют способность к полету. В этот период самцы собираются в стаи и откочевывают в глухие места, в густые водные заросли или, наоборот, на большие водоемы, где спасаются от наземных хищников. Иногда эти кочевки принимают характер массовых перелетов, например, гуси-гуменники с Южного острова Новой Земли улетают линять на Северный. Самки линяют в то время, когда водят выводки. Гуси и лебеди линяют один раз в году, большинство видов уток два раза, а некоторые из них, например морянки, три раза.

Большинство гусеобразных — перелетные птицы, но часть особей многих видов иногда остается зимовать на незамерзающих водоемах.

В прошлом на Севере практиковалась хищническая охота на линных гусей. Вместе с отстрелом на пролете и мелиорацией в местах зимовок это привело к тому, что большинство видов лебедей, гусей и казарок оказалось в Красной книге.

В России гусеобразные — самая многочисленная группа водоплавающих птиц, их у нас 14 родов и около 60 видов.

6.1. Семейство Утиные — *Anatidae*

6.1.1. Род Лебеди — *Cygnus*


Очень крупные белые птицы с длинной тонкой шеей. Ноги у взрослых черные. Молодые серые. С воды взлетают с разбега. Нырять не могут, кормятся, погружая в воду шею или переднюю часть тела.

Обитатели озер, рек, берегов морей. Выводок водят оба партнера. Питаются водной растительностью. Лебеди очень рано прилетают с зимовок и поздно улетают на юг.

Про лебедей существует множество легенд и сказок. Их ежегодная линька у многих народов считалась символом обновления. В самых различных странах распространены легенды о способности этих птиц превращаться в прекрасных девушек, сбрасывая на время птичью кожу.

В России четыре вида, в основном отличающихся формой и окраской клюва. При некоторой наблюдательности детали его окраски позволяют узнавать даже отдельных птиц.

Лебедь-кликун [66] —
Cygnus cygnus
(Таблица 6)



Клюв желтый с черным кончиком, причем желтый цвет заходит вперед за ноздри. У молодых голова и шея буроватые, брюхо белое, клюв и ноги розоватые. Плавает обычно, держа шею вертикально.

Гнездится отдельными парами на зарастающих озерах от тундры до лесостепи. Гнездо — крупная постройка из мха, травы или тростника на мелководье у берега или на островке. В кладке 4-6 белых или желтоватых яиц. Зимует на побережьях морей, иногда на незамерзающих озерах юга России. Голос — громкое трубное "ганг-го...ганг-го".

На Дальнем Востоке возможны залеты крайне редкого североамериканского лебедя-трубача — *Cygnus buccinator*, очень похожего на кликуна, но с полностью черным клювом.


Малый лебедь [67] —
Cygnus bewickii
(Таблица 6)



Похож на лебедя-кликун [66], но заметно меньше, шея и клюв короче, желтый цвет на основании клюва не доходит до ноздрей, а передний край желтого пятна обычно почти вертикальный. У молодых птиц кончик клюва темно-серый.

Гнездится на озерах в низменных тундрах и заболоченной лесотундре к востоку от полуострова Канин. Гнездо из мха и осок на кочке или сухом островке у берега. В кладке 3-4 желтоватых яйца. Голос слабее, и звонче, чем у кликуна.


Редок, занесен в Красную книгу России.



Американский лебедь
[68] — *Cygnus columbianus*
(Таблица 6)

Похож на малого лебедя, но желтого цвета на клюве еще меньше: только пятно перед глазом, иногда клюв совсем черный. У молодых птиц шея и голова не буроватые, а серые.

В небольшом количестве гнездится в тундрах Чукотского полуострова, на пролете изредка встречается у Командорских островов. Редок, занесен в Красную книгу России.



Лебедь-шипун [69] —
Cygnus olor
(Таблица 6)

Самый крупный из лебедей. Иногда на голове и шее заметен рыжеватый налет. Клюв красный с черным кончиком и основанием, на лбу черный шишковидный нарост, хвост слегка клиновидный, лапы черные. У молодых клюв розовый с черными кончиком и основанием, нароста на клюве нет. Брюхо буроватое, ноги красные. В полете характерно менее острое крыло, чем у других лебедей (первые два первостепенных маховых пера почти одинаковой длины). У сидящей на воде птицы шея (более толстая, чем у других видов лебедей) изогнута в виде буквы S, а крылья иногда приподняты.

Гнездится в тростниковых зарослях на озерах и в дельтах рек северо-запада и юга России и Дальнего Востока. Гнездо из стеблей тростника строит на заросших водоемах. В кладке 6-8 голубоватых яиц. Зимует на побережьях морей. Голос

Гнездится в тростниковых зарослях на озерах и в дельтах рек северо-запада и юга России и Дальнего Востока. Гнездо из стеблей тростника строит на заросших водоемах. В кладке 6-8 голубоватых яиц. Зимует на побережьях морей. Голос

тихий и хриплый. Довольно редок. В качестве парковой птицы часто содержится в городах, как и австралийский **черный лебедь** — *Cygnus atratus*.


6.1.2. Род Гуси — *Anser*

Птицы размером с домашнего гуся или мельче; серо-бурой, серо-голубой, реже белой окраски; с розовыми, оранжевыми или желтыми лапами. Летящая стая обычно выстраивается клином или шеренгой.

Кормятся в основном на суше молодыми побегами и корневищами наземных и водных растений. Ныряют только в случае опасности. Очень осторожные птицы, но во время насиживания близко подпускают человека. Гнездо — ямка с выстилкой из травы и пуха, в кладке 3-6 белых или желтоватых яиц.

Гуси наиболее многочисленны в тундрах и лесах Севера, где их прилет означает наступление весны. У северных народов гуси издавна считались символом неба, солнца, судьбы. На пролете они из года в год останавливаются в одних и тех же местах. В России восемь видов.

Серый гусь [70] —
Anser anser
(Таблица 6)



Размеры с домашнего гуся. Окраска серая, подхвостье белое, клюв и лапы розовые. На брюхе у взрослых птиц черные пятна (в полете плохо заметны). Передняя часть крыла в полете кажется светлой.

Гнездится отдельными парами на больших заросших озерах и болотах, в основном в тайге и лесостепи. В негнездовое время кормится на полях и лугах. Во время пролета собирается в большие стаи. Очень осторожен. Голос как у домашнего гуся.

В прошлом был одной из основных промысловых птиц России. В последние годы он стал более редок, особенно в Европейской части. Серый гусь является предком домашних гусей европейских пород.



Гуменник [71] — *Anser fabalis*
(Таблица 6)


Похож на серого гуся, но голова и шея темные, что хорошо заметно и у летящей птицы, спина и над-

хвостье темно-бурые, клюв черный с оранжевой поперечной полосой, лапы оранжево-розовые.

Гнездится отдельными парами по озерам, болотам, берегам рек в низменной кустарниковой тундре и в тайге. На пролете встречается по берегам водоемов, на полях и в степи. Тундровые гуменники обычно отличаются от таежных более светлым клювом (оранжевая полоса вдоль края надклювья доходит почти до углов рта). Голос — гогот, более протяжный, чем у серого гуся.

Один из основных охотничьих видов, особенно на Севере.

На берегах Баренцева моря может быть встречен **короткоклювый гуменник** — *Anser brachyrhynchus*, гнездящийся в Исландии и на Шпицбергене. От гуменника, молодых белолобого гуся и пискульки [73] он отличается более светлой окраской и розовыми ногами, от серого гуся — темными головой и шеей, коротким клювом с черным верхом. Голос как у гуменника, но выше.



Белолобый гусь [72] — *Anser albifrons*
(Таблица 6)

Похож на серого гуся [70], но заметно мельче, на лбу у взрослых птиц белое пятно, клюв и лапы крас-

новато-желтые. В полете отличается более частыми взмахами крыльев, хорошо заметными черными поперечными пятнами на брюхе (у взрослых).

Гнездится на озерах в сухой низменной тундре (чаще кустарниковой), иногда в лесотундре, на пролете может быть встречен практически на всей территории России. Голос — визгливое отрывистое гоготание.

Ценный охотничий вид (охотники часто называют его белолобой казаркой).

Пискулька [73] — *Anser erythropus*

(Таблица 6)

Очень похожа на белолобого гуся, но еще мельче, темнее, клюв короткий; у взрослых белое пятно на лбу заходит на темя, а вокруг глаз узкое желтое кольцо. В полете кажется более острокрылой.

Гнездится на озерах или среди камней и скал в тундре и лесотундре, чаще у края леса, на пролете встречается по всей территории. Голос очень высокий и визгливый.

В последние годы стала редкой и занесена в Красную книгу России. К сожалению, лишь немногие охотники способны отличить пискульку от белолобого гуся, и ее продолжают отстреливать во время пролета.




Сухонос [74] — *Anser cygnoides*


(Таблица 6)

Размером с серого гуся [70]. Общий тон окраски буровато-серый. Горло, шея спереди и брюхо белые, голова и задняя сторона шеи темные. Шея тонкая и длинная, ноги оранжевые, клюв длинный, черный. Полет кажется тяжелым, как у лебедя.

Гнездится отдельными парами и небольшими группами по берегам и островам озер, реже по горным рекам Читинской области, Приамурья и Сахалина, кормится на полях и лугах. Голос — звонкий протяжный гогот.

У нас сохранилось всего несколько сотен пар, поэтому сухонос занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Предок азиатских пород домашних гусей. Если у домашнего гуся длинный черный клюв и темная полоса вдоль верхней стороны шеи, скорее всего, это потомок сухоноса.






Горный гусь [75] —
Anser indicus
(Таблица 6)

Несколько мельче домашнего гуся. Пепельно-серый с буро-белой шеей, черными концами крыльев, желтыми лапами и клювом. Голова белая с двумя черными (у молодых птиц — серыми) поперечными полосками на темени. Полет легкий, маневренный.

Гнездится небольшими колониями по берегам горных озер, чаще на скалах, но иногда на деревьях и тогда строит гнездо из мелких веток, что совершенно не характерно для других видов гусей. Обитатель гор Центрального Алтая и Тувы. Голос — звонкий трубный крик.

Чтобы достичь районов зимовки в Северной Индии, горным гусям приходится преодолевать высочайшие горные цепи Земли с их свирепыми ледяными ветрами и снежными бурями. В это время для них отмечена наибольшая из всех птиц высота перелетов — свыше 9000 метров.

Занесен в Красную книгу России. У нас сохранилось всего несколько десятков пар.



Белый гусь [76] —
Anser caerulescens
(Таблица 6)

Заметно мельче домашнего гуся. Окраска чисто-белая с черными (в отличие от лебедей) концами крыльев. Очень редко встречаются также серо-голубые птицы со светлыми каемками перьев, белыми головой, шеей и подхвостьем. Лапы и клюв розовые, клюв с темными пятнышками по бокам и белым кончиком. У молодых верх и голова буровато-серые, брюхо белое, клюв и лапы серые.


Обитает в сухих тундрах к востоку от Индигирки. Образует гнездовые колонии, самая крупная из которых, не только в России, но и в мире, находится на острове Врангеля. Голос — звонкий гогот.

Хотя на острове Врангеля сохранилось около 100 тысяч пар белого гуся, это последнее постоянное гнездовье в на-

шей стране. На материке он крайне редок и поэтому занесен в Красную книгу России.

На остров Врангеля в стаях белых гусей залетает канадский гусь *Росса* — *Anser rossii* [77], очень на них похожий, но меньше, с более коротким клювом без темных пятнышек по бокам. Молодые очень светлые, с розовыми ногами, голос более тихий.

Белошей [78] — *Anser canagicus*
(Таблица 6)



Мельче серого гуся [70], окраска серо-голубая с поперечным чешуйчатым рисунком, голова и задняя сторона шеи чисто-белые, у молодых серые. Подхвостье темное. Клюв желто-розовый с черным кончиком (у молодых черный), ноги оранжевые.

Гнездится в низменных приморских тундрах Восточной Чукотки. Зимует в море у Командорских островов. Питается в основном морскими беспозвоночными, реже зеленью и ягодами. Голос — громкий двусложный крик. Мясо с резким неприятным запахом.

Всюду редок, численность в нашей стране всего несколько тысяч пар. Занесен в Красную книгу России.


6.1.3. Род Казарки — *Branta*

Похожи на небольших гусей [73, 76-78], но контрастнее и темнее, в окраске много черного и белого цветов, клюв и лапы черные.

Гнездятся небольшими колониями и отдельными парами в сухих тундрах и на берегах морей, на пролете и зимовках встречаются на низменных морских побережьях, реже на больших озерах. Гнездо — ямка с выстилкой из пуха на открытом сухом месте. Казарки часто селятся рядом с гнездами белых сов, кречетов и сапсанов, которые, отгоняя песцов и других хищников от своих гнезд, обеспечивают защиту и гнездам казарок (хищные птицы обычно не охотятся в непосредственной близости от своего гнезда).

В негнездовое время держатся стаями. В отличие от гусей, летящие птицы часто нарушают строй и сбиваются в беспорядочную стаю. Питаются травой, водорослями, реже мелкими беспозвоночными.

В России пять редких видов.




Черная казарка [79] —
Branta bernicla
(Таблица 6)

Заметно мельче домашнего гуся. Голова и шея черная с узким белым ошейником, спина черно-бурая, брюхо светлое. У молодых шея полностью черная, перья спины с белыми каемками.

Гнездится по берегам арктических морей от полуострова Канин и на восток до реки Хатанга, на пролете встречается на больших озерах северо-запада, беломорском и балтийском побережьях. В кладке 3-6 охристых яиц. Голос — негромкое "уонг".

В прошлом один из самых многочисленных видов гусей. В 30-х годах из-за массового заболевания морской травы-зостеры (основной корм казарок на западноевропейских зимовках) стала очень редкой. Сейчас численность несколько возросла, в основном благодаря охране в Западной Европе. Занесена в Красную книгу России.



Американская казарка
[80] — *Branta nigricans*

Очень похожа на черную казарку, но брюхо совсем темное, на боках с белыми полосками. Молодые почти полностью черные с белым подхвостьем.


Гнездится на арктическом побережье Якутии и Чукотки, на пролете встречается в восточном секторе Центральной Арктики и в Восточной Сибири. В последние десятилетия стала редка, а из многих районов исчезла. Перестает гнездиться повсюду, где есть поселения человека, в частности,

из-за хищничества ведущих летом бродячий образ жизни ездовых собак.

Казарки Якутии и Чукотки летают зимовать в Калифорнию через Центральную Арктику и Канаду. Их пролет над Арктическим побережьем к северу когда-то считался одним из доказательств существования легендарной Земли Санникова.

Занесена в Красную книгу России.

Белошекая казарка
[81] — *Branta leucopsis*
(Таблица 6)




Несколько крупнее черной казарки [79]. Лоб, щеки, и низ тела белые (у молодых с буровой рябью); верх, шея и зоб черные (у молодых бурые).

Гнездится в приморских тундрах крайнего северо-востока Европейской части России, Вайгача и Новой Земли. В кладке 3-6 желтоватых яиц. Голос похож на громкий хриплый лай.

На материковом побережье в 60-70-х годах практически исчезла, хотя в последние годы снова расселяется и постепенно восстанавливает численность. Занесена в Красную книгу России.


Канадская казарка
[82] — *Branta canadensis*
(Таблица 6)



Голова и шея черные, горло и щеки белые. На брюхе темные поперечные полосы, на шее тонкий белый ошейник. У молодых на горле черная поперечная полоса.

Залетает с Аляски на север Якутии, острова Врангеля и Беринга, Чукотку, Камчатку, где, возможно, гнездится. Планируется завезти ее на Командорские и Курильские острова, где она гнездилась в прошлом. Более крупный канадский подвид, размером с домашнего гуся, без белого ошейника, завезен в Скандинавские страны; возможно его появление

на Белом и Балтийском морях, известен случай гнездования на Ладожском озере. Голос — трубный крик у крупного под-вида и более звонкий — у мелкого.



Краснозобая казарка
[83] — *Branta ruficollis*
(Таблица 6)

Голова, шея сзади, спина и брюхо черные (у молодых птиц темно-серые), пятна по бокам клюва, бока и подхвостье белые, зоб и передняя сторона груди и шеи каштаново-рыжие. Шея и клюв сравнительно короткие.

Обитатель берегов тундровых рек Ямала, Гыдана и Таймыра. Гнездится группами до 10 пар, часто в непосредственной близости от гнезд сокола сапсана, близость которого обеспечивает им защиту от других хищников. В кладке 3-8 оливково-зеленоватых яиц. На пролете встречается на озерах и берегах морей, реже на лугах и в степи. В некоторые годы зимует на озере Маныч и в Прикаспии. Голос — отрывистый звонкий гогот.

За пределами нашей страны этот красивейший из гусей мира встречается только на пролете и зимовках. Занесена в Красную книгу России.


6.1.4. Род Красные утки — *Tadorna*

Крупные яркоокрашенные, высокие на ногах утки, некоторыми чертами поведения напоминающие гусей. Легко передвигаются по суше.

Гнездятся в основном в степях и пустынях, в глубоких норах лис, барсуков и сурков (иногда жилых), реже в заброшенных строениях, нишах скал. Изредка строят открытые гнезда под прикрытием кустарников и деревьев. Выстилка из белого пуха. В кладке 7-12 кремовых яиц. Кормятся на пресных и соленых озерах, реках, морских заливах, где встречаются стаями. Почти не ныряют. Полет быстрый, с резкими взмахами крыльев. Пары не распадаются в течение всего гнездового сезона.

В России три вида.


Огарь [84] — *Tadorna ferruginea*
(Таблица 7)



Размером с домашнюю утку. Общий тон окраски ярко-рыжий, голова светло-охристая, зеркальце зеленое. Верхние кроющие крыла белые (у сидящей птицы они видны как белое пятно на передней части крыла), концы крыльев черные. Самец отличается по тонкому черному ошейнику. Ноги и клюв черные.

Гнездится на соленых и пресных озерах в степях, безлесных горах и полупустынях от Азовского моря до Забайкалья и Приамурья. Иногда образует небольшие колонии. Питается водными беспозвоночными, водорослями. В некоторых городах разводится как парковая птица. В центре Москвы нередко можно увидеть огарей, разгуливающих по крышам домов. Голос — звонкое гортанное "аанг".

Пеганка [85] — *Tadorna tadorna*
(Таблица 7)



Крупная утка. Белая с черными головой и шеей, ярко-рыжей полосой на груди и плечах, черно-белыми крыльями, красным клювом (у самца с наростом на лбу), розовыми ногами. Молодые с серовато-бурым верхом.

Гнездится на Балтийском и, с недавнего времени, на Белом море, на юге в степной и лесостепной зонах от Азовского моря до Забайкалья, по окрестностям соленых озер. Питается водными беспозвоночными животными — мелкими моллюсками, ракообразными, реже водорослями. Голос — глухое кряканье и тихий, но резкий свист.

Пух из гнезд по качеству близок к гагачьему и в некоторых странах Западной Европы заготавливается.

В Приморский край залетала хохлатая пеганка — *Tadorna cristata* [86], (Таблица 7), серая с черно-белым крылом, черными зобом, верхом головы и хохлом на затылке, рыжеватым брюхом и подхвостьем и желтым клювом. Одна из самых за-

гадочных птиц мира, известна лишь по нескольким экземплярам, места гнездования не найдены. В прошлом, вероятно, была обычным видом, поскольку изображена на некоторых средневековых японских и китайских рисунках. По-видимому, хохлатая пеганка уже вымерла. Занесена в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

6.1.5. Род Речные утки – *Anas*

Размером мельче домашней утки. Задний палец без кожистой лопасти. На крыле у большинства видов яркое блестящее зеркальце, образованное кроющими второстепенных маховых перьев. В отличие от так называемых нырковых уток [99-120], посадка на воде высокая, хвост поднят вверх. Практически не ныряют, а лишь погружают в воду переднюю часть тела. Взлетают почти вертикально, без разбега, как с воды, так и с суши. Полет быстрый, уверенный, летящие птицы часто выстраиваются цепочкой или сбиваются в плотную стаю.


Селезни (самцы уток) у большинства видов окрашены ярко и характерно; наряд самок, за редким исключением, намного скромнее, и в природе они часто трудноразличимы. Хорошо заметные в начале сезона гнездования пары распадаются, как только самки начинают насиживать кладку. Самцы собираются в линные стаи, скапливаясь, как правило, в самых укромных и малопосещаемых местах, и ведут себя очень скрытно. К середине лета, после окончания летней линьки, селезни бывают похожи по окраске на самок.

Питаются планктоном, мелкими беспозвоночными и водной растительностью. Населяют различные водоемы — болота, озера, реки, морские заливы. Гнезда устраивают, как правило, на земле на сухом месте или среди воды на кочке; часто в высокой траве, кустах или буреломе.

Лоток гнезда выстилается пухом и мелкими перьями, которые могут помочь в определении вида. Насиживающая самка затаивается, иногда подпускает человека вплотную. Выводок водит только самка.

В России 12 видов, изредка встречаются межвидовые гибриды.

Кряква [87] — *Anas platyrhynchos*
(Таблица 8)




Самая многочисленная утка России. Крупная, чуть мельче домашней утки. У самца в брачном наряде голова и шея черные с зеленым отливом, грудь коричневая, клюв желто-зеленый (в конце лета зеленоватый), лапы оранжевые, зеркальце фиолетовое. На шее снизу белый ошейник. Центральные перья хвоста завиты колечками вверх. Самка рыжевато-бурая с более светлым брюхом, зеркальце синее, клюв розоватый с темной серединой.

Распространена от южных тундр до степей. Кряква — наиболее пластичный вид уток, она способна приспосабливаться к самым различным условиям обитания. Как правило, гнездится по заросшим озерам, берегам рек, болотам и сырым лугам. Изредка использует старые гнезда ворон и цапель на деревьях, дупла с широким входом. Кладка из 7-12 зеленовато-белых яиц. Чаше других уток зимует во внутренних районах страны, особенно в городах. Голос как у домашней утки, предком которой является.

Один из основных объектов охоты.


Черная кряква [88] — *Anas poecilorhyncha*
(Таблица 8)



Размером с крякву. И самец, и самка окрашены сходно и похожи на самку кряквы, но заметно темнее.

Зеркальце сине-зеленое, позади него белое пятно, заметное у сидящих и летящих птиц. Клюв черный с желтым кончиком. Бока головы более светлые с хорошо заметной темной полоской через глаз.

Обитает на открытых озерах, болотах и реках Забайкалья и юга Дальнего Востока. Гнездо похоже на гнездо кряквы. В кладке 7-10 зеленоватых яиц. Встречается довольно редко.




Серая утка [89] — *Anas strepera*
(Таблица 8)

Немного мельче кряквы [87]. Самец серый с мелким струйчатым рисунком, зеркальце черно-белое, клюв

серый, лапы желтые. Самка похожа на самца, но основной тон окраски буроватый. От самки кряквы отличается также светлым брюхом. Крылья в полете коричневые с белыми пятнами по заднему краю.

Гнездится на заросших озерах южной части страны, обычно в степях и лесостепях. В кладке 7-11 желтоватых яиц. С зимовки прилетает позже других речных уток. Голос самца похож на карканье ворона, самки — резкое кряканье. Полет шумный, птицы в стае постоянно переговариваются тихим кряканьем.



Свиязь [90] — *Anas penelope*
(Таблица 8)

Заметно мельче кряквы [87]. Самец светло-серый с мелким струйчатым рисунком, голова коричневая с

желтым верхом, брюхо белое, зеркальце зеленое. Самка отличается бурой головой и грудью, фиолетовым зеркальцем. Клюв и лапы серые. В полете заметны белые пятна на крыльях (светло-серые у самки).

Обычна на заросших речках и озерах от тундр до степной зоны. В кладке 7-11 чисто-белых яиц. Питается в основном побегами водных растений. Голос селезня — резкое свистящее "свии-у", самки — трескучее кряканье "керр".

Важный объект охоты.

На Командоры и Чукотку залетала американская свиязь — *Anas americana* [91], похожая на свиязь, но голова самца серая с зеленой полосой от глаза, самки отличаются чисто-белыми подмышечными перьями без серых пестрин и сероватой головой. Голос селезня — мягкий двусложный свист.

Шилогвость [92] —***Anas acuta***

(Таблица 8)

Немного мельче кряквы [87]. Шея длинная и тонкая, хвост острый, шиловидный, клюв и лапы темно-серые. У самца темно-коричневая голова, зеркальце зеленое с бронзовым отливом, в полете бросаются в глаза белое брюхо и грудь, шея заметно опущена. Самка буровато-серая с зеркальцем без блеска.

Гнездится на заросших водоемах, сырых лугах, тундровых озерах почти по всей стране, обычна в лесотундре и других открытых ландшафтах. В кладке 7-11 оливковых или голубоватых яиц.

Важный объект охоты, особенно на Севере и в Западной Сибири, где шилогвость наиболее многочисленна.


**Касатка [93] — *Anas******falcata***

(Таблица 8)

Мельче кряквы [87]. У самца весной на голове длинный хохол, на крыльях удлинённые свисающие перья-косицы, голова зелено-коричневая, зеркальце серо-зеленое. Самка похожа на самку кряквы, но зеркальце темно-серое. Клюв и лапы темные, почти черные.


Гнездится по озерам, речным протокам и болотам в лесах и лесостепи восточнее Енисея. В кладке 7-10 розовато-белых яиц. Голос селезня — короткий свист, переходящий в тихое дребезжание, самки — хриплое кряканье.

Объект охоты на востоке страны.

**Чирок-клоктун [94] —*****Anas formosa***

(Таблица 8)


Мелкая утка, почти вдвое мельче кряквы [87]. У самца на голове сверху полутунное зеленое и, ниже два кремовых



пятна, разделенных черной полосой, верх головы и горло черные. Грудь розоватая в темную крапинку. Бока серые, брюхо светлое. Зеркальце двухцветное, черно-зеленое, клюв темно-серый, лапы буровато-оливковые. Самка темно-бурая с рыжеватыми каймами перьев, по бокам клюва светлые округлые пятна.

Обитатель различных водоемов от тундр до степей к востоку от Енисея. В кладке 6-10 желтовато-белых яиц. Голос селезня — глухое частое "клок-клок-клок", самки — дребезжащее кряканье.

В последние годы численность резко сократилась, и теперь этот вид, еще недавно промысловый, занесен в Красную книгу России.



Чирок-свистунок [95] —
Anas crecca
(Таблица 8)

Намного мельче кряквы [87]. Голова селезня каштановая с блестящей темно-зеленой полосой через


глаз, грудь розоватая с темными пятнышками, зеркальце ярко-зеленое с черным. Самка бурая с рыжеватыми пестринами, зеркальце ярко-зеленое. Клюв темно-серый, лапы оливковые. Полет очень быстрый, летят беспорядочной стаей. Может взлетать с воды и суши почти вертикально вверх.

Наиболее многочисленен в лесной и лесостепной зонах России, реже встречается в лесотундре и тундре. Чаще всего гнездится по берегам заросших лесом ручьев и небольших речек, на озерах, болотах, старых карьерах и дренажных канавах, заливных лугах. В кладке 8-12 охристо-белых яиц. Голос селезня — отрывистый короткий свист, самки — визгливое кряканье.

Один из основных объектов охоты.

На Чукотском полуострове встречается североамериканский подвид чирка-свистунка, который некоторые зоологи считают самостоятельным видом **зеленокрылый чирок** — ***Anas carolinensis***. Селезнь у этого подвида без белой полосы на крыле и с поперечной белой полоской на боках груди, самка в природе неотличима.

Чирок-трескунок [96] —
Anas querquedula
 (Таблица 8)



Размером с чирка-свистунка [95]. Голова селезня коричневая с белой полосой над глазом, спина и грудь бурые, брюхо белое, зеркальце зеленое. Самка светло-бурая с пестринами, зеркальце матовое, зеленое без блеска. Крылья голубовато-серые, клюв черный, лапы серые.


Гнездится на заросших озерах и травяных болотах, от севера таежной зоны до степи и лесостепи, где обычен. В кладке 7-12 светлых яиц. Голос — тихий скрипучий треск, у самки — дребезжащее кряканье. Важный охотничий вид.

Мраморный чирок [97] — *Anas angustirostris*
 (Таблица 8)

Мелкая утка, размером с чирка-свистунка [95]. Окраска самца и самки сходна, серовато-бурая с округлыми светлыми пятнами по всему телу, темным поперечным рисунком на зобу и относительно узким длинным клювом, серым у самца и черным у самки. Вокруг глаз к затылку тянется буроватое пятно, более светлое у самки. Лапы бурые. Иногда садится на ветки кустов и деревьев.

Очень редкая, практически исчезнувшая птица мелких озер Прикаспийской полупустыни. Гнезда устраивает как на земле, так и в дуплах прибрежных деревьев или на ветвях. В кладке 7-12 палевых или буроватых яиц. Крупных стай не образует. Голос — тихое низкое кряканье. Занесен в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Широконоска [98] —
Anas clypeata
 (Таблица 8)



Легко отличима от других уток по очень длинному и непропорционально широкому клюву. Голова и


шея селезня черные, грудь белая, брюхо и бока рыжие, клюв черный. Самка бурая с пестринами, клюв бурый. Зеркальце зеленое, лапы оранжевые. В полете видны черные концы крыльев и голубоватые кроющие второстепенных маховых. На воде заметна короткая шея, в полете — рыжее пятно на брюхе. Летит сравнительно медленно.

Гнездится по сильно заросшим озерам и рекам повсюду от южных тундр до степи и лесостепи, где обычна. В кладке 7-11 желтоватых яиц. Голос селезня — глухое "кво-кво-кво", самки — тихое кряканье.

Важный объект охоты, особенно на юге России.

6.1.6. Род Красноносые нырки — *Netta*

Один вид, занимающий промежуточное положение между речными и так называемыми нырковыми утками.



Красноносый нырок
[99] — *Netta rufina*
(Таблица 7)

Размером с крякву [87], на заднем пальце кожистая лопасть. У плывущей птицы хвост опущен. У селезня короткий пушистый округлый хохол, так что голова кажется очень большой. Голова и верх шеи красновато-рыжие; зоб, грудь и брюшко черные; бока белые, клюв ярко-оранжевый, лапы красные. Самка бурая со светлыми щеками и брюшком, на голове темная шапочка, клюв темный с красноватой вершиной, лапы красновато-бурые. Глаза красные. Полет быстрый, шумный, взлетает тяжело, крылья у летящей птицы белые с коричневым передним краем.

Гнездится отдельными парами и небольшими колониями по берегам заросших тростником озер с глубокими плесами, зимует на морских побережьях. Многочислен в степях и полупустынях. Гнездо обычно устраивает в зарослях прибрежной растительности. В кладке 6-9 серовато-оливковых яиц. При колониальном гнездовании несколько самок могут откладывать яйца в одно гнездо, и их количество может дохо-

дить до 30. Насиживающая утка при приближении человека тихо уходит, не пытаясь отвести его от гнезда. Самцы долго держатся поблизости от гнезд, затем собираются на линьку на большие озера. Питается водными растениями. При кормлении ныряет или переворачивается вниз головой подобно речным уткам. Самцы весной тихо свистят, самки резко каркают.

Объект охоты на юге России.


6.1.7. Род Нырки — *Aythya*

Среднего размера (меньше кряквы) большеголовые, короткошеие утки плотного сложения с кожистой лопастью на заднем пальце, черными или серыми клювом и лапами. На берег выходят редко, большую часть времени проводят на открытых плесах. Плавая, держат хвост опущенным, посадка на воде низкая. Кормясь, ныряют, за что и получили свое название. Взлетают обычно после короткого разбега.

Гнездятся по заросшим берегам глубоких озер и рек, обычно у самой воды. В кладке 6-12 коричневатых яиц. Зимуют на морских заливах. Питаются водной растительностью и беспозвоночными.

В России семь видов.

Красноголовый нырок
[100] — *Aythya ferina*
(Таблица 7)




Самец голубовато-серый с каштаново-рыжими головой и шеей, черной грудью и красными глазами.

Самка бурая с темными головой и шеей, темно-желтыми глазами, у клюва и на горле светлое (не белое) пятно, от которого отходит светлая размытая полоса через глаз. Клюв голубоватый с черной вершиной, лапы серые. Полет быстрый, шумный.

Распространен от западных границ России и на восток до Камчатки. Гнездится на больших озерах с зарослями тростника и реках с глубокими плесами. В кладке 6-12 крупных

оливковых яиц. Голос селезня — тихий свист, самки — резкое карканье.

Важный объект охоты в степной зоне России, особенно в Западной Сибири.




Белоглазый нырок
[101] — *Aythya platyrhynchos*
(Таблица 8)

Заметно меньше кряквы. У самца голова, шея, грудь и бока рыже-коричневые, спина бурая, подбородок и брюшко белые. Крыло у летящей птицы буро-белое, клюв черный, лапы серые. Глаза светло-желтые, издали кажутся белыми. Самка похожа на самца, но окраска более тусклая и светлая, глаза темные. Полет более легкий и маневренный, чем у других нырков.

Распространен в лесостепной и степной зонах от западных границ и на восток до Алтая, изредка в лесной зоне Европейской части России. Гнездится отдельными парами и небольшими колониями, на водоемах, заросших тростником. В кладке 6-11 коричневатого-желтых яиц. Голос самца — тихий хрип, самки — резкое карканье.

Местами объект охоты.




Бэров нырок [102] —
Aythya baeri
(Таблица 7)

Похож на белоглазого нырка, но у селезня черные с зеленым отливом голова и шея, у самки черные темя и затылок, у основания клюва бежевое пятно. Подхвостье белое.

Редкая птица заболоченных низменностей бассейна Амура и Южного Приморья. В кладке 6-10 желтовато-серых яиц. Биология изучена плохо. Численность быстро снижается из-за мелиорации и развития рисосеяния. Занесен в Красную книгу России.

Хохлатая чернеть
[103] — *Aythya fuligula*
 (Таблица 7)




Самец черный с белыми боками и брюшком, самка бурая со светлым низом и белыми перышками у основания клюва. Клюв и лапы серые, глаза желтые, на затылке длинный почти до спины свисающий хохол. У летящей птицы крыло черно-белое.

Гнездится почти повсюду южнее тундры на больших озерах с зарослями тростника или осоки, по долинам рек. Обычна в Приуралье и Западной Сибири, в последние годы все чаще селится в населенных пунктах. В кладке 7-12 оливковых яиц. Голос селезня — тихий скрежет, самки — резкое карканье.

Объект охоты. Мясо невысокого качества.

Морская чернеть
[104] — *Aythya marila*
 (Таблица 7)



Похожа на хохлатую чернеть, но спина самца светло-серая с мелким поперечным струйчатым рисунком, самка с белым кольцом вокруг клюва, хохла нет. У летящей птицы крыло буро-белое.

Гнездится по зарастающим озерам кустарниковой тундры, лесотундры и северной тайги. В кладке 6-10 сравнительно крупных оливковых яиц. На пролете встречается на больших озерах и морях по всей России.

Важный объект охоты.

На Камчатку и Новосибирские о-ва залетала американская малая морская чернеть — *Aythya affinis* [105], похожая на морскую, но подхвостье не черное, а светлое с темными полосками, на голове короткий торчащий вверх хохол, крыло более темное.

На Чукотке отмечен залет американской ошейниковой чернети — *Aythya collaris* [106]. Она похожа на хохлатую чернеть [103], но, как и малая морская чернеть, имеет ко-

роткий хохолок на голове; у самки вся передняя часть головы вокруг клюва и полоска через глаз белые. Может быть встречена также на берегах морей и больших озер северо-запада Европейской части России.


6.1.8. Род Гаги – *Somateria*

Крупные и среднего размера утки морей и приморских тундр. Шея короткая, голова большая, на заднем пальце кожистая лопасть. Самцы ярко, контрастно окрашены, самки бурые с поперечным рисунком. Оперение на лбу выдается вперед в виде треугольного выступа (только у сибирской гаги [110] этого выступа нет). Часто ныряют, хвост на воде держат низко. Полет быстрый, тяжелый, часто над самой водой, стаи обычно вытягиваются цепочкой.

Гнездятся как поодиночке, так и колониями. Гнезда устраивают в траве, на сухих участках тундры, в плавнике (кучах выброшенных на берег бревен). В кладке 4-9 зеленоватых или оливковых яиц. Иногда, в случае откладки яиц несколькими самками в одно гнездо, количество яиц доходит до 16-20, что случается в плотных колониальных поселениях. Самка сидит на гнезде очень плотно, взлетает из-под ног человека. Гнезда с обильной выстилкой из темного пуха.

Питаются морскими беспозвоночными, преимущественно моллюсками, реже крабами, мелкой рыбой, иногда ягодами. Зимуют по незамерзающим участкам морей.

В роде четыре вида, являющихся замечательным украшением природы Севера. Охота на гаг запрещена.



Обыкновенная гого
[107] — *Somateria
mollissima*
(Таблица 9)


Крупная, размером с домашнюю утку птица. Голова, спина, горло и плечи самца белые, грудь розоватая; бока, брюхо, концы крыльев, лоб и темя черные; затылок зеленоватый, клюв серый или желтый, лапы желтоватые; у птиц из Восточной Сибири и Чукотки на горле черное V-образное пятно. Молодые самцы

с темной головой и белыми полосами вдоль спины. У самки клюв и лапы серые.

Гнездится отдельными парами или колониями на морских островках или в материковых тундрах по всему арктическому побережью, местами на севере Дальнего Востока. На Черном море гнездится на Лебяжьих островах у западного побережья Крыма, и поэтому может быть встречена зимой у берегов Азовского и Черного морей. Голос самца — громкое протяжное "агуу", самки — хриплое "гаг-гаг-гаг".

Пух из опустевших в середине лета гнезд заготавливается в качестве лучшего природного утеплителя.

Гага-гребенушка
[108] — *Somateria*
spectabilis
 (Таблица 9)




Самец черный с белыми плечами и горлом, голова с голубовато-серым затылком (у молодых черная), клюв ярко-оранжевый с большим выростом на лбу. Крылья снизу черные, а не черно-белые, как у самцов других гаг. Самка похожа на самку обыкновенной гаги, но на крыле белое зеркальце. Молодые самцы отличаются от молодых самцов обыкновенной гаги полностью темной спиной и рыжеватым клювом.

Гнездится отдельными парами по сухим берегам северных морей и тундровых озер, зимует на незамерзающих участках северных и дальневосточных морей. Голос самца — громкое трехкратное "ааг", самки — как у самки обыкновенной гаги.

Пух изредка заготавливается местным населением вместе с пухом обыкновенной гаги, но его сбор затруднен, так как гага-гребенушка не гнездится колониями.


Очковая гага [109] —
Somateria fischeri
 (Таблица 9)



У самца черные низ, концы крыльев и хвост, белые спина, плечи и горло, голова зеленоватая с

выпуклым белым в черной кайме кольцом вокруг глаза, клюв и лапы желтые. Самка похожа на самку обыкновенной гаги [107], но вокруг глаза круглое светлое пятно.

Гнездится отдельными парами и маленькими колониями в низменных прибрежных тундрах восточнее реки Оленек, зимует в Беринговом море. Голос похож на голос гаги-гребенушки.



**Сибирская гага [110] —
Somateria stelleri
(Таблица 9)**

Заметно мельче других гаг (величиной с крякву [87]), оперение на лбу не выдается вперед, на крыле синее зеркальце, окаймленное белым, клюв и лапы черные. У самца грудь и брюшко каштаново-рыжие, на боку белая полоса, спина и шея черные, голова белая, на затылке зеленое пятно. Самка темно-бурая с поперечным рисунком. Полет сравнительно легкий. Крылья в полете тихо звенят.

Гнездится отдельными парами по берегам озер и рек в заболоченных приморских тундрах восточнее Оби, возможно, и в западной Арктике, зимует на Баренцевом и Балтийском морях, у Тихоокеанского побережья.

6.1.9. Род Турпаны — *Melanitta*


Крупные (размером с крякву [87]), плотного сложения утки с большой головой, короткой шеей и ярким, вздутым у основания клювом. Самцы черные, самки однотонной темно-бурой окраски. На заднем пальце кожистая лопасть, хвост на воде держат опущенным. Хорошо ныряют, взлетают неохотно, с короткого разбега, стая вытягивается в длинную шеренгу. Очень осторожны.

Гнездятся отдельными парами по открытым озерам и небольшим рекам с зарослями осоки по берегам. Гнездо с обильной выстилкой из пуха. На пролете встречаются крупными стаями по большим озерам и берегам морей. Питаются водными беспозвоночными, реже мелкой рыбой и корневищами растений.

Пять видов.

Турпан [111] —
Melanitta fusca
 (Таблица 7)


Самец с белым пятном у глаза и зеркальцем, клюв ярко-оранжевый, лапы розовые. Самка со светлыми пятнами по бокам головы, белым зеркальцем и серым клювом.



Гнездится на озерах в тундре, тайге и лесостепи западнее Лены. В кладке 6-10 сливочно-белых яиц. Голос — хриплое карканье. Второстепенный объект охоты.

Горбоносый турпан [112] —
Melanitta deglandi
 (Таблица 7)


Очень похож на турпана, но у самца на клюве сверху черный нарост, у самки оперение по бокам клюва выдается вперед до уровня ноздрей.



Гнездится на озерах и травяных болотах в лесотундре, тайге и горах восточнее Енисея, зимует на дальневосточных морях. Объект охоты на востоке страны.


Синьга [113] —
Melanitta nigra
 (Таблица 7)

Самец сплошь черный, надклювье черное с желтой серединой, лапы серые. Самка бурая со светлыми щеками и горлом, клюв черный.



Гнездится на озерах, медленно текущих реках и болотах в тундрах и тайге западнее Лены, зимует на Черном и Каспийском морях. Голос самцов — мелодичная двусложная трель, самок — хриплое отрывистое карканье. В полете крылья самцов издают громкий звенящий звук, который часто слышен по ночам во время пролета. В кладке 6-10 зеленовато-белых яиц.

Промысловый вид, особенно на Балтике.




Американская синьга
[114] — *Melanitta*
americana
(Таблица 7)

Очень похожа на синьгу [113], но у самца надклювье желтое с черным

кончиком, у самки — черное с желтыми пятнами у ноздрей.

Гнездится в тайге и тундре Восточной Сибири и Дальнего Востока, зимует на дальневосточных морях. Промысловый вид на востоке страны.



Пестроносый турпан
[115] — *Melanitta*
perspicillata
(Таблица 7)


Похож на синьгу [113], но у самца на темени и затылке два белых пятна, лапы

оранжевые. Самка похожа на самку турпана [111], но без белого зеркала.

Изредка гнездится на востоке Чукотского полуострова, залетает на Командоры.

6.1.10. Род Каменушки — *Histrionicus*

Мелкие утки горных рек и озер, в негнездовое время встречаются стаями по берегам морей. Один вид, самый яркий и красивый из всех птиц суровых гор Восточной Сибири.



Каменушка [116] —
Histrionicus histrionicus
(Таблица 9)

Самец черно-сизый с белыми пятнами и полосами на лбу, позади глаза, на затылке, шее и крыльях,

каштановыми боками. Самка бурая с зеленоватым оттенком, брюшко светлое с темными пестринами, на голове три белых пятнышка, подхвостье темное. На воде держится высоко, приподняв хвост, часто ныряет, иногда прямо в полосе прибой.


Гнездится в тундрах и горах Восточной Сибири и Дальнего Востока, залетает на моря северо-запада. Зимой держится у скалистых берегов дальневосточных морей. В кладке 6-7 беловатых яиц. Питается водными беспозвоночными. Голос самца весной — громкий двусложный крик, в стаях — тихое кряканье.

Изредка добывается охотниками, в основном на зимовках. По широко распространенному поверью коренных народов Тихоокеанского побережья, каменушки — это души утонувших детей.

6.1.11. Род Морянки — *Clangula*

Один вид, многочисленный на озерах и реках болотистых тундр, особенно в Сибири; большие стаи негнездящихся птиц встречаются круглый год на озерах и морских заливах.

Морянка [117] —
Clangula hyemalis
(Таблица 7)



Мелкая, заметно мельче кряквы, утка. Окраска очень изменчива в деталях, так как в одной стае встречаются птицы, находящиеся на разных стадиях линьки, а линяет морянка 3 раза в году. У самцов весной длинный шиловидный хвост, голова и грудь черные, бока и пятно вокруг глаза белые, спина рыже-черная. Зимой грудь, спина и пятно на щеке черные, остальное оперение белое. Самка летом бурая с белым подхвостом, темной головой с белыми пятнами, зимой серая с белыми брюшком, боками, головой и шеей, на голове и горле темные пятна. Крылья в полете целиком черные. На воде морянки сидят низко, обращают на себя внимание короткие шеи и шиловидные хвосты самцов. Полет быстрый, стаи летят обычно низко над водой. В полете птицы все время подают голос.

Обитает по берегам озер и рек по всей тундровой и лесотундровой зонам. Гнездо устраивает на сухом участке, выстилка из темного пуха. Насиживающая самка подпускает человека вплотную. В кладке 6-8 буровато-оливковых яиц. Питается водными беспозвоночными, реже мелкой рыбой. Зимует на незамерзающих морях северо-запада России и Дальнего Востока. Голос — громкое хриплое "а-ауэ".


Важный объект охоты, особенно на Севере. Добывается только ранней весной, поскольку позже мясо приобретает неприятный запах.

6.1.12. Род Гоголи — *Vusephala*

Среднего размера утки с большой головой, тонкой короткой шеей, высоким черным клювом (желто-черным у самок) и желтыми глазами. На воде хвост держат опущенным, часто ныряют. Полет быстрый маневренный, сопровождается звенящим звуком.

Гнездятся, как правило, в дуплах по лесистым берегам тихих таежных рек и озер, иногда по многу лет в одном дупле. В негнездовое время обычны на море и крупных озерах. Гнездо с выстилкой из белого пуха, в кладке 5-12 зеленовато-голубых яиц. Голос — хриплое карканье. Питаются водными беспозвоночными, реже мелкой рыбой.

В России три вида, из которых гнездится только обыкновенный гоголь.



Обыкновенный гоголь
[118] — *Vusephala*
clangula
(Таблица 7)

Мельче кряквы [87]. Самец белый с черной спиной и крыльями. Зеркальце и кроющие перья второстепенных маховых белые. Голова и передняя часть шеи черные с зеленым металлическим блеском. Лапы желтые, у клюва белое пятно. Самка светло-серая с коричневой головой, белым зеркальцем. Крылья снизу темные.

Гнездится по всей зоне тайги, местами в лесотундре. Жилое дупло непременно со следами светлого пуха у входа.

Местами объект охоты. В Древней Руси пух из опустевших гнезд заготавливался, подобно гагачьему, и существовал даже особый вид промысловых угодий — гоголиные гоны.


На большие озера северо-запада России, а может быть, и на Дальний Восток, залетает гнездящийся в Америке и Исландии исландский гоголь — *Bucephala islandica* ([119], Таблица 7). Очень похож на обыкновенного гоголя, но у самца голова с сине-фиолетовым, а не зеленым отливом, белое пятно у клюва полулунной формы. Самка отличается только однотонной окраской спины, в гнездовое время — полностью желтым клювом.

На Дальний Восток залетает американский малый гоголь — *Bucephala albeola* ([120], Таблица 7). Похож на обыкновенного гоголя [118], но мельче, белое пятно не перед глазом, а на затылке, есть и у самца, и у самки. Гнездится в тундрах.

6.1.13. Род Мандаринки — *Aix*

Мелкие короткоклювые утки лесных рек и озер. В России один редкий дальневосточный вид.

Мандаринка [121] —
Aix galericulata
(Таблица 8)



Вдвое мельче кряквы [87]. Самцы очень ярко окрашены: у селезня на голове медно-красный с зеленым и белым хохол, на щеках рыжий "воротник", на крыльях каштаново-рыжие приподнятые перья, клюв красный. Самка дымчато-серая, кольца вокруг клюва и глаз, овальные пятнышки на боках и груди и полосы позади глаза светлые, клюв серый. Полет быстрый, маневренный, взлетает иногда почти вертикально. Часто садится на свисающие над водой ветви деревьев и кустарников.

Обитает по берегам лесных рек и озер юга Дальнего Востока, залетает в Забайкалье. Гнездится в дуплах, изредка в густых кустах и буреломе. В кладке 9-12 белых яиц. Питается беспозвоночными, семенами растений, желудями. Голос самца — мелодичный свист, самки — тихое кряканье.


За последние десятилетия численность этой самой красивой в мире утки сократилась в десятки раз из-за вырубки пойменных лесов, прокладки дорог вдоль таежных речек и усилившегося беспокойства. У нас, по-видимому, осталось меньше тысячи пар мандаринок. Занесена в Красную книгу России.

6.1.14. Род Крохали — *Mergus*

Утки различного размера. Клюв узкий, края его покрыты зубцами, на конце небольшой крючок. Хвост на воде держат низко, часто ныряют. Взлетают шумно и тяжело, с разбега, полет быстрый, сопровождается свистом крыльев. Встречаются обычно поодиночке или парами, реже небольшими стайками.

Гнездятся в различных укрытиях, дуплах. Самка сидит на гнезде так плотно, что ее иногда удается поймать руками. Выводки нескольких самок иногда объединяются, образуя группы до 40 птенцов. Питаются рыбой, водными беспозвоночными. На морских зимовках крохали часто устраивают коллективные охоты на рыбу, выстроившись цепью и по очереди ныряя в преследуемый косяк рыбы.

Мясо крохалей низкого качества, в некоторые сезоны с неприятным запахом. В России четыре вида.



Длинноносый крохаль
[122] — *Mergus serrator*
(Таблица 9)


Величиной с крякву [87]. У самца голова и спина черные, шея и брюшко белые, зоб коричневый с черными пестринами, на боках мелкий струйчатый рисунок, клюв и лапы красные. Самка серая с коричневыми головой и шеей, причем граница коричневого и серого цветов на шее размытая, спина серо-бурая. На затылке длинный хохол. С воды поднимается с разбега, но полет быстрый.

Самый обычный из крохалей на большей части страны. Обитает по морским побережьям, озерам, горным рекам. Гнездо устраивает на земле в трещинах скал, под камнями, в

бревенных завалах, кустах или густой траве, тростнике, реже открыто. Выстилка гнезда из бурого пуха. В кладке 7-12 розоватых или бледно-оливковых яиц. Голос — хриплое крыкание.

На мелких островках Балтики пух из гнезд заготавливается.


Чешуйчатый крохаль
[123] — *Mergus squamatus*
(Таблица 9)



Очень похож на длинноносого крохалья, но на боках крупный чешуйчатый рисунок, кроме того, у самца зоб розовато-белый, у самки спина пепельно-серая, чешуйчатый рисунок также на надхвостье.

Очень редкая птица тасежных рек Сихотэ-Алиня и гор Приамурья, в последние годы оказался под угрозой исчезновения. Перестает гнездиться на реках, где его часто беспокоят. Занесен в Красную книгу России.


Большой крохаль
[124] — *Mergus merganser*
(Таблица 9)



Несколько крупнее кряквы. Похож на длинноносого крохалья [122], но бока и зоб чисто-белые, хохол у самца короткий, у самки спина пепельно-серая, граница коричневого и серого цветов на шее резкая.

Гнездится в дуплах, расщелинах скал, кучах плавника, кустах на богатых рыбой озерах и реках лесной зоны, иногда в горах и лесотундре. Почти повсюду редок. В кладке 8-12 сливочно-белых яиц. Выстилка гнезда из белого пуха. Голос самца — глухое "ба-боб", самки — хриплое карканье.

Прочная шкурка иногда используется народами Севера для пошива теплой одежды.



Луток [125] — *Mergus albellus*
(Таблица 9)

Мелкая, заметно мельче кряквы, утка. Самец белый с черными спиной и пятнами перед глазом и на


затылке. Самка серая с коричневой головой, белыми щеками и брюшком. Часто держится в стайках гоголей.

Гнездится в дуплах или пустотах выгоревших стволов деревьев по рекам, озерам и болотам в тайге и лесотундре. В кладке 6-10 белых яиц. Выстилка гнезда из белого пуха. Питается в основном водными насекомыми. Голос — трескучее "кerr".

У финно-угорских народов существует очень древний миф, согласно которому бог-создатель мира впервые спустился на Землю в облике лутка ("белого гоголя"), повелевавшего обычными, "черными" гоголями.

6.1.15. Род Савки — *Охуга*

В России один крайне редкий вид, населяющий степи и полупустыни.



Савка [126] — *Охуга leucocerphala*
(Таблица 9)

Среднего размера утка, бурая с мелким струйчатым рисунком. У самца голова белая, темя и шея

черные, клюв ярко-голубой. У самки голова темно-бурая с белыми полосами, клюв серый. Лапы серые. Крылья сравнительно короткие, хвост длинный, жесткий, клиновидный, на воде обычно поднят вертикально вверх. Превосходно ныряет, на сушу практически не выходит. С воды взлетает с разбега.

Гнезда устраивает в зарослях тростника по берегам пресных и солоноватых озер в Туве, Нижнем Поволжье, Кал-

мыкии и пограничных с Казахстаном районах Западной Сибири. Зимует на крупных озерах и морских заливах. Гнездо плавучее, прикреплено к стеблям тростника. В кладке 5-7 очень крупных желтоватых яиц с пористой скорлупой. Питается водными растениями и насекомыми.

Занесена в Красную книгу России.

Примечание. Некоторые зоологи относят гуся-белошея, белого гуся и гуся Росса, краснозобую казарку, сибирскую гагу и мраморного чирка к самостоятельным родам *Philacte*, *Chen*, *Rufibrenta*, *Polysticta* и *Marmaronetta*.

7. Отряд Соколообразные — *Falconiformes*

*Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..*

Александр Пушкин. Узник .

Кто из нас не позавидует орлу, величественно и легко парящему над залитыми солнцем горными склонами? Увы, в наше время жизнь пернатых хищников не так легка, как может показаться на первый взгляд, и нам все реже случается видеть их в небе.

Орлы, ястребы, соколы и другие представители отряда — птицы размером от средних до очень крупных, с крючковатым клювом и острыми кривыми когтями. Основание клюва прикрыто голой кожей — восковицей. Зрение исключительно острое — в 8-10 раз острее, чем у человека. Особенности строения сетчатки глаза позволяют им смотреть против солнца.

Крупные виды способны парить, экономя силы с помощью восходящих воздушных потоков. Найдя, где поднимается над землей нагретый солнцем воздух, они кругами набирают высоту. Поскольку для парения нужна солнечная погода, крупных орлов и грифов больше в сухих степях и горах.

Самцы несколько мельче самок и практически, за исключением луней и кобчиков, неотличимы по окраске оперения. У хищных птиц есть несколько промежуточных возрастных нарядов, к тому же их окраска довольно изменчива.

Поэтому определение многих видов в природе затруднено и требует некоторого опыта.

Гнезда либо строят самостоятельно из веток и стеблей тростника, либо занимают и надстраивают пустующие гнезда ворон, грачей и хищников других видов. В кладке крупных представителей отряда 1-2, у мелких до 6 яиц. Насиживание, которое длится от 20 до 40 суток, начинается с момента откладки первого яйца, так что птенцы в гнезде различаются по возрасту. Вылупляются они покрытыми густым белым пухом и зрячими. В годы с недостатком корма младшие птенцы некоторых видов служат дополнительным кормом старшим.

Непереваренные остатки пищи (кости, шерсть, хитин) хищные птицы отрыгивают в виде комочков-погадок, по составу которых можно примерно узнать о том, чем питается тот или иной хищник.

В последние десятилетия численность большинства видов резко снизилась из-за кампании 1940-1960-х годов по истреблению хищников, вырубке высокоствольных лесов, распашки целины и массового применения ядохимикатов, к которым эти птицы особенно чувствительны. Даже широко распространенные виды орлов, орланов, крупных соколов во многих областях исчезли или сохранились в ничтожном количестве.

Сейчас мы знаем, что хищники играют важную роль в поддержании экологического равновесия. Предпринимаются попытки искусственного разведения редких видов.

Если вам известны места гнездования орлов, соколов или скопы, старайтесь не беспокоить птиц. Многие из них стали настолько редки, что, возможно, перед вами последняя в вашем районе пара.

В России обитают хищные птицы двух семейств.


7.1. Семейство Ястребиные — Accipitridae

Семейство включает орлов, грифов, ястребов, луней, коршунов. Все эти птицы питаются живой добычей или падалью, которую высматривают с воздуха, а ястреба и хохлатые орлы — также из засады. Активны днем, крупные орлы и грифы — чаще во второй половине дня, когда с нагретой солнцем земли поднимаются потоки теплого воздуха, необходимые им для парения.

В России отмечены ястребиные 16 родов.

7.1.1. Род Скопы — *Pandion*

Крупные (размах крыльев около полутора метров), чисто рыбацкие птицы с длинными, не очень широкими крыльями. Один перелетный вид, широко распространенный, но почти повсюду ставший редким.



Скопа [127] — *Pandion haliaetus*

(Таблицы 11, 14)

Спинная сторона черновато-серая, брюшная светлая с темной полосой поперек груди. Голова белая

с черной полосой через глаз. Снизу на сгибах крыльев темные пятна, на хвосте нерезкие поперечные полосы. Своеобразно строение лапы — наружный палец очень подвижен и может быть направлен как вперед, так и назад, на подушках пальцев имеются острые шипики, служащие для удержания скользкой добычи. Цевка не оперена. Парящая птица держит крылья несколько изогнутыми концами вниз, как чайка. Добычу высматривает с воздуха и ловит, пикируя в воду и даже неглубоко ныряя с разгона.

Гнездится на большей части России близ прозрачных рыбных рек и озер, реже морей. Большое гнездо из толстых сучьев строит на относительно высоких деревьях, обычно на соснах, березах, елях недалеко от водоемов. В кладке 2-3 ярких бело-красных яйца. Голос — короткий свист.

Занесена в Красную книгу России.

7.1.2. Род Настоящие орлы — *Aquila*

Крупные и очень крупные птицы с длинными широкими крыльями (размах до двух метров и больше), широким, слегка закругленным хвостом и мощным темным клювом. Лапы оперены до пальцев. Полет парящий или машущий, характерны широко расставленные первостепенные маховые перья. Окраска изменчивая, от почти черной до светло-бурой с желтоватыми каемками перьев.


Строят большие гнезда из сучьев, которыми пользуются иногда по несколько лет. Гнезда расположены на больших деревьях, скалах или на земле. В кладке 1-3 белых с рыже-бурыми пятнами яйца. Питаются живой добычей от саранчи до зайцев или падалью. Чаще всего ловят мелких животных, которых настигают в стремительном бреющем полете.

В нашей стране орлы стали очень редкими из-за отстрела, беспокойства на гнездах, отравления ядохимикатами и гибели на линиях электропередачи.

У большинства народов мира эти величественные птицы издавна служили символом силы, огня, солнца и бессмертия. Битва орла и змеи — древнейший символ борьбы добра и зла.

В России пять трудноразличимых видов. Два более мелких из них (размах крыльев около полутора метров) отличаются круглой, а не щелевидной формой ноздрей и называются **подорликами** [131, 132]. Во время парения орлы держат крылья горизонтально (беркут — чуть изогнутыми, с приподнятыми кончиками), а подорлики — слегка опущенными.

Беркут [128] — *Aquila chrysaetus*
(Таблицы 10, 13)




Самый крупный орел. Молодые птицы отличаются светлым основанием хвоста и размытыми светлыми пятнами в середине нижней стороны крыльев. У взрослых на затылке обычно золотистые или рыжеватые заостренные перья; характерны очень крупные когти, широкий хвост и крылья, ровная темно-бурая окраска нижней стороны крыла, но все эти признаки довольно ненадежны.

Гнездится по всей России до южных тундр, но во многих областях одно гнездо находится за сотни километров от другого. В горах Кавказа, Алтая и Якутии менее редок. Гнездо на скалах или высоких деревьях, в полупустынях и тундрах — иногда на развалинах зданий или крупных кустах. У орлов, гнездящихся на Севере, птенцы очень агрессивны, и старший часто убивает младшего. Вероятно, это приспособление к суровым условиям: за короткое лето родители не успевают выкормить обоих птенцов. Зимой молодые птицы от-

кочевывают к югу, старые кочуют по малоснежным местам, обычно недалеко от мест гнездования. Голос — хриплое "кък-кь-ек-кък".

Хотя беркута иногда используют для охоты на волка и ко-сулю, в природе обычно самая крупная добыча — зайцы и сурки, изредка лисы и кошки, чаще питается грызунами и падалью.

Занесен в Красную книгу России.



Могильник [129] —


Aquila heliaca

(Таблицы 10, 13)

Крупный, обычно темноокрашенный орел. Молодые светло-бурые с продольными пестринами снизу, у взрослых почти всегда светлые золотисто-желтые верх головы и затылок и белые пятна на плечах. Хвост короче и уже, чем у беркута, концы крыльев снизу темные.

Обитает в лесостепях, степях и изредка в горах. Гнездится на толстых деревьях, иногда на земле или на опорах ЛЭП. Перелетный вид. Название связано с привычкой высматривать добычу с древних курганов и надгробных камней, особенно в плохую погоду, когда нет восходящих потоков воздуха и птицы не могут парить. Голос похож на звонкий собачий лай.

В Европейской части России в последнее время стал редок, занесен в Красную книгу России.



Степной орел [130] —

Aquila nipalensis

(Таблицы 10, 13)


Крупный орел, обычно сравнительно светлой, однотонной окраски. На затылке изредка бывает ржавое пятно. Маховые перья снизу обычно темнее, чем остальная часть крыла. Молодые светло-бурые с желтоватым оттенком, пестринами на груди и темными маховыми. Реже других орлов парит на большой высоте. По утрам часто сидит на столбах или других возвышениях.

Маховые перья снизу обычно темнее, чем остальная часть крыла. Молодые светло-бурые с желтоватым оттенком, пестринами на груди и темными маховыми. Реже других орлов парит на большой высоте. По утрам часто сидит на столбах или других возвышениях.

Обитает в степях, полупустынях, предгорьях. Гнезда устраивает на земле на склонах холмов, курганах или на стогах сена, плоских кустах. Перелетный вид. Питается в основном грызунами, которых иногда подкарауливает, часами сидя неподвижно у нор. В годы низкой численности малого суслика иногда переходит на питание птицами. Голос — хриплое тьяканье.

Занесен в Красную книгу России.

Большой подорлик
[131] — *Aquila clanga*
(Таблицы 10, 13)




Почти всегда очень темной однотонной окраски, иногда с беловатым пятном на надхвостье. У молодых верх со светлыми каплевидными крапинками. У летящей птицы хвост кажется коротким.

Обитает в лесах и лесостепи. Гнезда устраивает только на деревьях. Кладка из 2 белых с яркими красноватыми крапинами яиц. Голос — звонкое "кьяк-кьяк-кьяк" и различные трели. Питается грызунами, птицами, лягушками, крупными насекомыми. Перелетный вид.

В Средней полосе встречается чаще беркута и могильника, но все же почти везде очень редок. Занесен в Красную книгу России.

Малый подорлик
[132] — *Aquila pomarina*
(Таблицы 10, 13)




Очень похож на большого подорлика, но несколько мельче и светлее, с сероватым оттенком, у молодых на верхней стороне редкие охристые пятна. Надхвостье всегда темное. У летящей птицы крылья кажутся заметно уже, чем у других орлов, особенно в концевой части.

Обитает в лесной и лесостепной зоне запада Европейской части России и Кавказа. Гнезда устраивает на деревьях.

В кладке 2 белых с буроватыми крапинами яйца. Питается грызунами, птицами, змеями, лягушками, крупными насекомыми. Очень редкая перелетная птица. Занесен в Красную книгу России.

7.1.3. Род Ястребиные орлы — *Hieraaetus*

Внешне очень похожи на настоящих орлов [128-132], но значительно меньше (размах крыльев немного больше метра). В России один редкий вид.



**Орел-карлик [133] —
Hieraaetus pennatus
(Таблицы 11, 13)**


Хвост длинный и узкий (в отличие от орлов [128-132] и канюков [135-138]), причем снизу он всегда светлый, без поперечных полос. Лапы оперены до пальцев. Окраска бывает двух типов. У птиц светлого типа верх бурый, низ светло-охристый с узкими темными пестринами. У темных птиц окраска коричнево-бурая, на голове часто золотистый или рыжеватый оттенок, как у настоящих орлов. Маховые перья всегда темные, без поперечных полос. Полет быстрый, маневренный, парит редко.

Обитатель лесной и лесостепной зон. Гнездится на деревьях в высокоствольных равнинных и горных лесах, преимущественно лиственных, особенно характерен для лесостепных дубрав и сосняков. В кладке 2 бело-зеленоватых яйца. Питается мелкими птицами, которых часто ловит на лету, реже грызунами и лягушками. Голос — пронзительное "юг-юг-юг".

7.1.4. Род Хохлатые орлы — *Spizaetus*

В России один очень редкий перелетный вид, обитающий в глухих лесах юга Дальнего Востока.

Хохлатый орел [134] —
Spizaetus nipalensis
 (Таблицы 10, 14)



Крупная ширококрылая птица (размах крыльев около полутора метров), сверху темно-бурая со светлыми каемками перьев, снизу светло-охристая с мелкими поперечными пестринами. Характерно белое горло с черной продольной полосой, темные продольные полосы по зобу, оперенные до самых пальцев ноги и хохол из удлиненных перьев на голове и затылке. Хвост снизу светлый с черными поперечными полосками. В полете хохлатый орел выглядит намного более светлым, чем настоящие орлы [128-132] и орланы [142-145]. От светлой формы ястребиного сарыча [139] отличается крупными размерами, округлым в полете задним краем крыла и отсутствием темной полосы поперек груди, от осоедов — полосатыми, а не сплошь темными маховыми перьями. Полет неторопливый, с редкими медленными взмахами крыльев, часто парит невысоко над лесом.


Гнездится в горных лесах на острове Кунашир (Курильские о-ва) и изредка в горах Сихотэ-Алиня. Гнезда на деревьях и скалах. Питается мелкой добычей: от насекомых и лягушек до змей и крыс. Иногда охотится из засады, подобно ястребам. Голос — звонкий клекот.

7.1.5. Род Канюки — *Buteo*

Крупные птицы плотного сложения с длинными широкими крыльями (размах от метра до полутора) и сравнительно коротким, широким, слегка закругленным хвостом. Снизу на сгибе крыла темное пятно (в отличие от змееяда [153] и ястребиного сарыча [139]). Окраска очень изменчива. Полет парящий и машущий; часто зависают в воздухе, трепеща крыльями и опустив хвост.

Питаются в основном грызунами, иногда мелкими птицами, насекомыми, лягушками, змеями. Добычу высматривают с воздуха или столбов, деревьев. Иногда убивают даже крупных ядовитых змей, закрываясь жесткими маховыми перьями от укусов, как щитом, и нанося удары когтями. В кладке 2-6 белых с рыжеватыми крапинками яиц. Голос — заунывное протяжное взвизгивание.

В России четыре вида.




Канюк [135] — *Buteo buteo*
(Таблицы 11, 14)

Самая обычная из крупных хищных птиц средней полосы России. Размах крыльев до метра. Окраска

от темно-бурой до серовато-охристой, низ более светлый с продольными пестринами. Хвост с частыми узкими поперечными полосами, по краю иногда более широкая темная полоса. У темных птиц обычно большие темные пятна по бокам груди или темная поперечная полоса. Передний край крыла снизу темный.

Гнездится на деревьях в лесах и лесостепях, охотится на открытых местах, болотах и опушках. Перелетный вид. На полях канюк уничтожает большое количество грызунов и крупных насекомых. Во многих странах его и других хищных птиц специально привлекают на поля, устанавливая присады — шесты с перекладиной, а также платформы для гнезд.




Курганник [136] — *Buteo rufinus*
(Таблицы 11, 14)

Похож на канюка, но несколько крупнее (размах крыльев до полутора метров) и обычно светлее (особенно голова), основной тон окраски рыжеватый. Маховые

перья снизу светло-серые с темными кончиками, так что на крыльях видны размытые белые пятна кнаружи от темных. Поперечные полосы на хвосте издали почти незаметны или вообще отсутствуют. Изредка встречаются птицы однотонной темно-бурой окраски, но характерный рисунок нижней стороны крыльев различим и у них.

Обычная хищная птица сухих степей и полупустынь. Гнездится на деревьях, скалах, обрывах, развалинах строений. На Северном Кавказе может быть встречен и зимой.


Мохноногий курганник
[137] — *Buteo*
hemilasius
 (Таблицы 11, 14)



Очень похож на канюка [135], но крупнее (размах крыльев до полутора метров), полосы на хвосте узкие и размытые. Цевка спереди оперена до половины или до пальцев, горло и грудь охристые. Хвост светлый и снизу, и сверху.

Обитает в горных степях и лесостепях крайнего юга Сибири. Гнезда устраивает на уступах обрывов или на земле. Часть птиц зимует в малоснежных районах.

Зимняк [138] — *Buteo*
lagopus
 (Таблицы 11, 14)




Сложением напоминает канюка [135], но светлее; хвост беловатый с широкой темной полосой по краю (у молодых она разбита на две-три узкие полосы); на груди пестрины; на брюхе и сгибе крыла темные пятна; крылья снизу почти белые; цевка оперена до пальцев.

Обитает в тундрах и лесотундрах, горах Охотского побережья и Камчатки. Гнезда устраивает на уступах скал, или на земле по сухим и возвышенным участкам тундры. Основным объектом питания зимняка летом служат лемминги — мелкие мышевидные грызуны, обитающие в тундрах. Численность леммингов в каждом районе резко меняется по годам; поэтому в "неурожайные" на грызунов годы пернатые хищники тундры, и зимняк в первую очередь, ищут более кормные места, покидая территории, на которых еще недавно были обычны. Зимой кочует почти по всей стране, придерживаясь в основном открытых пространств.

7.1.6. Под Ястребиные сарычи — *Butastur*

В России один перелетный вид, встречающийся только на юге Дальнего Востока.



Ястребиный сарыч
[139] — *Butastur indicus*
(Таблицы 11, 14)

Крупная птица (размах крыльев около метра), похожая на канюка [135], но с более длинным хвостом

и резкими поперечными полосами на хвосте и маховых перьях, без темных пятен снизу на сгибе крыла. Горло белое с темной продольной полосой, брюхо бурое со светлыми поперечными полосами, бровь обычно белая. Поперек груди обычно широкая темная полоса (в отличие от ястребов [148-152]). У молодых птиц брюшная сторона светлая с темными продольными полосами на боках и груди. В полете задний край крыла выглядит прямым, а не округлым, как у хохлатого орла [134]. Полет преимущественно машущий. Часто сидит на сухих ветках высоких деревьев.

Обитает в смешанных и широколиственных лесах на юге Приморья и Приамурья. Гнезда на деревьях с выстилкой из зеленой травы и листьев, в кладке 3-4 белых с красноватыми пятнами яйца. Питается лягушками, змеями, грызунами, насекомыми. Голос похож на крик канюка, но двусложный.

В последние годы стал редок и занесен в Красную книгу России.

7.1.7. Род Осоеды — *Pernis*

Крупные птицы с относительно длинным, не очень широким хвостом и узкими крыльями (размах до полутора метров). В полете шея несколько вытянута. Первостепенные маховые перья снизу полностью темные без полос, очень редко светлые с темными кончиками. Окраска очень изменчива, так что этих птиц иногда трудно отличить от канюков и ястребиного сарыча [135-139]. Полет машущий с коротким парением, крылья чуть изогнуты сгибом вперед.


Гнездятся на деревьях в высокоствольных смешанных и широколиственных лесах. Гнездо с выстилкой из веток с зелеными листьями, в кладке 1-2 ярких, красно-коричневых с белым яйца.

Питаются личинками ос и шмелей, гнезда которых находят, следя за летающими насекомыми. Обладают очень ост-

рым слухом и безошибочно отличают гудение осы, возвращающейся в гнездо с добычей, от летящей налегке. Осиные гнезда, находящиеся в земле, выкапывают, оставляя характерные поковки. Из-за особенностей питания к откладке яиц приступают позже других хищников (осы и их личинки становятся массовым кормом лишь летом). Основание клюва и кожа вокруг глаз покрыты мелкими, похожими на чешую перышками для защиты от укусов ос. Изредка ловят лягушек и грызунов. Голос — отрывистое короткое взвизгивание.

В России два трудноразличимых перелетных вида.


**Осоед [140] — *Pernis
apivorus***
(Таблицы 11, 14)



Размах крыльев около метра. Верх темно-бурый, низ обычно светлый или бурый с коричневыми поперечными пестринами, горло светлое. Крыло снизу полосатое, часто с темным пятном на сгибе, на хвосте две темные полосы у основания и одна на конце. Молодые обычно со светлой головой и пятнами на спине.

Гнездится в лесах к западу от Енисея.

**Хохлатый осоед
[141] — *Pernis
ptilorhynchus***
(Таблицы 11, 14)



Похож на осоеда, но крупнее (размах крыльев до полутора метров), две полосы у основания хвоста сливаются в одну или разбиты на несколько темных полос, на затылке обычно острый хохол, на горле иногда темное подковообразное пятно или черная продольная полоска. Встречаются птицы однотонно-бурой окраски.

Гнездится в лесах юга Сибири и Дальнего Востока.

7.1.8. Род Орланы — *Haliaeetus*

Очень крупные птицы (размах крыльев до двух с половиной метров), похожие на орлов [128-132], но с более широкими крыльями, мощным, очень высоким, обычно светло-желтым клювом, тяжелым машущим полетом (парят редко). У летящей птицы шея несколько вытянута, крылья изогнуты книзу, и весь силуэт имеет несколько угловатый, "коренастый" вид. Цевка оперена только до половины.

Гнездятся на высоких деревьях и скалах, обычно поблизости от крупных водоемов. Гнезда огромные, из толстых сучьев, некоторые используются по многу лет подряд. В кладке 1-3 белых яйца. Питаются рыбой, птицами и мелкими зверями, падалью. Добычу ловят с бреющего полета или высматривают, сидя на дереве или скале. Голос — громкий лающий клекот.

В России четыре редких вида, из которых широко распространен только орлан-белохвост.




Орлан-белохвост
[142] — *Haliaeetus*
albicilla
(Таблицы 10, 13)

Бурый с более светлой брюшной стороной и головой, белым хвостом и желтым клювом. Молодые птицы темнее, брюхо с продольными пятнами, хвост и клюв темные, на верхней стороне хвоста мраморный рисунок. В полете задний край крыла почти прямой, хвост клиновидный.

Обитает почти на всей территории России, но в большинстве областей редок. Только на Байкале, в Приазовье и Прикаспии орлан-белохвост довольно обычен. Зимой молодые улетают к югу, старые птицы иногда зимуют на незамерзающих водоемах.

Занесен в Красную книгу России.

Белоплечий орлан
[143] — *Haliaeetus*
pelagicus
(Таблицы 10, 13)



Черно-бурый, очень массивный, с мощным желтым клювом. Хвост, лоб, оперение ног и пятна на сгибах крыльев белые. Молодые птицы темные без белых пятен, хвост белесый. В полете отличается закругленным задним краем крыла. Хвост клиновидный. Клюв очень высокий, ярко-желтый. В Приморье в прошлом залетали птицы ныне, вероятно, вымершего корейского под-вида, черные с белым хвостом.

Гнездится по берегам дальневосточных морей, по долинам нерестовых рек и озерам Камчатки, Охотского побережья и низовий Амура. Зимует на берегах морей, реже в тайге юга Дальнего Востока, собираясь группами по 2-3 птицы на падали.

Белоплечий орлан, одна из красивейших хищных птиц мира, гнездится только в нашей стране. Занесен в Красную книгу России. Общая численность, вероятно, около 2 тысяч пар.

Орлан-долгохвост [144] — *Haliaeetus leucorhynchus*
(Таблицы 10, 13)

Похож на орлана-белохвоста [142], но мельче, более легкого сложения, темнее, голова и горло светлые, хвост длинный, закругленный, белый с темной поперечной полосой, клюв на конце синеватый. Молодые птицы светло-бурые с темным хвостом, по бокам головы темные пятна.

Гнездится в Южной Азии, летом молодые, реже взрослые птицы кочуют по степной зоне и югу Сибири, в основном по окрестностям водоемов. Занесен в Красную книгу России.


В XIX веке на Командорских островах гнездился, а позже залетал на Дальний Восток североамериканский белоголовый орлан — *Haliaeetus leucoccephalus* [145]. Взрослые птицы отличаются белой головой, молодые — закругленным светло-серым хвостом (изображение этой птицы можно увидеть на гербе США или на долларовой банкноте).

7.1.9. Род Коршуны — *Milvus*

Крупные птицы с относительно узкими крыльями (размах около полутора метров), легко отличимые от всех остальных хищников по вильчатому хвосту. Окраска бурая; брюшная сторона светлее, с темными продольными пестринами; верх головы светлый. Молодые птицы в крупных охристых пятнах. Полет очень плавный, на слегка изогнутых крыльях.

Гнездятся на деревьях в лесах, чаще пойменных, встречаются вблизи поселков и городов. Кладка из 2-3 белых с бурым рисунком яиц. Питаются падалью, грызунами, лягушками, реже насекомыми и мелкими птицами. Коршунов часто обвиняют в краже цыплят, но подобные "преступления" совершают лишь очень немногие птицы.


В России два перелетных вида.



Черный коршун [146] — *Milvus migrans*
(Таблицы 10, 13)

Хвост темно-бурый (у молодых — светло-серый) с размытыми поперечными полосками, вырезка неглубокая.

Широко распространен на большей части территории России, обычен в Южной Сибири. В Бурятии, Южной Якутии, на Алтае нередко гнездится по окраинам деревень. Голос — дрожащая трель, напоминающая ржание жеребенка или свист помех при настройке радиоприемника. Во время пролета иногда образует стаи до нескольких десятков особей. В Европейской части России в последние десятилетия численность резко сократилась.



Красный коршун [147] — *Milvus milvus*
(Таблицы 10, 13)

Окраска светло-рыжая, хвост с глубокой вырезкой.

Редкая птица Калининградской области и Крас-

нодарского края. Гнездится в спелых лиственных и смешанных лесах, как правило, близ полей и опушек. Голос — крик "киия" и трель, как у черного коршуна.

Занесен в Красную книгу России.


7.1.10. Род Ястребы — *Accipiter*

Крупные и средние птицы (размах крыльев тетеревятника около метра, другие виды намного меньше, особенно самцы). Крылья короткие и сравнительно широкие, приспособленные к маневренному машущему полету. Хвост длинный и широкий, с широкими поперечными полосами. Взрослые птицы узнаются по мелкому рисунку из поперечных полос на горле, груди, брюхе и нижней стороне крыльев. У молодых птиц брюшная сторона тела с темными продольными пестринами, и узнать их можно по характерному сложению.

Гнездятся на деревьях в лесах, часто используя гнезда других птиц, в кладке 3-4 белых (у перепелятника с красноватыми пятнами) яйца. Питаются живой добычей, которую ловят в стремительном броске из засады или с бреющего полета.

В России пять видов.

Тетеревятник [148] —
Accipiter gentilis
(Таблицы 12, 15)




Крупная, заметно больше вороны птица. Спина сизая, брюхо светло-серое с темными поперечными полосками. Бровь белая, лапы и глаза желтые. В Северо-Восточной Сибири и на севере Дальнего Востока встречаются очень светлые и даже чисто-белые птицы. Молодые птицы сверху бурые, снизу желтоватые с темными продольными пестринами, несколько похожи на самок луней [154-159], но отличаются темным надхвостьем, широкими крыльями и хвостом, встречаются в основном в лесу. В полете видны две узкие и одна более широкая краевая полоса на хвосте.

Распространен по всей стране от лесотундр до лесостепей, местами довольно обычен, но скрытен и редко попадает на глаза. Молодые птицы зимой откочевывают к югу, старые часто остаются зимовать. Питается в основном пти-

цами — дятлами, голубями, рябчиками, белыми куропатками, глухарями, скворцами, реже мелкими грызунами, белками и зайцами. До недавнего времени тетеревиатник считался вредителем охотничьего хозяйства. В результате многолетнего преследования он во многих районах стал настолько осторожен, что его почти невозможно увидеть. Голос — звонкое "кьяк-кьяк-кьяк".

Ручные тетеревиатники используются для отпугивания голубей и ворон с территории Московского Кремля и некоторых аэродромов.




Тювик [149] — *Accipiter brevipes*
(Таблица 12)

Размером с крупного голубя. Самец серый сверху и бледно-рыжий с белым поперечным рисунком снизу, с темно-серыми щеками. Самка буроватая сверху, белая с темными полосками снизу, на светлом горле темная продольная полоса или мелкие темные пестрины. Глаза темные, красновато-бурые (у остальных ястребов желтые). Молодые похожи на самок, но брюхо белое с темными каплевидными пестринами. В полете видны 5-7 узких и одна более широкая краевая полоса на хвосте.

Гнездится в пойменных лесах, реже парках юга России, в основном в бассейне Дона. На пролете иногда собирается в большие стаи, причем в одной такой стае может быть довольно значительная часть немногочисленной российской популяции. Питается ящерицами, лягушками, насекомыми, реже птицами и мелкими зверьками. Голос — протяжный свист.

Занесен в Красную книгу России.




Перепелятник [150] — *Accipiter nisus*
(Таблица 12)

Размером примерно с голубя. Самец сверху серый с белыми пятнами на шее, снизу беловатый с бу-

рым или рыжеватым рисунком, щеки рыжие. Самка бурая сверху и белая с темно-бурыми полосками снизу, бровь и горло белые. Молодые рыжевато-бурые сверху, палевые с мелкими пестринами снизу. В полете видны 4 узкие и одна более широкая краевая полоса на хвосте.

Гнездится в разреженных лесах и лесопарках большей части России, в средней полосе и на юге частично зимует, появляясь иногда в поселках и городах. Питается в основном мелкими птицами, изредка ловит крупных насекомых и грызунов. Стремительный бросок ястреба из засады на стайку воробьев довольно часто удается наблюдать близ лесных опушек или больших парков. Голос — громкое быстрое "кик-кик-кик".


Малый перепелятник
[151] — *Accipiter*
virgatus
(Таблица 12)



Похож на перепелятника, но мельче, темнее, крыло снизу с темными пестринами, на горле часто темная продольная полоса. Самец снизу бледно-рыжий с белым поперечным рисунком (издали почти незаметным); самка снизу с резкими поперечными полосами, почти без светлой брови. У молодых птиц круглые пятна на брюшке, продольные полосы — на груди и поперечные — на боках. Полет с очень частыми взмахами крыльев.

Гнездится в пойменных лесах юга Сибири и Дальнего Востока. Редкий перелетный вид. Питается мелкими птицами.

Китайский перепелятник
[152] — *Accipiter*
soloensis
(Таблица 12)



Очень похож на самца малого перепелятника, но поперечный рисунок на рыже-белой нижней стороне практически отсутствует, пальцы сравнительно короткие. В полете легко отличим по окраске


нижней стороны крыла, белой с рыжеватым передним краем и черным кончиком, у взрослых совсем без пестрин.

Очень редкий перелетный вид лесов Южного Приморья, гнезда найдены всего несколько раз в окрестностях Владивостока. Занесен в Красную книгу России.

На севере Дальнего Востока может быть встречен **американский перепелятник** — *Accipiter striatus*. Он крупнее голубя, самец с рыжими поперечными полосками на груди и темным рисунком на голове, как у сапсана, самка похожа на молодого тетеревиатника [148], но мельче, на хвосте три узких и одна широкая поперечная полоса.

7.1.11. Род Змееяды — *Circaetus*

В России один редкий перелетный вид.



Змееяд [153] —
Circaetus gallicus
(Таблицы 11, 14)

Крупная большоголовая птица с длинными крыльями (размах свыше полутора метров), большими желтыми глазами, серо-голубыми (а не желтыми, как у большинства ястребиных) лапами. Оперение мягкое, окраска темно-бурая сверху, светлая с темным рисунком (у молодых несколько темнее) снизу. Обычно на более темных горле и зобу рисунок из продольных пестрин, на груди и брюхе — из поперечных (иногда низ просто белый). В полете крылья снизу — почти белые с рядами мелких темных крапин и черными концами растопыренных, как пальцы, маховых перьев. На длинном хвосте 3-4 нерезких темных полосы. Полет легкий, парящий. Иногда зависает в воздухе, часто взмахивая крыльями, как пустельга.

Гнездится в средней полосе и на юге, повсюду крайне редок, кроме предгорий Восточного Кавказа. Гнезда иногда находятся в сотнях километров одно от другого. Расположены они на деревьях или скалах неподалеку от болот или в островках леса среди степей. В кладке 1 белое яйцо. Питается в основном змеями, ящерицами, лягушками. Змееяд — умелый охотник на змей, он часто убивает их первым же

ударом когтей по затылку. Голос похож на голос канюка, но слышен очень редко.

Занесен в Красную книгу России.


7.1.12. Род Луни — *Circus*

Крупные птицы легкого сложения с длинными, относительно узкими крыльями (размах свыше метра) и хвостом. Лапы сравнительно длинные и тонкие, цевка не оперена. Вокруг передней части головы кольцо из жестких перьев, придающее птицам некоторое сходство с совами. Самцы легко узнаются по характерной окраске, самки трудноразличимы (кроме болотного луны) и отличаются от других хищников в основном не деталями окраски, а манерой полета — чередование плавных взмахов крыльями и скольжения низко над землей. У парящей птицы крылья слегка приподняты.

Гнезда из мелких веток и стеблей тростника строят на земле в высокой траве или тростниках по берегам водоемов, на полях и вырубках. Охотятся в основном на открытых пространствах более или менее в соответствии с названиями видов. В кладке 3-6 белых яиц. Весной часто можно наблюдать красивые брачные полеты луней. Питаются грызунами, а также птицами, лягушками и крупными насекомыми. Перелетные птицы, но в малоснежные зимы могут зимовать на юге страны.


В России шесть видов, из которых в Европейской части России чаще других встречается полевой лунь.

Полевой лунь [154] —
Circus cyaneus
(Таблицы 12, 15)



Самец пепельно-серый с белыми брюхом и надхвостом, конец крыла темный. Самка сверху темно-бурая, снизу светло-охристая с темными продольными пестринами, надхвостье белое с чуть рыжеватыми каемками перьев, хвост с темными поперечными полосами. Молодые птицы похожи на взрослых самок, но на спине у них перья с широкими рыжими каемками.


Распространен по всей стране от лесотундр до полупустынь. Встречается по полям и долинам рек. Голос — высокий отрывистый клетот и дребезжащий двусложный визг.



Луговой лунь [155] —
Circus pygargus
(Таблицы 12, 15)

Самец сизо-серый с черной полосой на крыле и полностью черными первостепенными маховыми (не только на конце крыла). Самка и молодые как у полевого луня [154], но белое надхвостье уже, с темными пестринами, молодые снизу одноцветно-рыжие.


Встречается по лугам, долинам рек, высокотравным степям. Значительно более редок, чем полевой лунь. Голос — жалобное "кек-кек-кек".



Степной лунь [156] —
Circus macrourus
(Таблицы 12, 15)

Самец очень светлый, спинная сторона светло-серая, брюшная чисто-белая, концы крыльев черные. Окраска самок и молодых птиц как у лугового луня, но пестрины на надхвостье всегда поперечные, рыжий оттенок на брюхе ярче.

Обитает в степях. Голос — дребезжащая трель или звонкий отрывистый клетот. Повсюду редок, занесен в Красную книгу России.




Пегий лунь [157] —
Circus melanoleucus
(Таблицы 12, 15)

У самца брюхо, часть крыла и надхвостье белые; голова, шея, грудь, спина, полоса на крыле и конец

крыла черные; хвост и кроющие крыла серые. Самка и молодые, как у лугового луня [155], но темнее; хвост без поперечных полос; у самки белый передний край крыла.

Встречается по сырым лугам Забайкалья и юга Дальнего Востока. Голос — двусложный визг, похожий на крик чибиса.


Болотный лунь [158] —
Circus aeruginosus
 (Таблицы 12, 15)



Самец похож на самок других видов луней, но крупнее, темнее, брюхо рыжее или беловатое, хвост однотонно-серый. Самки и молодые птицы однотонной темнотой окраски с темными концами крыльев; верх головы и затылок рыжий или золотистый; горло рыжее или белое. Крылья более широкие чем у других луней.

Распространен от таежной (кроме Западной Сибири) до степной зоны, от западных границ до Байкала. Обычен на болотах, сырых лугах, в тростниковых крепях. Голос — гнусавый писк.

Азиатский лунь [159] —
Circus spilonotus
 (Таблицы 12, 15)




У самца брюхо белое, хвост серый, остальное оперение черное в белых пестринах. Самка и молодые птицы похожи на лугового луня [155], но рыжеватые, с серым хвостом.

Встречается по сырым лугам, болотам и тростниковым зарослям Забайкалья и юга Дальнего Востока. Голос — пронзительный писк.

7.1.13. Род Бородачи — *Gypaetus*

Один редкий вид высокогорий Кавказа, Алтая и Саян.



Бородач [160] —
Gypaetus barbatus
(Таблицы 10, 15)

Огромная птица с длинными острыми крыльями (размах до 2,7 м) и длинным, узким клиновидным


хвостом. Под клювом "борода" из жестких черных перьев. Клюв и лапы серые. Цевка оперена до пальцев. Через глаз (красный) проходит косая черная полоса. Основной тон окраски светло-серый, буроватый или рыжий; спина, крылья и хвост темно-серые или черные. В полете заметно темное горло. Молодые буро-черные со светлым низом.

Встречается в горах Кавказа, реже — Алтая и Саян. Гнездится в нишах скал высоко в горах, в кладке 1-2 охристых с буроватыми пятнами яйца. Высматривает добычу, паря на большой высоте или облетая горные склоны скользящим брейющим полетом. Питается падалью, реже мелкой живой добычей. Характерна повадка разбивать крупные кости и панцири черепах, сбрасывая их с большой высоты на скалы. Особое строение языка позволяет бородачу извлекать костный мозг из трубчатых костей. Иногда ловит сурков, стремительно вылетая из-за ближайшего к сурчиной колонии укрытия. Голос — тихий свист.

Занесен в Красную книгу России.

7.1.14. Род Стервятники — *Neophron*

В России один редкий вид, встречающийся на Кавказе.



Стервятник [161] —
Neophron percnopterus
(Таблицы 10, 15)

Крупная птица с длинными широкими крыльями (размах около полутора метров) и клиновидным

хвостом. Лицевая часть головы голая, оранжево-желтая, на затылке и шее лохматый хохол. Взрослые птицы белые с черными концами крыльев, молодые темно-бурые. Полет парящий, реже машущий.


Несколько десятков пар сохранилось на Кавказе, на кочевках встречается в Предкавказье и крайне редко — на Алтае. Гнездится в нишах скал и обрывов в предгорьях и безлесных горах. В кладке 2 охристых с рыже-бурыми пятнами яйца. Питается падалью, пресмыкающимися, реже другой мелкой добычей.

Занесен в Красную книгу России.

7.1.15. Род Грифы — *Aegypius*

В России один редкий вид.

Черный гриф [162] —
Aegypius monachus
(Таблицы 10, 15)




Крупная птица с длинными и очень широкими крыльями (размах до 2,5 м) и коротким широким хвостом. Основной тон окраски темно-бурый, молодые птицы почти черные. Голова покрыта серым пухом, шея почти голая, голубоватая, вокруг основания шеи бурый воротник из рассученных перьев. Глаза черные, лапы серые. Полет парящий.

Гнездится в горах Кавказа и изредка Алтая, зимой встречается на кочевках на юге Дальнего Востока, в Предкавказье, реже в других районах юга России, залетает в среднюю полосу. Огромное гнездо строит на дереве, изредка на скалах и осыпях. В кладке одно белое с красноватыми пятнами яйцо. Гнездиться начинает очень рано, в конце зимы, когда в горах много трупов погибших от бескормицы и лавин копытных. Пищу высматривает, паря высоко в воздухе. Питается падалью, изредка мелкой живой добычей. Голос — тихое свистящее шипение.

У нас сохранилось всего несколько десятков пар, в связи с чем вид занесен в Красную книгу России, как находящийся под угрозой исчезновения.

7.1.16. Род Сипы — *Gyps*

В России три редких вида.



Белоголовый сип
[163] — *Gyps fulvus*
 (Таблицы 10, 15)

Очень крупная птица (размах крыльев 2 метра и больше), сложением похожая на грифа. Окраска свет-

лая, буровато-палевая сверху и светло-рыжеватая снизу, маховые и хвост черные. Молодые темнее. Голова и шея покрыты коротким густым белым пухом. Вокруг основания шеи воротник, у взрослых из белого пуха, у молодых из рассученных бурых перьев. Глаза желтые, лапы голубовато-серые. Полет парящий.

Обитает в горах Кавказа, на кочевках встречается в Предкавказье, на Южном Урале, реже в других регионах юга России. Гнезда устраивает на уступах скал. Кладка в конце зимы, состоит из одного белого яйца. Питается преимущественно падалью, которую высматривает, паря на огромной высоте или планируя вдоль горных склонов. Голос — громкое шипение.

Численность в нашей стране не превышает нескольких десятков пар, поэтому белоголовый сип занесен в Красную книгу России.

На Дон залетал индийский гриф — *Pseudogyps bengalensis* [164], черный с белыми спиной и пуховым воротником, размах крыльев свыше полутора метров.

7.2. Семейство Соколиные — *Falconidae*

Птицы различного размера с длинными, узкими острыми крыльями, узким хвостом. На нижней стороне надклювья зубец. Глаза черные, лапы у большинства видов желтые. Под глазами у многих видов темные или черные полосы — "усы". Полет стремительный, прямолинейный, с частыми взмахами крыльев. Добычу высматривают с воздуха, скал или деревьев.


Гнездятся на деревьях, скалах, на земле, иногда на крышах домов. Очень часто используют гнезда других птиц. В кладке 2-6, у мелких видов до 8, охристых или красновато-бурых яиц. Голос — громкие, звонкие отрывистые крики.

Крупные виды в последние десятилетия стали очень редки, некоторые из мелких местами обычны и даже многочисленны.

В России один род с девятью видами.

7.2.1. Род Соколы — *Falco***Кречет [165] — *Falco******gyrfalco***

(Таблица 16)




Самый крупный сокол, заметно больше вороны. Окраска спинной стороны от буровато-серой до дымчатой, в темных пестринах. Брюхо беловатое. "Усы" почти не заметны. Большая часть цевки оперена. Встречаются также чисто-белые или белые в мелких черных крапинках птицы, особенно часто в азиатской части ареала.

Обитает по берегам морей и рек Крайнего Севера. Гнездится на скалах, обрывах или на деревьях в лесотундре и северной тайге. В годы с низкой численностью белой куропатки, которая является его основным кормом в период размножения, иногда не гнездится. На кочевках встречается почти по всей России, чаще на севере и востоке. Питается птицами, которых бьет на лету, пикируя с большой скоростью, или ловит птиц и грызунов на земле.

Очень редок, занесен в Красную книгу России.

Балобан [166] — *Falco****cherrug***

(Таблица 16)




Похож на кречета, но несколько мельче, окраска с рыжевато-желтоватым оттенком, цевка оперена до половины. На Алтае встречаются темно-бурые птицы с заметными "усами", известные под названием "алтайский кречет". Крылья и спина более однотонные, пестрины на брюхе обычно продольные.

Гнездится на деревьях и скалах в лесостепях и степях, иногда на юге лесной зоны на осушенных торфяниках. Зимой часть птиц (особенно молодых) отлетает к югу. Питается грызунами, саранчой, реже птицами, которых нередко ловит на лету.

Редок, занесен в Красную книгу России.

В Дагестане может быть встречен редкий **средиземноморский сокол** — *Falco biarmicus*, гнездящийся в некоторых районах от Италии до Азербайджана. Он похож на балобана, но шапочка светло-рыжая, низ однотонный, только на боках несколько темных пестрин.




Сапсан [167] — *Falco peregrinus*
(Таблицы 15, 16)

Крупный (крупнее голубя) сокол. Спинная сторона аспидно-серая или почти черная, часто с размытыми поперечными полосами; брюшная белая, розоватая или охристая. На брюхе мелкие поперечные (у молодых продольные) пестрины, грудь в мелких темных пятнах. Верх головы и хорошо заметные "усы" черные. Цевка оперена меньше, чем до половины.

Обитает по всей стране от тундр до степей и гор. Гнездится на скалах и обрывах, занимает гнезда ворон и других хищных птиц. В тундре может устраивать гнездо прямо на земле, тогда это просто ямка, часто совсем без выстилки. Известны также гнезда в городах на высотных зданиях. Зимой большая часть птиц (на севере все) откочевывает к югу. Питается птицами, от уток до мелких воробьиных, а чаще всего куликами, которых бьет как на земле, так и на лету, пикируя с огромной скоростью и ударяя когтями задних пальцев. Изредка ловит грызунов и крупных насекомых. Во время броска на добычу развивает рекордную среди птиц скорость — до 300 км/ч.

Всюду редок, обычен только в некоторых районах Крайнего Севера, на берегах дальневосточных морей. Занесен в Красную книгу России.



Чеглок [168] — *Falco subbuteo*
(Таблица 16)

Похож на сапсана, но меньше (с голубя). Брюхо белое, у молодых птиц рыжеватое, с темными про-

дольными пестринами; подхвостье и оперение верхней части ног ("штаны") у взрослых птиц ярко-рыжие; спинная сторона серовато-черная без поперечного рисунка. "Усы" хорошо заметны. У молодых птиц верх с рыжеватыми каемками перьев, низ с крупными резкими черными пестринами. Крылья относительно длинные и острые, полет очень быстрый, ловкий и изящный.


Обитает по всей стране к югу от Полярного круга. Гнездится на деревьях, скалах, нередко занимает гнезда ворон. Перелетный вид. Добычу — крупных насекомых и мелких птиц — ловит на лету.

Дербник [169] — *Falco columbarius*

(Таблица 16)

Мельче голубя. Окраской несколько похож на кречета или балобана [165, 166]. Самец сверху сизый, снизу рыжеватый с темными продольными пестринами, самка сверху бурая, снизу охристая с бурыми пятнами. Хвост закругленный, более длинный, чем у чеглока, полосатый с темным концом. Крыло относительно короткое.


Гнездится на деревьях и скалах, изредка на земле от лесотундр до лесостепей. Довольно редкий перелетный вид, часть старых птиц зимой кочует по югу и средней полосе России. Питается мелкими птицами, грызунами, насекомыми, которых высматривает на бреющем полете.



Кобчик [170] — *Falco vespertinus*


(Таблица 16)

Мелкий, мельче голубя, острокрылый сокол. Самец аспидно-черный с рыжим подхвостьем и оперением ног, лапы и кольцо вокруг глаза красные. Самка и молодые сверху серые с поперечным рисунком, снизу охристые, с рыжей головой, черными "усами" и полосой через глаз, хвост в узких поперечных полосках. От пустельг [172, 173] отлича-



ются светлой головой, а взрослые — также грудью без резких пестрин, серыми сверху хвостом и плечами.

Обитает в основном в лесостепях и степях, реже в культурном ландшафте средней полосы от западных границ России и на восток до Байкала и Вилюя. Гнездится на деревьях в старых гнездах врановых птиц, иногда в дуплах. В лесополосах в грачевниках кое-где образует целые колонии. Перелетный вид. Кормится почти исключительно насекомыми, реже грызунами. Во многих местах численность в последние годы снижается.




Амурский кобчик
[171] — *Falco amurensis*
(Таблица 16)

Похож на кобчика [170], но у самца крыло снизу частично белое; самка и молодые отличаются темно-

серой головой с белым горлом и щеками; низ белый с резкими пятнами; оперение ног и подхвостье белые (а не рыжие, как у чеглока).

Гнездится на деревьях (реже в дуплах) в лесостепных ландшафтах Забайкалья и юга Дальнего Востока. Перелетный вид. Питается в основном насекомыми.



Пустельга [172] —
Falco tinnunculus
(Таблица 16)


Самая многочисленная из наших хищных птиц. Мелкий сокол с относительно широкими крыльями

и длинным, широким закругленным хвостом. У самца голова, хвост и надхвостье сизые, спина и крылья розовато-рыжие с черными пятнами, самка и молодые сверху ржаво-рыжие с темными поперечными полосами. По краю хвоста узкая белая и широкая черная полосы. "Усы" темные, когти черные. Характерна привычка зависать в воздухе, опустив хвост и трепеща поднятыми крыльями.

Гнездится в старых гнездах врановых, дуплах, нишах скал, на чердаках домов, реже на земле в открытом ландшафте на большей части страны, в том числе в городах, где изредка остается на зимовку. В лесостепях и степных лесополосах иногда образует колонии, часто совместно с кобчиком. Питается грызунами, насекомыми, реже мелкими птицами.

Степная пустельга
[173] — *Falco naumanni*
(Таблица 16)

Очень похожа на пустельгу, но несколько мельче, самец без черных пятен и "усов", самка и молодые птицы отличаются только белыми когтями.



Обитает в степях и полупустынях. Гнездится в россыпях камней, реже в дуплах, норах или развалинах построек. Перелетный вид. Питается насекомыми, реже мышевидными грызунами. В последние годы численность повсюду резко снижается, и еще недавно обычная степная пустельга теперь занесена в Красную книгу России.

8. Отряд Курообразные — *Galliformes*

Вся суровая красота, вся вечная загадочность нашей земли — в сокровенном чуде глухариного тока, в этом величественном таинстве окутанных туманом весенних болот.

Михаил Пришвин. Весна в Мещере .

Курообразные — птицы от мелких (перепел) до очень крупных (глухарь), легко узнаются по плотному телосложению и сильным, приспособленным к разгребанию земли ногам. Полет быстрый, обычно прямолинейный, с частыми взмахами коротких широких крыльев. Обычно летают лишь на небольшие расстояния, зато способны к стремительному взлету при опасности. Взлетают вертикально и обычно очень шумно — внезапные вспархивания рябчиков из-под ног заставляют вздрогнуть даже бывалых таежников.

Гнездо — небольшая ямка на земле с редкой выстилкой. Самцы обычно крупнее самок и ярче окрашены. Пуховые птенцы похожи на цыплят домашней курицы, отличаясь защитной окраской, и так же способны самостоятельно кормиться с первого дня жизни. Питаются растительной пищей, летом также насекомыми.

Отряд включает ряд ценных охотничьих видов, но их численность во многих местах резко снизилась из-за перепромысла, отравления ядохимикатами и удобрениями, а вблизи населенных пунктов — из-за преследования со стороны бродячих собак и кошек.

В России два семейства.

8.1. Семейство Тетеревиные — *Tetraonidae*


Птицы средних и крупных размеров, ноздри прикрыты перьями, цевка оперена более чем до середины. Обитают в лесах, тундрах, зарослях кустарников у верхней границы леса в горах. Зимой нередко ночуют, зарываясь в снег. Приспособлены к питанию грубыми растительными кормами, благодаря чему могут зимовать даже в условиях полярной ночи и семидесятиградусных морозов.

В России пять родов.

8.1.1. Род Рябчики — *Bonasa*

В России один широко распространенный вид.

Рябчик [174] — *Bonasa bonasia*
(Таблица 17)



Размером заметно крупнее голубя, рыжевато-серый с поперечной рябью, перья на груди и брюхе черные с широкими белыми каемками, у самца на горле черное пятно. У встревоженных птиц на голове поднимается короткий хохолок. При взлете видна черная, окаймленная белым поперечная полоса по краю хвоста, разбитая надвое однотонными центральными рулевыми перьями. Рябчик очень шумно взлетает, но садится совершенно беззвучно. Встречается чаще всего парами, в конце лета и осенью — выводками по 3-10 птиц.


Гнездится по долинам мелких речек и ручьев почти всюду в лесной зоне, хотя в средней полосе Европейской части России стал довольно редким; по поймам рек заходит в лесотундру. Предпочитает леса с густым подлеском. Весной самцы поют и совершают шумные токовые полеты, перелетая с дерева на дерево. Гнезда часто устраивает под прикрытием поваленного дерева. В кладке 7-10 красновато-желтых с коричневыми крапинками яиц. Насиживающая самка сидит на гнезде так плотно, что иногда позволяет дотронуться до себя рукой. Зимует в местах гнездования, в сильные мо-

розы выходит из-под снега только для кормежки. Летом питается травянистыми растениями, семенами, ягодами, насекомыми; зимой — почками, сережками и молодыми побегами лиственных деревьев, в основном ольхи и березы. Голос самца — характерный нежный свист, заканчивающийся короткой трелью. Самка более молчалива, но иногда издает такую же трель.

Ценный охотничий вид.

8.1.2. Род Дикуши — *Falcipectes*

В России один редкий вид.



Азиатская дикуша
[175] — *Falcipectes*
falcipennis
(Таблица 17)

Несколько напоминает рябчика, но темнее, перья на груди и брюхе черные с белыми каемками. Взрослые самцы черные с белыми пестринами и белыми поперечными полосами снизу, самки бурые.

Обитает в юго-восточной Якутии, Приамурье, Сихотелине и на Сахалине. Населяет в основном темнохвойные леса из аянской ели. В кладке 10-12 охристых с каштановыми пятнами яиц. Летом питается растительными кормами и насекомыми, зимой — хвоей ели, пихты, реже лиственницы. Весной самцы токуют, обычно поодиночке. Они раскрывают веером хвост, подпрыгивают и издают громкое шелканье. Оседла, зимой иногда по многу дней кормится на одном дереве.

Дикуша очень близко подпускает человека, поэтому во многих местах стала редка или исчезла. За пределами нашей страны практически не встречается. Занесена в Красную книгу России, но по-прежнему истребляется местным населением.


8.1.3. Род Тетерева — *Lyrurus*

Крупные (с курицу) птицы, самцы черные с удлиненными загнутыми перьями по бокам хвоста ("косицами"), самки рыжевато-бурой окраски с мелким черным рисунком.

Весной собираются группами в определенных местах для брачных игр — токования. Токовое поведение самцов, хотя и значительно более вялое, может наблюдаться также осенью. В кладке 5-11 охристых с коричневыми пятнами яиц. Питаются летом травянистыми растениями, ягодами, насекомыми, зимой — березовыми почками и сережками, хвоей и молодыми шишками хвойных деревьев. Оседлы, лишь изредка совершают короткие кочевки. Зимой встречаются стаями.

Два вида.

Тетерев [176] — *Lygurus tetrix*
(Таблица 18)




Самец с белыми полосами на крыле, "косицы" развернуты в стороны. Самка буровато-рыжая, отличается от других тетеревиных белым зеркальцем на крыле и слегка вырезанным хвостом.

Обитает в лесах и перелесках на большей части лесной и лесостепной зон. Придерживается светлых березняков, редколесий, зарастающих вырубок и гарей, опушек. Зимой стаи тетеревов встречаются только в тех лесах, где много березы, почки и сережки которой — основной зимний корм тетерева.

Весной самцы-косачи по утрам слетаются на тока, где бегают друг за другом с характерными звуками: бормотанием и шипящим "чуфыканьем"; иногда дерутся. Интересно, что хотя бормотание намного тише, чем "чуфыканье", слышно его гораздо дальше. Тетерки держатся по краям тока, их голос — громкое квохтанье. Обычно они первыми замечают опасность и криком предупреждают увлеченных выяснением отношений косачей. Незаметно подкрасться к току почти невозможно, тем более что расположены они на открытых местах (лугах, полях, моховых болотцах) вблизи опушек. Но можно спрятаться неподалеку с вечера и наблюдать за тетеревами из укрытия.

В средней полосе Европейской части России стал редок, прежде всего в центральных областях, хотя еще в послевоенные годы встречался даже на окраинах Москвы. В некоторых районах все еще обычен, особенно в Западной Сибири. Изредка встречаются гибриды тетерева с глухарем (межняки) и крайне редко — с белой куропаткой.



Кавказский тетерев
[177] — *Lururus*
mlokosiewiczii
(Таблица 18)

"Косицы" у самца загнуты вниз, самка однотонно-серая.


Гнездится в кустарниковых зарослях у верхнего края леса в высокогорной части Главного Кавказского хребта, на высоте 2000-2200 м над уровнем моря. На токах собирается небольшими группами, самцы по очереди молча вспархивают, громко хлопая крыльями. Зимой питается в основном хвоей.

Редок, занесен в Красную книгу России.

8.1.4. Род Глухари — *Tetrao*

Очень крупные, с гуся, птицы с относительно длинным закругленным хвостом. Населяют чаще всего светлохвойные леса, питаются летом травянистыми растениями, ягодами, зимой в основном хвоей. В кладке 5-9 охристых с коричневыми пятнами яиц. Зимуют обычно недалеко от мест гнездования, иногда совершают сезонные кочевки. Осенью, в частности, вылетают на берега рек, где поедают мелкую гальку (эти камешки способствуют перетиранию пищи в желудке). Крайне осторожны. Взлет очень шумный. Весной собираются для токования в определенных местах, и такие токовища существуют иногда веками. В литературе за глухарем закрепилось выражение "древняя птица", но с точки зрения палеонтологии, глухарь значительно моложе чем, например, курица.

Два вида.



Глухарь [178] — *Tetrao*
urogallus
(Таблица 18)

Самец окрашен в бурые, черные и темно-серые тона, с белыми пятнами на брюхе и на нижней


стороне крыла, мощным светлым клювом. Самка буровато-рыжая с черной рябью. Летом встречается поодиночке, зимой — небольшими стайками.

Гнездится в глухих лесах, чаще всего сосновых, по краям болот и гарей, в буреломах, к востоку до Вилюя и Шилки. Летом питается травой, семенами, ягодами; зимой — хвоей сосны, почками осины и лиственницы.

Весной самцы токуют по утрам на земле или на дереве, запрокидывая голову и поднимая раскрытый веером хвост. Для тока они с вечера прилетают на определенные места, чаще всего по окраинам поросших сосной моховых болот. Токовая песня состоит из двух колен, первое из которых напоминает пощелкивание ногтем по коробку спичек, а второе — скрип ножа по точилу. Во время точения самец на несколько секунд буквально глохнет, и именно это время используется охотниками для подхода к поющей птице. У глухарей Северо-Запада песня изредка начинается звуком, похожим на хлопок бутылки с шампанским. Глухарки прилетают на ток утром, их голос — глухое "бук-бук" — слышен очень редко.

Ценный охотничий вид, хотя промысловая численность сохранилась лишь в немногих местах. Еще в начале XX века в Подмоскovie были известны тока, на которые собирались десятки птиц, а отдельные глухари встречались даже в Измайловском парке. Сейчас ближе 100 км от Москвы глухарей нет. Одной из причин исчезновения глухаря стал рост численности кабанов, которые уничтожают гнезда птиц. Кое-где глухарей сейчас разводят в неволе для завоза в те места, где они истреблены.

Каменный глухарь
[179] — *Tetrao*
parvirostris
(Таблица 18)



Самец черный с белыми пятнами на крыльях и надхвостье, черным клювом.

Самка отличается от самки глухаря отсутствием рыжего цвета на груди и более темной окраской.

Гнездится в основном в разреженных лиственничных лесах восточнее Енисея, на Камчатке — в рощах каменной бе-

резы. Тока расположены по окраинам верховых болот, недалеко от лесных озер или просто в густом лесу. Токуют на земле. Песня состоит только из шелкания, и самец во время токования не глохнет. Поэтому подобраться к токующим каменным глухарям гораздо труднее, чем к обыкновенным. Питается почками и побегами лиственницы и березы. Обкусывая концевые почки с веточек молодых лиственниц, глухарь добивается того, что через год-два крона дерева становится более густой и компактной, как после обрезки садовником. На таком дереве глухарю намного удобнее кормиться.

Местами служит объектом охоты, хотя численность почти повсюду невелика и подвержена резким колебаниям. В Якутии популяции каменного глухаря расположены в десятках километров друг от друга. Только на юге Камчатки он обычен, и там на тока собирается до 20 птиц.

8.1.5. Род Белые куропатки — *Lagopus*

Среднего размера (с ворону) птицы. Зимой и самец и самка чисто-белые с черными рулевыми перьями, летом пестрые, рыжеватые с черными пестринами, белыми крыльями и лапами. Весной у самцов бывает промежуточная, контрастная окраска. У птиц в зимнем наряде лапы полностью покрыты густым белым оперением, а когти увеличиваются в длину за счет нарастания наружного слоя. Такая лапа хорошо приспособлена для раскапывания снежного покрова и удерживает птиц на поверхности даже рыхлого снега.

Во время тока самцы яростно набрасываются на нарушителей гнездового участка. Иногда они настолько распаляются, что пытаются атаковать даже белых сов, поморников, собак и проходящих мимо людей. В кладке 6-15 пестрых коричневатых яиц. Насиживающая самка подпускает человека вплотную, а затем, притворяясь раненой, "отводит" от гнезда. Пары во время насиживания кладки не расстаются, и самец держится неподалеку от гнезда, охраняя его. Питаются побегами и почками деревьев и кустарников, летом — травянистыми растениями, ягодами, насекомыми. Характерны резкие колебания численности по годам.

В России два вида.

Белая куропатка
[180] — *Lagopus lagopus*
 (Таблица 17)

Летом основной тон окраски рыже-бурый, весной самец белый с коричневыми головой и шеей.




Гнездится в тундрах (в основном кустарниковых и моховых), лесотундрах, на моховых болотах в тайге и в березовых колках среди заболоченной лесостепи. Зимой собирается в стайки, из тундр обычно откочевывает к северной границе леса. Во время миграций белые куропатки иногда сплошь облепляют деревья в долинах рек лесотундровой зоны. Раз в несколько лет их стаи наводняют Воркуту и Салехард. Если вам придется ехать зимой на поезде в любой из этих городов, вы наверняка заметите из окна белых куропаток, словно гигантские снежки на ветвях придорожных елей. Голос самца — резкий трескучий хохот и затем тихий двусложный крик.

Важный объект промысла на Севере. Среднерусский подвид стал очень редким из-за осушения болот и занесен в Красную книгу России.

Тундрная куропатка
[181] — *Lagopus mutus*
 (Таблица 17)

Летом основной фон окраски серый, особенно у самца. Весной самцы темные с белым брюхом и пятнами на спине (токуют еще до смены оперения, когда окраска белая с отдельными черными пятнами). Зимой самец отличается от белой куропатки черной полосой между клювом и глазом, самка — только светлыми когтями и более тонким клювом (птицы в стае почти всегда одного вида).



Гнездится в тундрах, преимущественно горных и каменистых, в горах Сибири выше границы леса, а также на некоторых арктических и дальневосточных островах. Более оседла, чем белая куропатка, но зимой часто откочевывает вниз с гор или в южные тундры из северных, на Земле

Франца-Иосифа зимует на побережье. Голос самца — хриплый крик. Объект охоты.

8.2. Семейство Фазановые — *Phasianidae*


Птицы от мелких до крупных размеров, цевка оперена менее, чем до половины. Населяют преимущественно открытые ландшафты и заросли кустарников в средней полосе и на юге. Питаются разнообразными растительными кормами, в основном семенами, почками и побегами травянистых растений, летом также насекомыми.

В России пять родов.

8.2.1. Род Перепела — *Coturnix*

Мелкие (немного больше скворца) перелетные птицы. Взлетают неохотно и садятся, пролетев небольшое расстояние. Населяют луга, поля, высокотравные степи. В кладке 7-12 охристых с бурыми пятнами яиц. Скрытные птицы, преимущественно ночные.

В России два вида, различающиеся в основном по голосу.




Перепел [182] —
Coturnix coturnix
(Таблица 21)

У самцов горло обычно бурое, у самок — белое.

Гнездится на большей части территории страны (кроме Севера) до Прибайкалья на востоке. Отдельные птицы иногда остаются зимовать, особенно в южных регионах. Голос самца — тихое двусложное "ва-ва" (слышно только вблизи), затем громкое, чистое двусложное "подъ-полоть".

Объект охоты, на юге иногда содержится в качестве клеточной птицы. Численность во многих местах резко снизилась, в основном из-за хищнического промысла в странах, где этот вид бывает на пролете и зимовках.

**Немой перепел [183] —
Coturnix japonica**
(Таблица 21)



У самца горло и щеки коричневые, у самки на груди охристый налет. Осенью на подбородке удлиненные острые перышки. Обитает на юге Восточной Сибири и Дальнего востока. Голос — тихое трехсложное "чу-пит-трр". Местами объект охоты и клеточного разведения.


8.2.2. Род Серые куропатки — *Perdix*

Среднего размера (с ворону) птицы полей, лесостепей и степных кустарников. Общая окраска издали кажется однотонно-серой, вблизи заметны белые пестрины на спине, коричневые поперечные полосы на боках, рыжая голова, бурое пятно на брюхе в форме подковы концами вниз (у самок иногда отсутствует). Лапы и клюв бурые. Стайка взлетает с легким дребезжащим звуком. Быстро бегают, летают обычно на небольшие расстояния.

В кладке 14-20 (иногда до 24) однотонных сероватых яиц. Насиживают кладку и водят птенцов оба родителя. Питаются семенами и побегами растений, ягодами, насекомыми. Оседлы, но в суровые зимы откочевывают несколько к югу или в места с более тонким снежным покровом. Там, где зимой ночуют серые куропатки, можно найти круглые углубления в снегу диаметром до полуметра. Дело в том, что на ночевке птицы располагаются так, что образуют тесный круг головами наружу.

В России два трудноразличимых вида.


**Серая куропатка
[184] — *Perdix
perdix***
(Таблица 17)



Горло и щеки ржавого цвета, пятно на брюхе с ржавым оттенком.

Встречается по всей Европейской части России, кроме севера, на юге Западной Сибири, в безлесных горах Кавказа и

Алтая до высоты 2000 м. Обычна в Предкавказье, Поволжье и на Дону. На севере ареала иногда полностью исчезает после суровых зим. Голос — громкое "кирр-рек". Объект охоты.



Бородатая куропатка
[185] — *Perdix daurica*
(Таблица 17)


Горло и щеки охристые, на зобу часто желто-охристое пятно; если есть подковообразное пятно на брюхе, то оно темно-бурое или черное. Осенью и зимой по бокам головы бывают пучки жестких перьев до 2 см длиной.

Гнездится в сухих каменистых степях и предгорьях от Алтая до бассейна Амура. Голос — хриплые односложные крики.

Объект охоты в Сибири, особенно в южном Забайкалье. Амурский подвид занесен в Красную книгу России.

8.2.3. Род Кеклики — *Alectoris*

В России один горный вид.



Кеклик [186] — *Alectoris chukar*
(Таблица 17)

Среднего размера (с ворону) птица с однотонно-серым оперением, на горле светлое пятно, окаймленное резкой черной полосой. На боках поперечные черные, белые и коричневые полосы. Клюв и кольцо вокруг глаза красные, лапы розовые.

Обычен на Кавказе, изредка встречается в низкогорьях Алтая, гор Танну-Ола и, возможно, Хакасии. Гнездится в безлесных горах и пустынных предгорьях. В кладке 7-11 охристых яиц. Питается побегами и семенами растений, насекомыми. Зимой придерживается малоснежных склонов. От опасности убегает вверх по склону. Голос — громкое убывающее квохтанье.

На Кавказе местами объект охоты.

8.2.4. Род Улары – *Tetraogallus*


Крупные (заметно больше курицы) птицы сероватой окраски, населяющие горы выше границы леса. При опасности убегают вверх по склону, а летят обычно вниз быстрым планирующим полетом. Очень осторожны.

Гнездятся под защитой скал или камней. В кладке 5-12 сероватых с нерезкими пятнами яиц. Зимой придерживаются бесснежных склонов. Голос — громкий протяжный восходящий свист и грубое квохтанье.

Стайки уларов часто кормятся вместе со стадами диких копытных, особенно горных козлов и баранов. Обычно улары ночуют в скалах у гребней хребтов, утром планируют к зеленым лужайкам у горных ручьев и в течение дня кормятся, постепенно поднимаясь пешком вверх по склону. Питаются побегами и семенами растений, иногда насекомыми.

В России два редких вида.


Кавказский улар
[187] — *Tetraogallus*
caucasicus
(Таблица 18)



Окраска темная, особенно снизу. Гнездится в высокогорной части Главного Кавказского хребта на высотах 2500-3500 м над уровнем моря, зимой спускается до 2300 м.

Местами объект охоты.

Алтайский улар [188] —
Tetraogallus altaicus
(Таблица 18)




Окраска серая с белым брюшком. Гнездится в высокогорьях Центрального Алтая, Западных Саян и гор Танну-Ола на высотах 2000-3000 м.

Занесен в Красную книгу России.

8.2.5. Род Фазаны — *Phasianus*

В России один вид.



Фазан [189] —
Phasianus colchicus
(Таблица 18)

Крупная птица, узнаваемая по узкому, в полете клиновидному, очень длинному хвосту. Самец яркий,

медно-красный или золотисто-оранжевый, с темными пестринами, сине-зеленой с блеском головой, участком голой красной кожи по бокам головы, коротким хохлом, часто с белым ошейником. Самка буровато-серая с темными пестринами.

Гнездится на юге Дальнего Востока и (подвид без белого ошейника) в Прикаспии. Населяет предгорья с зарослями кустарников, тростниковые крепи, пойменные леса, окраины полей. Весной можно наблюдать турнирные бои самцов, в это время участки голой кожи по бокам головы у них становятся ярко-алыми. Гнезда устраивает на земле. В кладке 8-24 оливковых яиц. Питается плодами, семенами и побегами растений, насекомыми и другими мелкими беспозвоночными. Зимой придерживается малоснежных участков, а в случае затяжных и обильных снегопадов нередко гибнет от бескормицы. При опасности уходит пешком, скрываясь в густых зарослях, или шумно взлетает вертикально вверх и затем летит, снижаясь. Голос — хриплый двусложный крик, напоминающий незаконченный крик петуха. Объект охоты. Северокавказский подвид занесен в Красную книгу России.

В Предкавказье, на Дону, в Калининградской области расселен так называемый **охотничий фазан** — гибрид разных географических подвидов, внешний облик которого может несколько отличаться от дикого фазана.

К семейству Фазановых относится также домашняя курица, происходящая от обитающей в Индии дикой **банкивской курицы** — *Gallus gallus*. В южных районах России в качестве домашней птицы встречается одомашненная форма африканской обыкновенной **цесарки** — *Numida meleagris* из семейства **Цесарковых** — *Numididae*. Домашняя индейка происходит от североамериканской **дикой индейки** — *Meleagris gallopavo* из того же семейства.

9. Отряд Журавлеобразные — Gruiformes

*Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня.*

Расул Гамзатов. Журавли .

Любимый поэтами журавль — одна из самых популярных в России птиц, но некоторых из его более мелких родственников знают лишь профессионалы-орнитологи, да и те чаще "в теории". Хотя полутораметрового роста журавли с виду совсем не похожи на маленького погоныша или лысуху, все они относятся к одному отряду. Журавлеобразные — перелетные обитатели преимущественно открытых ландшафтов, болот и водоемов, всеядные птицы, питающиеся семенами, корневищами и клубнями, молодыми побегами, насекомыми и моллюсками, иногда водными растениями, мелкой рыбой и лягушками. Гнездятся они на земле, отдельными парами; птенцы с первых дней покидают гнездо и держатся вместе с родителями.

В отряде много семейств, но почти во всех семействах всего по несколько видов. Это, вероятно, свидетельствует, что расцвет журавлеобразных закончился в далеком прошлом, а до наших дней дожили лишь немногие. Теперь большинство видов стали редкими из-за охоты, мелиорации, распашки степей и загрязнения среды обитания.

В России четыре семейства.

9.1. Семейство Журавлиные – *Gruidae*

Очень крупные птицы с длинными тонкими ногами и шеей, маленькой головой и острым прямым клювом, более коротким и тонким, чем у аистов. У стоящей птицы хвост кажется длинным и пышным из-за удлинённых и рассученных третьестепенных маховых перьев крыла. Полет машущий, изредка парящий, шея летящей птицы вытянута. Стая обычно выстраивается клином.

Так называемые танцы журавлей можно увидеть в основном весной или осенью, когда птицы держатся стаями. У каждого вида своя манера танца. Весной журавли разбиваются на пары, причем иногда молодые самец и самка знакомятся еще на зимовке. На месте будущего гнезда самец и самка танцуют вдвоем. Этот весенний танец выглядит совсем по-другому и сопровождается так называемым антифональным пением, когда двое кричат по очереди так, что издали кажется, будто это голос одной птицы.

В кладке 2 (реже 1-3) оливковых с красноватыми пятнами яйца. Пуховые птенцы желтовато-рыжие. В питании преобладают различные части растений — побеги, корневища, семена, а также насекомые, режее лягушки и мышевидные грызуны. Журавлей по праву можно отнести к числу красивейших птиц мира, но, к сожалению, большинство видов уже оказалось в Красной книге.

В настоящее время осуществляется российско-американская программа по разведению в неволе наиболее редких из них.


В России два рода.

9.1.1. Род Журавли – *Grus*

Рост около метра-полутора, размах крыльев 1,8-2,4 м. На голове у взрослых птиц участок голой красной кожи, у молодых голова рыжеватая. Обитатели болот и тундр, на пролете встречаются стаями на полях, лугах и в степях. Гнезда из стеблей и листьев осоки, веток устраивают на кочках, часто окруженных водой.

В России шесть видов.


Серый журавль [190] —
Grus grus
 (Таблица 19)



Крупный журавль (ростом выше метра), серый с черными концами крыльев и ногами, красной шапочкой на темени, черно-белой окраской головы и шеи. Молодые рыжеватые.

Гнездится на верховых и травяных болотах, заросших побережьях озер и рек на большей части страны южнее лесотундры, но повсюду редок, кроме некоторых районов северо-запада Европейской части и Барабинской низменности. Гнезда, как правило, расположены далеко друг от друга, но перед отлетом журавли собираются в стаи. На пролете из года в год останавливаются для отдыха в одних и тех же местах, кое-где тысячами. Голос — громкие трубные крики, которые у высоко летящей стаи сливаются во всем известное курлыканье.


Канадский журавль
[191] — *Grus*
canadensis
 (Таблица 19)



Похож на серого журавля, но гораздо мельче (ростом до метра), окраска серая, обычно с рыжим или красноватым оттенком, на лбу и темени красная шапочка, щеки и горло беловатые, концы крыльев темно-серые. Молодые рыжеватые.

Гнездится в сухих равнинных и долинных тундрах, на склонах холмов восточнее Колымы, обычен в прибрежных районах Чукотки. Голос выше и тише, чем у серого журавля.


Черный журавль
[192] — *Grus monacha*
 (Таблица 19)



Мелкий журавль (ростом около метра), черно-серый, голова и шея белые, на лбу

красная шапочка. У молодых голова и шея бело-охристые. Гнездится на лиственничных марях и верховых болотах северного Приморья, Приамурья, Южной Якутии, возможно нахождение в других районах Сибири и на Сахалине. Негнездящиеся птицы летом иногда кочуют в Забайкалье. Голос более высокий, тихий и хриплый, чем у серого журавля.

Повсюду редок. Занесен в Красную книгу России.




Даурский журавль
[193] — *Grus vipio*
(Таблица 19)

Крупный журавль (ростом выше метра), светло-серый с белыми головой, горлом и задней стороной

шеи, остальные части шеи и грудь темные, щеки, лоб и ноги красные, крылья светлые с черными концами. У молодых крылья и затылок рыжеватые.

Гнездится на заболоченных лугах и тростниковых болотах на юге Приморья, Приамурья и Забайкалья. Голос как у серого журавля, но тише.

Очень редок, занесен в Красную книгу России.



Японский журавль
[194] — *Grus japonensis*
(Таблица 19)


Очень крупный журавль (рост свыше полутора метров), белый с черными горлом, частью шеи,

удлиненными перьями на заднем крае крыла и ногами, темя красное. Молодые белые с рыжими пятнами, голова и шея серо-рыжие.

Гнездится на заболоченных лугах и травяных болотах Приморья, бассейна Амура и Южных Курил. Голос громче и более хриплый, чем у серого журавля.

Очень редок, занесен в Красную книгу России.

Стерх [195] — *Grus leucogeranus*
(Таблица 19)



Крупный журавль (рост выше метра), белый с черными концами крыльев, лоб и ноги красные. Молодые рыжие, позже белые с рыжими пятнами.


Гнездится в заболоченных тундрах и лесотундрах Северо-Восточной Якутии и на таежных болотах Приобья. Только что вылупившиеся птенцы очень агрессивны друг к другу, и обычно один из них убивает другого. Вероятно, это приспособление к суровым условиям Севера. Голос очень звонкий, не похож на голос других журавлей.

Гнездится только в нашей стране. Редок, особенно в Приобье. Занесен в Красную книгу России. Сейчас разработана методика разведения стерхов в неволе, но возвращение выращенных таким образом птиц в природу — исключительно сложное дело.

9.1.2. Род Журавли-красавки — *Anthropoides*

В России один редкий вид.

Красавка [196] — *Anthropoides virgo*
(Таблица 19)



Мелкий журавль (рост меньше метра, размах крыльев 1,6-1,8 м). Клов короче головы. У взрослых позади глаз пучки тонких белых перьев. Общая окраска пепельно-серая, маховые перья, горло, шея и грудь черные. Молодые птицы серые.

Гнездится по всей степной зоне в целинных степях, в последнее время иногда на полях. Голос — высокий скрипучий крик. В связи с полной распашкой степей стала очень редкой, хотя в последние годы численность, видимо, восстанавливается. Занесена в Красную книгу России.

9.2. Семейство Пастушковые — *Rallidae*

Мелкие и средней величины птицы с острым клювом, сильными четырехпалыми ногами, коротким, обычно вздернутым хвостом, широкими короткими крыльями. Пальцы длинные, у лысух — с кожистой оторочкой по бокам. Мелкие виды имеют маскирующую окраску, часто с поперечным рисунком на боках. Более крупные виды — однотонной окраски с яркой кожистой бляшкой над клювом и красными глазами.


Полет машущий, прямолинейный, на близкие расстояния обычно летят неохотно, со свисающими ногами, но при дальних перелетах вытягивают ноги и летят довольно быстро. С воды обычно взлетают с длинного разбега.

Большинство видов обитает в тростниковых крепях, на сырых лугах, полях и болотах, заросших озерах, на пролете встречаются в степях, лысухи зимуют в морских заливах. Гнезда сделаны из стеблей водных растений, расположены обычно у воды, иногда от гнезда к воде ведут своего рода сходни из стеблей тростника. Пуховые птенцы черные, часто с яркими пятнами на голове, которые служат для родителей таким же сигналом к кормлению, как желтый рот у птенцов воробьиных. Все виды хорошо плавают.

В России восемь родов.

9.2.1. Род Коростели — *Crex*

Один вид.



**Коростель [197] —
Crex crex
(Таблица 20)**

Размером крупнее перепела [182], светлой окраски короткоклювая птица, рыжеватая с темными пестринами сверху, серая со светлым горлом снизу. В полете заметны рыжеватые кроющие перья крыла.


Распространен от лесной до степной зоны, от западных границ России до Прибайкалья и Витима. Гнездится на сырых лугах, полях, лесных полянах. В кладке 8-12 охристых с красно-бурыми пятнами яиц. Взлетает неохотно. Питается

насекомыми, червями, улитками и семенами. Голос — громкое скрипучее "крэк-крэк". Активен в основном ночью. С распространением механического сенокосения коростель во многих местах стал довольно редок.

9.2.2. Род Пастушки — *Rallus*

В России один вид.

Водяной пастушок
[198] — *Rallus aquaticus*
(Таблица 20)



Скрытная, преимущественно ночная птица размером с перепела [182], с длинным, слабо изогнутым книзу красным клювом и желто-зелеными лапами. Спинная сторона коричневая с темными продольными пестринами, брюшная темно-серая, подхвостье белое.


Распространен от лесной до степной зоны, от западных границ России до Дальнего Востока. Обитает по заросшим берегам озер, заболоченным лугам. В кладке 7-10 рыжеватых с красно-коричневыми пятнами яиц. Голос напоминает визг поросенка. Питается мелкими беспозвоночными, реже мальками рыб и лягушками, при случае падалью. Кормится в камышах и на отмелях, охотно плавает. Местами объект охоты.

9.2.3. Род Погоныши — *Porzana*

Очень скрытные, преимущественно сумеречные и ночные птицы размером со скворца или чуть крупнее, населяющие заросли тростников, сырые луга и травяные болота. Питаются в основном мелкими беспозвоночными, а также семенами и другими частями водных растений.

Из всех птиц средней полосы России погонышей, пожалуй, труднее всего увидеть. Можно много дней провести в тростниковых крепях или на травяных болотах, постоянно слышать крики погонышей, подолгу кормить комаров, сидя в скрадке, прежде чем перед вами мелькнет на мгновение силуэт крадущейся сквозь заросли птицы.


В России шесть трудноразличимых видов.



Обыкновенный погоныш
[199] — *Porzana porzana*
(Таблица 20)

Спинная сторона темно-бурая с черными пестринами и белыми точками, брюшная серая с белыми пятнышками, подхвостье светлое. Заметно темнее коростеля [197].


Распространен от лесной до степной зоны, от западных границ России до Тувы. Изредка попадает на глаза, когда кормится у кромки камышей. В кладке 8-10 охристых с коричневыми пятнами яиц. Голос — громкий отрывистый односложный свист.



Малый погоныш
[200] — *Porzana parva*
(Таблица 20)

Спинная сторона коричневая, брюшная серая или охристая. Клюв у основания красноватый, подхвостье с резкими поперечными полосками. На боках серые полосы.

Распространен в лесостепной и степной полосе Европейской части России. Гнездится в густых зарослях камыша и осоки, реже в затопленных ольшаниках. Часто плавает. В кладке 7-9 желтовато-серых с размытыми пятнами яиц. Голос — мелодичная квакающая трель.




Погоныш-крошка
[201] — *Porzana pusilla*
(Таблица 20)

Очень похож на малого погоныша, но мельче, полосы на боках черные, основание клюва зеленоватое, спина в белых точках.

Гнездится на болотах и заболоченных лугах почти повсюду к югу от таежной зоны. Плавает редко. Голос — тихое стрекотание и свист.


Красноногий погonyш
[202] — *Porzana fusca*
 (Таблица 20)



Спинная сторона одно-
 тонно-темная, бока бурые,
 брюхо и щеки красно-каш-
 тановые, подхвостье поло-
 сатое, ноги красные.

Гнездится на лугах и в поймах рек Приморья и Южного
 Сахалина. В кладке 4 серых с коричневыми пятнами и штри-
 хами яйца. Голос — тихий односложный металлический крик.
 Очень редок, занесен в Красную книгу России.


Большой погonyш [203]
— *Porzana paykullii*
 (Таблица 20)



Крупнее других погony-
 шей, спинная сторона бу-
 рая, бока с бурыми и белы-
 ми поперечными полоска-
 ми, брюхо и щеки рыжие, подхвостье полосатое, ноги темные.

Гнездится на сырых лугах и кустарниковых болотах юга
 Дальнего Востока. В кладке 6-9 охристых с коричневыми
 пятнами яиц. Голос — металлическая трель.

Белокрылый погonyш
[204] — *Porzana*
exquisita
 (Таблица 20)




Мельче скворца, спин-
 ная сторона буроватая с
 темными продольными по-
 лосками и белыми поперечными черточками, брюхо светлое,
 бока с поперечными полосками, подхвостье полосатое. На
 крыльях яркие белые пятна. Ноги светло-бурые.

Гнездится на сырых лугах. В кладке 8-10 темно-желтых с
 коричневыми пятнами яиц. Известен по нескольким наход-
 кам на юго-востоке Забайкалья, на реке Зeya и в Южном
 Приморье. Занесен в Красную книгу России.

9.2.4. Род Камышницы — *Gallinula*

В России один вид.



**Камышница [205] —
Gallinula chloropus
(Таблица 21)**


Небольшая (с голубя) водоплавающая птица одно-тонной буровато-черной окраски с красной кожистой

бляшкой над красным с желтым кончиком клювом. На боку узкая белая полоса, ноги зеленоватые. Подхвостье белое с черной полосой. Молодые птицы светло-бурые, без бляшки, клюв серо-желтый. Плавая, все время подергивает головой и поднятым вверх хвостом. Взлетает без разбега. Днем держится в тростниковых зарослях, в сумерках кормится на открытой воде, изредка ныряет.

Обычна на заросших водоемах средней полосы и юга России. В кладке 6-10 коричневатых с красноватыми пятнами яиц. Питается преимущественно беспозвоночными, которых склевывает с листьев водных растений. Голос — громкий стрекочущий крик.

9.2.5. Род Рогатые камышницы — *Gallicrex*

В России один очень редкий дальневосточный вид.



**Рогатая камышница
[206] — *Gallicrex*
cinerea
(Таблица 21)**

Похожа на камышницу, но крупнее; самец летом черный с красной бляхой на лбу, образующей короткий вырост, красным с желтым кончиком клювом; самка и самец зимой бурые с желтой бляхой и зеленоватыми ногами. Молодые охристые с темными пестринами.


Гнездится на юге Приморья и, возможно, на Курильских островах на болотах, высокотравных лугах и рисовых полях. В кладке 3-6 желтоватых с темными пятнами яиц. Питается

растительным кормом, реже водными насекомыми. Голос — глухие хлопки.

9.2.6. Род Белогрудые пастушки — *Amaurornis*

В России один очень редкий дальневосточный вид.

Белогрудый пастушок
[207] — *Amaurornis*
phoenicurus
(Таблица 21)




Птица больше скворца, легко отличимая от остальных пастушковых по белому брюху и щекам. Спинная сторона черная, хвост каштаново-красный, у основания клюва красное пятно. Остальная часть клюва и ноги желто-зеленые.

В последние годы обнаружен на юге Дальнего Востока, где, вероятно, гнездится на травяных болотах. Голос — резкое шелканье.

9.2.7. Род Султанки — *Porphyrio*

В России один редкий прикаспийский вид.

Султанка [208] —
Porphyrio porphyrio
(Таблица 21)




Размером с небольшую курицу. Сумеречная и ночная птица яркой зеленовато-голубой окраски. Клюв, бляха на лбу и ноги красные, голова сероватая.

Гнездится в дельтах рек бассейна Каспия в тростниковых крепях, зимует в местах гнездования, в суровые зимы откочевывает к югу и иногда появляется в это время в плавнях Приазовья. В кладке 4-7 кремовых с коричневыми пятнами яиц. Питается растительной пищей, реже насекомыми, мышами, икрой рыб и лягушек. Голос — своеобразный стон, тихое пощелкивание.

Занесена в Красную книгу России.

9.2.8. Род Лысухи – *Fulica*

В России один вид



Лысуха [209] — *Fulica atra*
(Таблица 21)

Матово-черная водоплавающая птица размером с небольшую утку, с белыми клювом и бляхой на лбу, серыми лапами с волнистыми кожистыми оторочками на пальцах, плотного телосложения. Молодые птицы буроватые, брюхо серое, горло белое. Плавающая, хвост держит неподвижно опущенным, кивает головой. При опасности ныряет или бежит по воде, размахивая крыльями. Взлетает с разбега.


Населяет почти всю южную половину страны. Гнездится на заросших озерах, реках и морских отмелях, в кладке 7-10 охристых с черными крапинками яиц. Зимует на морских заливах и незамерзающих озерах, где иногда собирается в многотысячные стаи. Голос — звонкое "тъек-тъек".

В южных районах — важный объект промысла.

9.3. Семейство Трехперстковые – *Turnicidae*

Мелкие наземные птицы, возможно, заслуживающие выделения в самостоятельный отряд. В России один вид, встречающийся в основном на юге Дальнего Востока.

9.3.1. Род Трехперстки – *Turnix*



Пятнистая трехперстка [210] — *Turnix tanki*
(Таблица 21)

Мелкая, размером с перепела [182], птица, ведущая скрытный образ жизни. Ноги трехпалые, на бо-

ках, плечах и спине — округлые черные пятна. Общая окраска буровато-серая с рыжеватым зобом. При опасности взлетает неохотно, бесшумно (в отличие от перепела) и садится, пролетев небольшое расстояние низко над землей.

Обитает в Южном Приморье, долине Среднего Амура и, возможно, в Забайкалье, повсюду довольно редка. Гнездится на сухих лугах с зарослями кустарников. В кладке 4 белых в бурых крапинках яйца. Самки окрашены ярче, чем самцы, которые насиживают яйца и водят птенцов (серовато-охристых с черными и бурыми полосками). Голос — тихое гудение.

9.4. Семейство Дрофиные — *Otididae*

Крупные и очень крупные птицы, массивные, с длинными сильными ногами и толстой длинной шеей. Спина, плечи и хвост сверху рыжие с мелким темным поперечным рисунком, брюхо белое, крылья с широкой белой полосой и черными концами.

Гнездятся в степях и полупустынях. Самцы весной токуют, поднимая перья, так что издали птица кажется черно-белым шаром. В кладке 2-5 оливковых с темными пятнами яиц, пуховые птенцы серые с черными полосками.


В России два рода.

9.4.1. Род Дрофы — *Otis*

Степные птицы. В России два вида.

Дрофа [211] — *Otis tarda*
(Таблица 19)


Очень крупная, крупнее домашнего гуся, птица с серыми головой и шеей и черной полосой вдоль края хвоста. У самцов рыжий зоб и белые "усы".



Гнездится на полях и в степях; в Южной Сибири и Приамурье — на лугах. Из-за браконьерства, механизации и хи-

мизации сельского хозяйства, беспокойства в период гнездования стала очень редка, сохранившись отдельными очагами в степной полосе от Дона до Амура. Зимует в Предкавказье, на озере Ханка, частично остается зимовать в Поволжье и Туве.

Занесена в Красную книгу России.



Стрепет [212] — *Otis tetrah*
(Таблица 19)

Птица размером с курицу, шея у самца весной черно-белая, у самца осенью и у самки одного цвета со спиной. У летящей птицы заметно черное пятно на сгибе крыла.

Гнездится в ковыльных степях, реже на лугах и залежах. Из-за распашки степей и браконьерства стал очень редок. Сохранились лишь отдельные места гнездования по клочкам нераспаханной степи и залежам от Дона до Урала. Зимует в Предкавказье.

Занесен в Красную книгу России.

9.4.2. Род Дрофы-красотки — *Chlamydotis*

Один редкий пустынный вид.

Джек [213] — *Chlamydotis undulata*
(Таблица 19)

Крупная светлая птица, узнается по белой шее с черной продольной полосой по бокам, в полете — по черному пятну на сгибе крыла.

Гнездится в полупустынях и пустынях. Сохранился в песках Убсунурской котловины в Туве, возможно, в Чуйской степи на Алтае, залетает в Прикаспий. Из-за массовой охоты на зарубежных зимовках и беспокойства на гнездовьях, связанного с выпасом скота, джек практически исчез в нашей стране. Занесен в Красную книгу России.

10. Отряд Ржанкообразные — *Charadriiformes*

Чайка — это как бы воплощение идеи безграничной свободы, и все ее тело, от кончика одного белоснежного крыла до другого — не что иное, как мысль о свободе.

*Ричард Бах. Чайка по имени
Джонотан Ливингстон .*

Чайки и их родственники действительно нередко совершают фантастически далекие путешествия, но все же они не так "свободны", как может показаться на первый взгляд. Их странствия проходят по более или менее определенным маршрутам, хотя отдельные особи некоторых видов могут быть встречены почти в любой точке Земли. От соленых луж в полупустыне до разводий во льдах Центральной Арктики, от горного ручья до штормового Берингова моря нет в России водоема, где не встречались бы представители этого отряда — кулики, чайки, крачки, поморники и чистики. Особенно разнообразны они на берегах морей и в тундрах, но живут также и в лесах, и среди полей, и в степях.


Все они питаются в основном мелким животным кормом, гнездятся на земле или на скалах, лишь некоторые кулики-улиты и один вид пыжиков — на деревьях. Птенцы вылупляются зрячими, покрытыми пухом.

В России 11 семейств.

10.1. Семейство Авдотковые — *Burhinidae*

Степные кулики размером с крупного голубя. Ведут ночной образ жизни. В России один редкий вид.

10.1.1. Род Авдотки — *Burhinus*



Авдотка [214] —
Burhinus oedicnemus
(Таблица 22)

Плотного сложения кулик с довольно длинными трехпалыми желтыми ногами, желтым с черным кончиком клювом, острыми узкими крыльями, коротким клиновидным хвостом и очень большими желтыми глазами. Окраска песочно-серая с темными продольными пестринами, брюхо и горло светлые, на крыле две белых полосы (одна из них видна только в полете). Молодые птицы окрашены темнее.

Перелетный обитатель степей и полупустынь. Обитает в Нижнем Поволжье, Предкавказье и, возможно, на Дону. Гнездо — ямка в почве, в кладке 2-3 желтоватых с темными крапинками яйца. Питается насекомыми, иногда ящерицами и грызунами. Ночью часто бывает слышен крик летящей птицы — звонкое протяжное "тир-ли".

Занесена в Красную книгу России.

10.2. Семейство Ржанковые — *Charadriidae*

Короткоклювые, сравнительно коротконогие кулики, обитатели тундр, побережий, полей и степей. Сверху окраска маскирующая, бурая, серая или темная, голова и грудь с контрастным черно-белым рисунком. Клюв слегка утолщен на конце.


Гнездятся на земле, гнездо — небольшая ямка, часто совсем без выстилки. В кладке 3-4 песочных или зеленоватых с густым темным крапом яйца. Питаются мелкими беспозвоночными, иногда ягодами.

В России три рода.

10.2.1. Род Чибисы – *Vanellus*

Кулики размером с голубя. Спинная сторона окрашена однотонно. Гнездятся на полях, лугах, травянистых болотах и в степях, часто небольшими колониями. При приближении человека к гнезду пикируют на него с громким криком. В России пять или шесть видов.

Чибис [215] — *Vanellus vanellus*
(Таблица 22)



Спина темно-зеленоватая с металлическим блеском, голова и шея черные, на затылке длинный острый хол, брюхо белое, подхвостье рыжее, хвост белый с широкой черной полосой, крылья широкие, закругленные, снизу белые с черными концами. Полет характерный, с крутыми поворотами вверх-вниз.


Распространен от западных границ России до Дальнего Востока по лесной и степной зонам. По поймам равнинных рек далеко проникает на север. Гнездится на полях, сырых лугах и травянистых болотах, иногда небольшими колониями. В отличие от большинства полевых птиц, чибис почти не маскирует гнездо. Зато он пытается отогнать любого человека или зверя, пикируя на него с громким криком. Если над весенним лугом летит ворона или ястреб, чибисы по очереди гоняют врага по мере того, как он пролетает над их гнездовыми участками. Увы, сельхозтехнику чибису отогнать не удастся, и много гнезд гибнет во время сельскохозяйственных работ. Несмотря на это, чибис во многих местах остается самой обычной птицей полей и лугов. Голос — громкое гнусавое "чи-вы, чи-вы".

Серый чибис [216] — *Vanellus cinereus*
(Таблица 26)

Спинная сторона коричнево-бурая, брюшная белая. Голова и шея серые, на груди темная полоса, крылья черно-белые. На сгибе крыла короткий шип. Ноги желтые, хвост бе-

лый с черным пятном на конце, клюв желтый с черным кончиком.

Гнездится в Восточной Азии, в период весеннего пролета залетает в Приморье и Забайкалье, и, возможно, гнездится там. Голос — громкий двусложный скрипучий писк.



**Кречетка [217] —
Vanellus gregarius
(Таблица 22)**

Буровато-серая с черными брюхом, верхом головы, полосой через глаз, концами крыльев и хвоста, клювом и ногами. Лоб, бровь и основание хвоста белые.

Гнездится в степях от Волги до верхней Оби. Голос — скрипучее "кры, кры". В последние годы численность заметно снизилась, особенно в Сибири. Занесена в Красную книгу России.

В Поволжье и Предкавказье залетает среднеазиатская **белохвостая пигалица — *Vanellus leucurus* [218]**, (Таблица 22), похожая на кречетку, но с однотонной желтоватой головой, серой грудью, желтым брюхом и ногами, белым хвостом без черной полосы, голым красным кольцом вокруг глаз. Голос — громкое "четыре, четыре".

В те же районы залетает переднеазиатский **украшенный чибис — *Vanellus indicus* [219]**, (Таблица 22), с черной головой и ярко-красной кожистой лопастью над клювом, горло и грудь также черные; брюхо и бока шеи белые; спина бурая, блестящая; белый с черным краем хвост; желтые ноги и красный с черным кончиком клюв.

На юге России возможны встречи **шпорцевого чибиса — *Vanellus spinosus*** (таблица 26), гнездящегося на юге Европы и Азии. Он бурый с черными шапочкой, горлом, грудью; белыми щеками, шеей, брюшком и надхвостьем. Хвост белый с черной полосой по краю, на сгибе крыла острый шип.


10.2.2. Род Ржанки — *Pluvialis*

Кулики плотного сложения, размером меньше голубя. Спинная сторона золотистая, серая или белая с густыми чер-

ными пестринами, брюхо черное (самки с белыми пестринами), по бокам головы, шеи и груди белая полоса. Молодые птицы окрашены менее характерно, с пестринами на боках и светлым брюхом. При приближении человека к гнезду летают вокруг с громкими криками.

Обычны в тундрах и лесотундрах, изредка гнездятся на верховых болотах, на пролете встречаются по открытым берегам морей, крупных рек и озер, на лугах и пашнях. Четыре вида.


Золотистая ржанка
[220] — *Pluvialis apricaria*
(Таблица 23)



Спинная сторона золотистая с густым мелким черным рисунком, белая полоса на боках доходит до хвоста, подмышечные перья белые. Осенью черный цвет заменяется дымчатым, бока и брюшко становятся белыми. Заднего пальца нет. Хвост у сидящей птицы выступает за концы сложенных крыльев.

Обычна в тундрах и лесотундрах от западных границ России до устья Хатанги на восток. Голос — громкий заунывный односложный свист "тююю".

Бурокрылая ржанка
[221] — *Pluvialis fulva*
(Таблица 23)




Очень похожа на золотистую ржанку, но белая полоса у сидящей птицы на боках не так заметна, подмышечные перья серые, верх темнее. Осенью отличается только серыми боками.

Гнездится в сухих каменистых и холмистых тундрах от Ямала до Чукотки. Голос — резкий двусложный свист "тюр-ли". Во время пролета часть бурокрылых ржанок совершает беспосадочный перелет над Тихим океаном от Алеутских до Гавайских островов (3300 км).

Американская ржанка [222] — *Pluvialis dominica*

Очень похожа на бурокрылую ржанку, но белая полоса по бокам груди очень широкая, а под крыльями отсутствует, хвост у сидящей птицы короче крыльев.

Залетает на Камчатку и Чукотку, где, возможно, гнездится. Голос — чистый короткий свист "удль-уу".



Тулес [223] — *Pluvialis squatarola*
(Таблица 23)

Верх серый или буроватый с черными и белыми пестринами, подмышечные перья черные, белая поло-

са на боках прерывается. Задний палец есть. Осенью отличается от ржанок белым надхвостьем.

Гнездится в сухих лишайниковых тундрах и на щебнистых возвышенностях от полуострова Канин до Чукотки. Голос — заунывное протяжное "туу-ли, туу-ли".


10.2.3. Род Зуйки — *Charadrius*

Мелкие невысокие на ногах кулики, с короткой шеей и ногами. Клюв прямой, недлинный. Спинная сторона сероватая или глинисто-бурая, брюшная белая или рыжеватая с серым, на голове и груди черный рисунок. Крылья острые, полет быстрый, летят обычно на небольшой высоте. Быстро бегают, пригнувшись к земле.

Гнездятся на песчаных и галечных пляжах рек, морских побережий, в сухих щебнистых степях и тундрах, придерживаясь мест, где растительность разрежена или отсутствует, в степях — часто на солончаках. Гнездо — неглубокая ямка, иногда с выстилкой из мелких камешков. Яйца со светлым желтоватым фоном и мелкими крапинами. В весеннее время характерны токовые полеты, когда пара птиц с характерными криками летает кругами над местом, выбранным для устройства гнезда.

В России десять видов, из которых в средней полосе Европейской части гнездится только малый зук [227].


Галстучник [224] —
Charadrius hiaticula
 (Таблица 23)



Меньше скворца, спинная сторона буровато-серая, брюшная белая, через глаз, над клювом и поперек зоба черные (осенью и у молодых птиц бурые) полосы, темя темное, лоб, полосы за глазом и на крыле (видна только в полете) белые. Клюв летом желтый с черным кончиком, осенью черный.

Обычен на песчаных и галечных берегах северных морей и водоемов тундровой и лесотундровой зон, а также на Балтике. На пролете встречается на пляжах по всей территории России к югу от гнездового ареала. Голос — мелодичное "кюии?" с восходящей интонацией.

Американский галстучник [225] —
Charadrius semipalmatus
 (Таблица 26)




Очень похож на галстучника, но светлее, белое пятно за глазом почти не вытянуто в полосу или отсутствует, черная поперечная полоса на груди чуть сужена, основания пальцев соединены узкой перепонкой.

Гнездится на берегах острова Врангеля, залетает на Чукотку. Голос — протяжное "кюии".

На Чукотку залетает североамериканский **крикливый зуек** — ***Charadrius vociferus* [226]**, похожий на галстучника [224] но намного крупнее (чуть больше скворца), с длинным хвостом и клювом, на груди не одна, а две черных поперечных полосы, надхвостье оранжевое, голос — громкое "кильди, кильди".


Малый зуек [227] —
Charadrius dubius
 (Таблица 23)



Похож на галстучника [224], но мельче (чуть крупнее воробья), белые полосы над глазами соединяют-

ся поперечной полосой на передней части темени, клюв черный. Крыло одноцветное, без белой полосы. Молодые птши без белой брови.


Гнездится на речных и морских пляжах повсюду к югу от северной тайги, на восток до Сахалина. Голос — громкое "пи-о" с нисходящей интонацией.



Уссурийский зук [228]
— *Charadrius placidus*

Очень похож на малого зуйка [227], но размером со скворца, белый лоб не отделен от клюва черной полосой, в полете на крыле вид-


на серая полоса. Гнездится на галечных пляжах и косах по берегам рек Южного Приморья и Приамурья. Голос — резкое короткое "пип!" Крайне редок, занесен в Красную книгу России.



Морской зук [229] —
Charadrius alexandrinus
(Таблица 23)

Чуть крупнее воробья, сложением похож на галстучника [224], но окраска менее контрастная, белые лоб и бровь соединены, верх головы рыжий, полоска на груди разорвана на два темных пятна, в полете на крыле белая полоса. Хвост, а у самки и темя, без черного пятна. Ноги черные.

Гнездится на пляжах и илистых отмелях по берегам морей и соленых озер в Предкавказье, Нижнем Поволжье, Абаканской степи, Туве, на юге Забайкалья, Приморья, Сахалина и Курильских островах. Голос — заунывный посвист "пюиит".




Монгольский зук [230] —
Charadrius mongolus
(Таблица 23)

Крупнее и светлее галстучника [224], голова, шея и грудь рыжие, горло и брю-

хо белые, лоб белый или черный с белым пятном, от клюва через глаз и иногда на горле черная полоса, ноги черные. Клюв короткий (до 2 см). Крыло в полете с белой полосой.

Гнездится в щебнистых высокогорных тундрах, на гольцах, реже на галечных пляжах и в песчаных дюнах на Чукотке, Камчатке, Командорах, в районе Магадана и на некоторых хребтах Восточной Сибири. Голос — громкая трель.


Большеклювый зуек
[231] — *Charadrius*
leschenaultii
 (Таблица 23)



Размером со скворца, похож на монгольского зуйка, но клюв длиннее (свыше 2 см) и массивней, темный рисунок на голове бледнее, рыжий цвет только на зобу и боках груди, верх головы серый, ноги желтые.


Гнездится в щебнистых и глинистых полупустынях Прикаспия, Чуйской степи на Алтае и Убсу-Нурской котловины в Туве. Голос — тихая трель. Редок, занесен в Красную книгу России.

Каспийский зуек
[232] — *Charadrius*
asiaticus
 (Таблица 23)



Размером со скворца, со сравнительно длинными темно-желтыми ногами. Верх головы и тела серовато-бурый, лоб, бровь, бока головы, шея и брюшко белые. Грудь рыжая, снизу окаймлена черной полоской. Крыло в полете с узкой серой полосой, снизу бурое, подмышечные перья белые. Клюв длинный (свыше 2 см) и тонкий.


Редкий вид полупустынь и солонцов Восточного Предкавказья и Нижнего Поволжья. Голос — тихая журчащая трель.



**Восточный зуйк [233] —
*Charadrius veredus***

Очень похож на каспийского зуйка, но подмышечные перья бурые. У старых самцов голова белая.

Редкий вид сухих степей и солонцов Забайкалья и Тувы.



**Хрустан [234] —
Charadrius morinellus
(Таблица 23)**

Размером крупнее скворца, с коротким клювом, белыми бровью и горлом, сизо-серыми спиной и грудью,

коричнево-рыжим с черным брюшком, ограниченным спереди белой полосой, черными верхом головы. Крыло одноцветное. Осенью и зимой, а также у молодых птиц голова и грудь рыжеватые, брюшко белое.

Гнездится в каменистых тундрах и на гольцах в холмистых и горных районах Севера, на Урале, в Восточной и Южной Сибири, известен случай гнездования на Кавказе. На пролете встречается на залитых водой пашнях и солончаках по всей стране. Насиживает кладку и водит птенцов только самец. Очень доверчив. Голос — звонкое быстрое "пить-пить-пить".

10.3. Семейство Шилоклювковые — *Recurvirostridae*


Крупные кулики контрастной бело-черной окраски с очень длинными и тонкими ногами и клювом. Обитают на водоемах степной и полупустынной зон, иногда образуют небольшие колонии. Хорошо плавают.

Гнездо — небольшая ямка, в кладке 4 светлых с бурыми пятнами яйца. Питаются мелкими беспозвоночными на илистых мелководьях.

В России два редких вида.

10.3.1. Род Шилоклювки — *Recurvirostra*

Шилоклювка [235] —
Recurvirostra avosetta
 (Таблица 22)




Клюв сильно загнут вверх, крыло белое с черными полосами, ноги синеватые.

Гнездится в степной зоне от Дона до Забайкалья, в Прикаспии на соленых озерах и морских косах, залетает в Среднюю полосу и Приморье. Голос — звонкое мелодичное "кли-и-кли".

Занесена в Красную книгу России.

10.3.2. Род Ходулочники — *Himantopus*

Ходулочник [236] —
Himantopus himantopus
 (Таблица 22)



Клюв прямой, крыло черное, ноги красные, непропорционально длинные.

Гнездится в Предкавказье, на Дону, в Нижнем Поволжье, Забайкалье и Приморье на озерах и травянистых болотах. Голос — резкое односложное "кик!"

10.4. Семейство Кулики-сороки —
Haematopodidae


Крупные черно-белые или черные кулики с длинным, мощным прямым ярко-красным клювом и красными ногами. Полет уверенный, прямолинейный, стайка часто выстраивается клином. При приближении человека к гнезду самка вылетает навстречу и летает вокруг с громким криком.

Гнездятся на берегах морей и крупных рек. В кладке 3-4 охристых с темно-бурыми пятнами яйца. Выстилка гнезда

из мелких камешков, щепок или мелких раковин. Питаются моллюсками, реже другими мелкими беспозвоночными, которых достают из-под камней.

В России один или два редких вида.

10.4.1. Род Кулики-сороки — *Haematopus*



**Кулик-сорока [237] —
Haematopus ostralegus
(Таблица 22)**

Низ тела, надхвостье и полоса на крыле белые.

Гнездится местами в Европейской части России, За-

падной Сибири, Прикаспии, на Камчатке и в бассейне Амура. Голос — звонкое быстрое "пи-пит, пи-пит". Занесен в Красную книгу России.

На Чукотку, возможно, залетает североамериканский **черный кулик-сорока — *Haematopus bachmani***, полностью черной окраски, голос — звонкое "пиии!"

10.5. Семейство Плавунчиковые — *Phalaropidae*


Мелкие кулички (мельче скворца) с короткими ногами и не очень длинным клювом. На пальцах по бокам кожистые оторочки. Весной и летом окраска довольно яркая, осенью и зимой спинная сторона серая, брюхо белое, от светлых песочников (кроме песчанки [254]) отличаются заметной в полете широкой белой полосой на крыле. Чаше всего попадают на глаза, когда плавают, часто кивая головой.

Гнездятся по топким берегам тундровых озер и заболоченным озерным котловинам, на пролете и кочевках встречаются по всей стране, а также огромными стаями в открытом море, где питаются планктоном. Гнездо обычно в пучке осоки, в кладке 4 оливковых с бурыми пятнами яйца. Насиживает яйца и водит птенцов самец. Самка окрашена заметно ярче. Голос — быстрое тиканье и журчащая трель.

Один род с тремя видами.

10.5.1. Род Плавунчики — *Phalaropus*


Круглоносый плавунчик
[238] — *Phalaropus*
lobatus
(Таблица 23)



Верх серый с рыжими пестринами, горло и брюшко белые, шея спереди ярко-рыжая, грудь серая. Осенью верх серый, через глаз черная полоса. Клюв тонкий, черный, шиловидный, короче 3 см.

Обычен в тундрах и лесотундрах, гнездится от берегов Белого моря до Сахалина на востоке.

Плосконосый плавунчик
[239] — *Phalaropus*
fulicarius
(Таблица 23)



Основной тон окраски рыжевато-каштановый, щеки белые, верх головы черный. У молодых птиц и взрослых в осеннее время спина светло-серая, через глаз проходит черная полоса. Клюв слегка уплощен с боков (издали кажется толстым), желтый у основания, длиннее 3 см.

Обитает в арктических тундрах восточнее Енисея и на юге Новой Земли.

В Якутию и на Чукотку, возможно, залетает североамериканский большой плавунчик — *Phalaropus tricolor* (Таблица 26), самец буровато-серый с белым брюхом и рыжеватым ошейником, у самки через глаз черная полоса, продолжающаяся по бокам шеи, клюв тонкий, шиловидный, длиннее 3 см.

10.6. Семейство Бекасовые — *Scolopacidae*

Разнообразные по внешнему виду кулики серой или охристой, реже рыжеватой, золотистой, черной или буроватой

окраски с мелким рисунком из темных пестрин и иногда светлых полос.

Гнездятся в окрестностях водоемов, некоторые виды — в лесах. Гнездо — ямка на земле с выстилкой из листьев или травы (некоторые улиты гнездятся на деревьях), в кладке 2-4 песочных, оливковых или розоватых с темными пятнами яйца. Весной самцы многих видов производят так называемые токовые полеты, летая по определенной траектории с характерным звуком (пример — тяга вальдшнепов и "блечение" бекасов). Некоторые виды собираются на наземные групповые тока.

Питаются мелкими беспозвоночными. Часто можно увидеть, как они бродят по мелководью, опустив клюв в воду. Поскольку разные виды отличаются по длине клюва и ног, они кормятся на различной глубине и не конкурируют между собой из-за пищи.

Многие бекасовые в природе настолько трудноразличимы, что их определение — подлинное искусство. Почти все — перелетные птицы. Больше всего бекасовых обитает на Севере, и в средних широтах их можно увидеть в основном на пролете. Правда, осенний пролет у них часто начинается в разгар лета, особенно у молодых, не гнездящихся в этот год птиц.


Наряду с обычными, широко распространенными видами, семейство включает некоторых из самых редких и малоизученных наших птиц. Российские орнитологи пожертвовали немало крови комарам, стремясь узнать побольше о жизни этих интересных обитателей северных болот, суровых арктических гор и бескрайних тундр.

В России 14 родов.

*10.6.1. Род Камнешарки — *Arenaria**

Среднего размера (крупнее скворца) яркоокрашенные кулики, населяющие каменистые берега морей и сухие прибрежные тундры. Клюв острый, чуть заметно загнутый кверху. Кормятся, переворачивая камни и собирая из-под них мелких беспозвоночных животных. Иногда несколько птиц вместе переворачивают тяжелый камень.

В России один или два вида.



Камнешарка [240] —
Arenaria interpres
(Таблица 23)

Спинная сторона рыжая с белыми и черными полосками, брюхо белое, голова и грудь с ярким черно-белым

рисунком. У молодых птиц спина, голова и грудь бурые. Ноги оранжевые. Осенью взрослая птица серая сверху, белая снизу, на груди широкая черная поперечная полоса. В полете характерно белое надхвостье с черным рисунком в виде римской цифры "V" и широкая белая полоса на крыле.

Обитает по всему Арктическому побережью, на пролете изредка встречается на внутренних водоемах, часто — на морских берегах юга Дальнего Востока. Голос — трескучая трель.

На Чукотку и остров Врангеля, возможно, залетает североамериканская черная камнешарка — *Arenaria melanocephala* (таблица 23), темно-бурая с черными в белых точках головой и грудью, белой бровью и полосой на крыле. Молодые птицы отличаются зеленовато-желтыми ногами.

10.6.2. Род Песочники — *Calidris*

Средние, мелкие и очень мелкие кулички со сравнительно короткими ногами и коротким или чуть удлинненным тонким клювом, прямым или немного изогнутым книзу. В полете у всех песочников, кроме дутыша [251], видна узкая (только у очень редкой во внутренних районах страны песчанки [254] — широкая) белая полоса на крыле.

Гнездятся в тундрах, лесотундрах и арктических пустынях, на морских побережьях, реже на таяжных и высокогорных болотах. Самки многих видов часто отводят от гнезда, иногда подражая при этом внешнему виду и манере движения лемминга, чтобы надежнее отвлечь хищника. Молодые птицы летом кочуют по всей территории страны. На пролете обычны на больших реках, озерах и морских берегах, особенно на Дальнем Востоке, где иногда можно видеть огромные стаи. Песочники, пожалуй, самые характерные птицы тундры. Они настолько приспособлены к суровому климату, что продолжают насиживать кладку, даже если их засыпает снегом.

Кроме перечисленных ниже 20 видов песочников, известны несколько загадочных форм, описанных по одному-двум


экземплярам с мест пролета и зимовки. По последним данным, это всего лишь гибриды других видов.

Чернозобик [241] —
Calidris alpina
 (Таблица 24)

Чуть мельче скворца, с довольно длинным, слегка изогнутым книзу клювом, спинная сторона бурая с темными пестринами, брюхо светло-серое с большим черным пятном. Осенью сверху серо-дымчатый, пятно на брюшке серое. Надхвостье темное.

Распространен по всей тундровой зоне, на Северных Курилах, северном Сахалине, на побережьях Балтики и Охотского моря. Голос — звонкая трель "трр" или "три-ри-ри".


Сахалинский и прибалтийский подвиды занесены в Красную книгу России.



Краснозобик [242] —
Calidris ferruginea
 (Таблица 24)


Размером со скворца, каштаново-рыжий летом и серый с белым брюхом осенью. Надхвостье полосатое летом и белое осенью, клюв сравнительно длинный, слегка изогнут вниз, шея длиннее, чем у других песочников.

Обычен в сухих арктических тундрах от Оби до запада Чукотки. Голос — звонкое "пит-пит" или "ррю".



Кулик-воробей [243] —
Calidris minuta
 (Таблица 24)


Очень мелкий, заметно мельче скворца, с коротким тонким прямым клювом. Спинная сторона ле-



том рыжеватая, бока шеи и груди буроватые, брюхо белое, на груди мелкие пестрины. На спине тонкий белый рисунок в виде римской цифры "V". Ноги черные, крайние рулевые перья буроватые. Осенью окрашен несколько светлее, спина без рыжего оттенка, бока шеи серые.

Гнездится в тундрах, в основном сухих. Голос — журчащая трель.

Длиннопалый песочник
[244] — *Calidris*
subminuta
(Таблица 24)




Очень похож на кулика-воробья, но ноги буроватые или желтоватые с длинными пальцами (средний палец длиннее 2 см), бока шеи в продольных рядах темных точек, темя с белыми продольными полосками, осенью в окраске сохраняется слабый буроватый оттенок.

Редкий вид травяных болот юга Сибири, севера Дальнего Востока, Сахалина, низовий Амура. Голос — короткая журчащая трель.

На Чукотку залетает американский песочник-крошка — *Calidris minutilla* [245], (Таблица 26). От других очень мелких песочников отличается бурыми (осенью серыми) шей и грудью, клюв тонкий, прямой, с чуть загнутым книзу кончиком, ноги желтые. Голос — очень тонкое восходящее стрекотание "бриип?"


Белохвостый песочник
[246] — *Calidris*
temminckii
(Таблица 24)



Очень похож на кулика-воробья [243], но спинная сторона летом светло-бурая без рыжего оттенка и в неправильных темных пятнах, а осенью совсем однотонная, светло-серая без пестрин. Ноги серые или зеленоватые, крайние рулевые перья почти белые.

Распространен по всей тундровой зоне, в лесотундрах Корякского округа и на побережье Карелии. Гнездится по


оврагам, промоинам, мерзлотным ямам и другим местам с нарушенным растительным покровом. Голос — длинная серебристая трель, похожая на звон колокольчика.



Перепончатопалый песочник [247] — *Calidris mauri*
(Таблица 24)

Очень похож на кулика-воробья [243], но клюв длиннее и на конце чуть загнут вниз, летом на темени рыжая шапочка, а бока груди белые с черными пестринами. Ноги черные, основания пальцев соединены узкой перепонкой. Осенью серый с рыжей полоской на плече.


Редкий вид побережья Восточной Чукотки. Голос напоминает трель милицейского свистка.



Малый песочник [248] — *Calidris pusilla*
(Таблица 26)

Очень похож на кулика-воробья [243], но пальцы с перепонками, летом грудь без пестрин. От перепончатопалого песочника отличается прямым клювом, спиной без рыжего оттенка, чисто-белыми горлом и грудью. Ноги черные.

В последние годы найден на гнездовье на Чукотском полуострове. Голос — низкая скрипучая трель "крип".




Песочник-красношейка [249] — *Calidris ruficollis*
(Таблица 24)

Похож на кулика-воробья [243], но летом горло и зоб ярко-рыжие. В осеннем

наряде спина дымчатая с пестринами, горло и зоб с едва заметной рыжиной.

Гнездится в сухих горных и холмистых тундрах от Таймыра до Чукотки. Голос — двусложное шелканье.

Кулик-лопатень [250] —
Calidris pugnax
 (Таблица 24)




Похож на песочника-красношейку, но конец клюва уплощен и расширен лопаточкой (при взгляде сбоку этого не видно), на боках под крыльями цепочка темных пятен, светлой брови летом нет. Часто кормится на мелководье, опустив клюв в воду.

Гнездится в приморских тундрах на Чукотском полуострове, побережье Анадырского залива и Корякского округа. Насиживает кладку и водит птенцов обычно самец. Молчаливые птицы, лишь во время токового полета самец издает трели и тихое жужжание, похожее на стрекотание цикады.


Встречается на гнездовье только в нашей стране. Занесен в Красную книгу России.

Дутыш [251] — *Calidris*
melanotos
 (Таблица 24)



Размером со скворца, клюв прямой, спинная сторона буровато-серая, брюхо белое, бровь светлая, грудь бурая с темными продольными полосками, резко отграниченная от брюха, надхвостье черное. Осенью окраска почти не меняется. Вспугнутый, летит зигзагами, как бекас.

Гнездится в сырых равнинных кочкарниковых тундрах Азиатской части страны. Голос самца — глухое гудение "бу-бу-бу", при котором птица сильно раздувает шею (точнее, подкожные воздушные мешки-резонаторы на шее), чаще всего слышен в полете.




Острохвостый песочник
[252] — *Calidris*
acuminata
(Таблица 24)

Похож на дутыша, но перья хвоста заострены, так что хвост имеет клиновид-

ную форму, бока груди с очень мелкими, почти незаметными пестринами, граница буроватого цвета на груди нерезкая, спинная сторона с каштановым или золотистым оттенком, на голове золотистая шапочка.

Гнездится в низменных сырых тундрах от низовий Хатанги до Чаунской губы на Чукотке. Голос самца — трескучая трель, слышен в полете.




Бэрдов песочник
[253] — *Calidris bairdii*
(Таблица 24)

Похож на дутыша [251], но надхвостье бурое со светлыми пестринами, ноги сравнительно короткие (цевка

короче 25 мм), у сидящей птицы сложенные крылья заходят за кончик хвоста.

Гнездится на побережье Чукотского полуострова и на островах Врангеля и Ратманова. Голос — отрывистый писк. Редок, занесен в Красную книгу России.




Песчанка [254] —
Calidris alba
(Таблица 24)

Размером со скворца, спина, голова и грудь светло-рыжеватые с частыми черными пятнами, брюхо

белое. Осенью почти белая с сероватым верхом и темным пятном на плече. Светлой брови летом нет, на крыле широкая белая полоса. Ноги черные, задний палец отсутствует.

Гнездится в сухих арктических тундрах северного Таймыра, островов Центральной Арктики и, возможно, дельты Лены. Голос — короткий двусложный писк и хриплые трели.


Морской песочник
[255] — *Calidris*
maritima
(Таблица 24)



Размером со скворца, ноги короткие, весной верх и грудь темно-серые, как у чернозобика [241], осенью и зимой почти черные, брюшко белое с пестринами, основание клюва и ноги желтые. Обращают на себя внимание крупные выпуклые глаза. Светлая бровь малозаметна.

Гнездится в сухих холмистых прибрежных тундрах Кольского полуострова, Таймыра и островов Баренцева и Карского морей, часть птиц зимует на свободных ото льда участках Арктического побережья. На пролете встречается на морских берегах, где кормится у самого уреза воды, перебегая вслед за уходящей или набегающей волной. Кладку насиживают оба родителя, но водит птенцов только самец. Голос — прерывистый писк.


Берингийский песочник
[256] — *Calidris*
ptiloscnemis
(Таблица 26)



Очень похож на морского песочника, но летом голова и шея светлые, на белой груди черное пятно (в отличие от чернозобика [241], оно не доходит до ног); зимой темное поле на груди не сплошное, на спине золотистые пестрины; ноги темно-зеленые.

Гнездится в прибрежных тундрах Чукотского полуострова, на крайнем юге Камчатки и Командорах. Часть птиц остается зимовать. Голос — дрожащая трель. Очень доверчив.


Подвид, обитающий на юге Камчатки, занесен в Красную книгу России.



Исландский песочник
[257] — *Calidris canutus*
(Таблица 24)

Крупнее скворца, сверху буроватый, снизу ржаво-рыжий, со светлым закругленным хвостом и зеленоватыми ногами. Осенью почти белый с дымчато-серым верхом и грудью. Клюв короткий, прямой.

Гнездится в холмистых лишайниковых тундрах Таймыра, островов Новосибирских и Врангеля, в горах Чукотки. Голос самца — протяжное мелодичное "куиин", всегда в полете.



Большой песочник
[258] — *Calidris tenuirostris*
(Таблица 24)

Размером значительно крупнее скворца, с длинным прямым клювом и короткими ногами. Верх темно-бурый с рыжими пестринами, низ, надхвостье и бровь белые, грудь летом с густыми темными пестринами, ноги зеленовато-бурые. Осенью окраска чуть светлее.


Гнездится в горных тундрах Северо-Восточной Сибири, Чукотки и Корякского нагорья. Птенцов водит самец. Токовый полет на большой высоте с глухим криком "крыы-крыы-крыы".

На Землю Франца-Иосифа и Чукотку залетал североамериканский **бонапартов песочник** — *Calidris fuscicollis* [259], (Таблица 26). Размером со скворца, спинная сторона и надхвостье черные с ржавыми пестринами, брюшко и грудь белые с темными пестринами на боках и горле. В осеннем наряде светлый с белым надхвостьем и бровью.

10.6.3. Род Желтозобики — *Tryngites*

Один вид, обитающий на севере Дальнего Востока.

Желтозобик [260] —
Tryngites subruficollis
 (Таблица 24)




Мелкий кулик, похожий на песочников, но более длинноногий, со сравнительно коротким прямым клювом. Верх головы темный, спина серовато-рыжеватая с отчетливым чешуйчатым рисунком, грудь и низ тела желтато-рыжие, подхвостье белое. Клюв черный, лапы оранжево-желтые (у молодых зеленоватые). На концах крыльев снизу мраморный рисунок, заметный, когда птица поднимает крылья. В полете крылья без белой полосы.

Гнездится в сухих мохово-лишайниковых тундрах на о. Врангеля и северном побережье Чукотки. Возможны залеты вглубь страны. Весной небольшими группами по 3-5 птиц собирается на тока. Голос в полете — повторяющееся “прииит...прииит...”

10.6.4. Род Грязовики — *Limicola*

Один редкий вид.

Грязовик [261] —
Limicola falcinellus
 (Таблица 24)




Очень мелкий, заметно мельче скворца, куличок с короткими черными ногами и длинным, уплощенным (сбоку кажется толстым), на конце слегка загнутым книзу клювом. Спинная сторона серо-бурая, пестрая, грудь охристо-бурая с пестринами, брюшко и бровь белые. Крыло серое без полос. Хвост в мелких поперечных полосках и с черной продольной полосой. Осенью спинная сторона окрашена светлее.

Гнездится от Карелии до Якутии по топким травянистым болотам, в тундре, лесотундре и северной тайге, на пролете встречается по топким побережьям и илистым отмелям. Голос — журчащая трель в полете.

10.6.5. Род Турухтаны — *Philomachus*

Один обычный вид.



Турухтан [262] —
Philomachus pugnax
(Таблица 24)

Сравнительно длинноногий короткоклювый кулик размером немного меньше голубя. Верх пестрый, чер-

новато-бурый с хорошо заметным рыжим оттенком, грудь желто-сероватая, весной и летом с мелкими поперечными пестринами, брюшко белое. Перья спины и крыльев со светлыми каемками. Ноги весной желтые или оранжевые, осенью бурые. У самцов весной на шее "воротник" из удлиненных перьев, который может быть любой окраски от белой до ярко-рыжей и черной и придает птице своеобразный силуэт.

Распространен повсюду от северной тайги до лесотундры и тундры, в лесостепях Западной Сибири, в Прибайкалье и в пойме реки Урал, местами в тайге Европейской части России и Восточной Сибири. Обитатель болот, лугов, морских побережий. Весной группы до сотни птиц собираются на токах, где самцы устраивают "турниры", бегая друг за другом и имитируя драку. Токование начинается еще на пролете. Голос — тихое двусложное побрякивание.

На Чукотку залетает гнездящийся в Северной Америке длинноногий песочник — *Micropalama himantopus* [263]. Размером со скворца, с очень длинными темно-зелеными (желтыми зимой) ногами, белой бровью, рыжим пятном за глазом и длинным черным клювом, слегка загнутым книзу. От улитов и других длинноногих куликов отличается окраской: летом светло-бурый с поперечнополосатым низом, осенью белый с сероватым верхом. Надхвостье белое. Голос напоминает хрюканье. Пепельные улиты [275, 276] летом тоже поперечнополосатые снизу, но у них темно-серый верх и более короткие ноги.


10.6.6. Род Улиты — *Tringa*

Среднего размера стройные кулики с длинными ногами и клювом. Шея сравнительно длинная и тонкая. Окраска

тускло-серая или черноватая с мелкими пестринами. Хвост белый с темными поперечными полосками, у перевозчиков — темный. Часто садятся на деревья. При ходьбе большинство видов "кланяется" — покачивает задней частью тела.

Гнездятся по берегам рек и озер, на болотах почти по всей стране, некоторые виды — на деревьях. В кладке 4 яйца. В России 13-14 видов.


Черныш [264] — *Tringa ochropus*
(Таблица 25)



Чуть крупнее скворца, с прямым клювом, спинная сторона черно-бурая, грудь и шея серые с пестринами, брюшко и надхвостье белые, крыло снизу темное. Бровь белая, через глаз проходит темная полоса. Ноги темные зеленоватые. Зимой окрашен светлее.


Обычен по берегам лесных речек, ручьев и озер, на лесных болотах почти по всей территории лесной и лесостепной зоны, часто в старых гнездах дроздов, ворон, соек, реже в собственных гнездах на деревьях. Голос — звонкая трехсложная металлическая трель.

Фи́фи [265] — *Tringa glareola*
(Таблица 25)



Похож на черныша, но несколько мельче (со скворца), светлее, спина серая, ноги светлые, желтоватые, в полете заметно выдаются за край хвоста, бока головы серые, крыло снизу светлое с темными пестринами, грудь беловатая.


Гнездится на земле, реже в старых гнездах дроздов по болотам, ручьям, озерам и сырым лугам почти повсюду от южных тундр до лесостепей. Голос — двусложный посвист "фи-фи".



Поручейник [266] —
Tringa stagnatilis
(Таблица 25)

Похож на фифи, но более строен и длинноног, спина темная только между лопаток, ниже белая, зоб белый в густых темных пестринах, клюв очень тонкий, ноги темные, светлой брови почти нет.


Обычен на топких берегах рек и озер, в степях и лесостепях на восток до Забайкалья, гнездится в Приморье. Гнезда располагает в куртинах осоки, на кочках или остатках стогов. Голос — громкое "ти-ти-ти".



Травник [267] — *Tringa totanus*
(Таблица 25)

Очень похож на поручейника, но крупнее него (немного меньше голубя), ноги и основание менее тонкого клюва красные, на крыле хорошо заметная белая полоса.

Обычен на травянистых болотах и сырых лугах в средней и южной полосе России, гнездится также в Карелии, Забайкалье, Приморье, на Кольском полуострове и Сахалине. Гнездо на кочке или дерновине. Голос — быстрый трехсложный посвист.




Щеголь [268] — *Tringa erythropus*
(Таблица 25)

Крупнее скворца, летом черный с белыми надхвостьем, нижней стороной крыла и крапинами на спине. Осенью черный цвет заменен однотонно-серым без пестрин. Клюв и ноги красные или черные, крыло без белой полосы.

Гнездится на болотах в тундре и лесотундре. Гнездо на кочке, под кустом или упавшим деревом. Голос — резкий двусложный свист "тю-ит".

Большой улит [269] —
Tringa nebularia
(Таблица 25)


Размером почти с голубя, темный клюв слегка изогнут вверх. Окраска сверху буро-серая, низ и надхвостье белые, на зобу, боках, горле, спине и плечах темные пестрины. Ноги длинные, темно-зеленые, крыло снизу полосатое.



Гнездится почти по всей таежной зоне, местами в лесотундре и лесостепи. Гнездо возле кочки или пня. Голос — громкий мелодичный двусложный свист "тли-тюи".

Охотский улит [270] —
Tringa guttifer
(Таблица 25)

Очень похож на большого улита, но мельче, розоватый клюв длиннее и менее изогнут вверх, крыло снизу белое, поперечные полосы на хвосте едва заметны, ноги желтые, между основаниями пальцев узкая перепонка. При ходьбе не "кланяется", как другие улиты.




Редкий вид лиственничных марей и прибрежных болот Сахалина, побережий Охотского моря и, возможно, Приморья, Камчатки и Командорских островов. Гнездо строит на лиственнице из мха и лишайников, питается преимущественно рыбкой-колюшкой. Голос — визгливое "кейии".

В других странах встречается только на пролете и зимовках. Занесен в Красную книгу России.

На Чукотку и остров Врангеля залетают один-два североамериканских вида: желтоногий улит — *Tringa flavipes* [271], (Таблица 26), похож на фифи [265], но с ярко-желтыми ногами, коротким клювом и серыми в мелких пестринах шеей

и грудью, на боках мелкие поперечные пестрины, размером со скворца, голос — тихое свистящее "тю-тю"; и, возможно, пегий улит — *Tringa melanoleuca* (Таблица 26), очень похожий на желтоногого улита, но крупнее, клюв длиннее, голос — громкое нисходящее "тю-тю-тю".




Перевозчик [272] —
Tringa hypoleucos
(Таблица 25)

Мелкий (со скворца) кулик, сверху однотонно-бурый с легким бронзовым отливом и неясными попе-

речными пестринами, низ белый с бурым налетом на боках, на груди узкие темные пестрины, у летящей птицы на крыле широкая белая полоса. Хвост темный, сидящая птица часто им покачивает, наклонившись вперед. Перед основанием крыла белый цвет полосой заходит на бока. Клюв прямой, темный, ноги серые.

Один из самых многочисленных куликов повсюду южнее тундры. Гнездится по берегам небольших речек. Голос — звонкий двусложный свист или быстрая тонкая трель. Характерна привычка с криком сопровождать человека, идущего вдоль реки, перелетая с берега на берег.

На Чукотку залетает пятнистый перевозчик — *Tringa macularia* [273], (Таблица 26), очень похожий на перевозчика, но ноги желтоватые, клюв у основания светлый или розовый, хвост у сидящей птицы короче крыльев, заметная в полете белая полоса на крыле не доходит до его основания, летом весь низ в темный "горошек". Голос — повышающийся к концу односложный свист.




Мородунка [274] —
Tringa cinereus
(Таблица 25)

Размером со скворца, похожа на перевозчика [272], но клюв заметно изогнут кверху, желтый у основания,

верх серый без бронзового оттенка и (летом) с продольными пестринами, ноги желтые. Хвост темный, надхвостье белое. Сидя, покачивает приподнятым хвостом.

Гнездится на большей части таежной и лесотундровой зон по лесным рекам и озерам, на песчаных отмелях крупных рек. Голос — резкое "твит-вит-вит" или "ту-ли".


**Сибирский пепельный
улит [275] — *Tringa
brevipes***
(Таблица 25)



Весь верх серый (летом темно-серый) без пестрин, ноги более короткие, чем у других улитов, желтые, на хвосте и надхвостье совсем нет белого цвета, низ белый, летом с темным поперечным рисунком, бровь белая. На груди и боках летом серые поперечные полосы, брюшко, а осенью и зимой весь низ чисто-белые. У молодых птиц поперек груди серая полоса.

Гнездится на плато Путорана, в горах Северо-Восточной Сибири, Чукотки, Камчатки и, возможно, Прибайкалья на быстрых горных речках выше границы леса, иногда в старых гнездах дроздов, реже на земле, на пролете встречается по берегам морей. Изредка зимует на Камчатке и Сахалине. Голос — низкий двусложный восходящий свист "тю-вить?"

**Американский пепель-
ный улит [276] —
*Tringa incana***




Очень похож на азиатского пепельного улита, но все брюхо летом в широких темных поперечных пестринах. У молодых птиц и у взрослых в осеннем наряде брюхо белое, поперек груди ряд темных пестрин.

Вероятно, гнездится в горах Чукотки и Камчатки по берегам рек выше границы леса. На пролете встречается по скалистым побережьям дальневосточных морей. Голос — низкая свистящая четырех-восьмисложная трель, более тихая в конце.

10.6.7. Род Бекасовидные веретенники — *Limnodromus*


Кулики размером крупнее скворца с очень длинным, прямым, чуть расширенным на конце черным клювом и длинными желтыми ногами. Окраска спинной стороны пестрая, бурая, брюшной — ржаво-рыжая, хвост, надхвостье и бока полосатые. Осенью светло-серые с белым надхвостьем. Гнездятся в тундрах, на болотах, на пролете встречаются на морских побережьях. Самки вскоре после окончания откладки яиц покидают гнездовые участки; насиживают кладку и водят птенцов самцы. В России два вида.

На Дальнем Востоке может быть встречен канадский бекасовидный веретенник — *Limnodromus griseus*, очень похожий на американского, но сероватый сверху и с менее длинным клювом.



Американский бекасовидный веретенник [277] — *Limnodromus scolopaceus*
(Таблица 25)

Нижняя часть спины белая, грудь в темных пятнах. Гнездится в тундрах восточнее Хатанги. Голос — быстрый четырехсложный свист.



Азиатский бекасовидный веретенник [278] — *Limnodromus semipalmatus*
(Таблица 25)


Почти с голубя, спина темная, грудь без темных пятен. Гнездится небольшими колониями на травяных болотах лесостепей Западной Сибири, Прибайкалья, Забайкалья и Приханкайской низменности. В кладке обычно 2 желтовато-песочных с крапинами яйца. Голос — тихое двусложное карканье. Редок, занесен в Красную книгу России.

10.6.8. Род Веретенники — *Limosa*

Похожи на бекасовидных веретенников, но заметно крупнее (с голубя или больше), клюв очень длинный и тонкий. Гнездятся небольшими колониями на травянистых и моховых болотах.

В России два вида.


Большой веретенник
[279] — *Limosa*
limosa
(Таблица 22)



Крупнее голубя, брюхо и надхвостье белые, на боках и груди темные поперечные полосы, хвост черный с белым основанием, спина темная, на крыле белая полоса. Клюв прямой. Зимой голова и грудь серые, а не рыжие.

Гнездится на травянистых болотах средней полосы и юга России на восток до Алтая, местами в Сибири и на Дальнем Востоке. Голос — быстрое "вик-вик-вик".

Малый веретенник
[280] — *Limosa*
lapponica
(Таблица 22)




Размером с голубя, клюв слегка изогнут кверху, бока рыжие без поперечных пестрин. Хвост полосатый, нижняя часть спины белая. Зимой голова в серых пестринах, грудь белая.

Гнездится на болотах в тундре и лесотундре, местами в северной тайге. Весной иногда собирается в местах произрастания лукаскороды и поедает луковички. Голос — скрипучий двусложный крик, повторяемый в виде слитной трели.

10.6.9. Род Кроншнепы — *Numenius*

Крупные и средней величины кулики с длинным или очень длинным, сильно загнутым книзу тонким клювом. Окраска однотонная, с мелкими пестринами, сверху серая или буроватая, брюхо белое, бока белые с темными пестринами, хвост с поперечными полосками.

Гнездятся на болотах, сырых лугах, гарях, иногда в горах. В России семь видов.




Большой кроншнеп
[281] — *Numenius*
arquata
(Таблица 22)

Самый крупный кулик (больше вороны). Крыло снизу, надхвостье и брюхо

белые; бока, грудь и темя с узкими продольными пестринами; хвост белый с темными поперечными полосами, клюв очень длинный.

Широко распространен в лесах, лесостепях и степях на восток до Забайкалья, но в последние годы становится все более редок. Голос — заунывное протяжное свистящее "куу-и", весной — громкая свистовая трель.

Занесен в Красную книгу России.




Дальневосточный кроншнеп [282] —
Numenius
madagascariensis

Очень похож на большого кроншнепа, но надхвостье темное, подмышечные перья с черными полосами, крыло снизу, надхвостье и

брюхо серые, клюв непропорционально длинный.

Гнездится на моховых и травянистых болотах Дальнего Востока и, возможно, Якутии. Латинское название получил по одному из мест зимовки, так же, как и таитянский кроншнеп.

Средний кроншнеп [283]
 — *Numenius phaeopus*
 (Таблица 22)



Похож на большого кроншнепа [281], но размером меньше вороны, темя темное со светлой продольной полосой посередине, бровь белая, клюв короче и не так сильно изогнут.

Гнездится в лесотундре и тайге севера Европейской части России, отдельными очагами на севере Сибири и Дальнего Востока и в степях Зауралья. Голос похож на голос большого кроншнепа, трель "би-би-би".


Тонкоклювый кроншнеп [284] — *Numenius tenuirostris*
 (Таблица 22)

Похож на большого кроншнепа [281], но значительно мельче, клюв короче и не так сильно изогнут, на груди черные сердцевидные пестрины. Хвост белый с поперечными пестринами.

Одна из редчайших птиц мира. В последние десятилетия несколько десятков или сотен птиц зимуют в Марокко, но места гнездования неизвестны — видимо, это большие торфяные болота где-то в степи Западной Сибири или водоемы Заволжья. Голос как у большого кроншнепа, но несколько выше и короче.

Занесен в Красную книгу России.

Кроншнеп-малютка [285] — *Numenius minutus*
 (Таблица 22)



Размером с голубя, клюв короче и не так сильно изогнут. Темя черно-бурое с охристой продольной полосой, надхвостье темное, на боках поперечные полосы, на груди — продольные.

Гнездится в поясе стлаников и на гарях в горах Якутии и севера Средней Сибири, на пролете встречается на заболоченных лугах. Голос — мягкий двух-трехсложный свист.

Занесен в Красную книгу России.

На Чукотку залетали гнездящиеся в Северной Америке виды: эскимосский кроншнеп — *Numenius borealis* [286], очень похож на кроншнепа-малютку, но крупнее, темные пестрины на груди и боках в форме угольников, голос — мягкая дрожжащая трель, в настоящее время почти вымер;


таитянский кроншнеп — *Numenius tahitiensis* [287], (Таблица 26), похож на среднего кроншнепа [283], но надхвостье желтое, голос — двусложный свист.

10.6.10. Род Бекасы — *Gallinago*

Среднего размера коротконогие кулики с очень длинным прямым клювом. Окраска коричневато-охристая со светлыми продольными полосками на спине. При приближении человека затаиваются и с шумом взлетают из-под ног.

Гнездятся по сырым болотистым местам от тундр до степей. Скрытные сумеречные и ночные птицы. Весной самцы большинства видов совершают токовые полеты, резко пикируя, при этом крайние перья хвоста издают громкий характерный звук. Питаются в основном дождевыми червями и личинками, которых извлекают из мягкой почвы.

В России шесть видов, внешне почти неразличимых в полевых условиях.



Бекас [288] — *Gallinago gallinago*
(Таблица 25)


Крупнее скворца, брюшко белое, темя черное с охристой продольной полосой, крыло снизу белое, сверху с белой полосой по заднему краю (заметна в полете). Боковые перья хвоста широкие, рыжие с темными полосками и белыми кончиками. Взлетает с тихим кряканьем и первое время летит зигзагом, покачиваясь, так что попасть в не-

го на охоте удастся лишь хорошим стрелкам (слово "снайпер" происходит от "snipe", английского названия бекаса.)

Обычен на болотах, сырых лугах, в высокотравных степях и заболоченных лесах большей части страны, зимой встречается на Черноморском побережье Кавказа. Звук при токовом полете напоминает бление; эту странную дребезжащую "песню" бекаса часто можно слышать в лесу весенними ночами.

Дупель [289] —
Gallinago media
(Таблица 25)


Окрашен светлее, чем бекас, бока и брюшко с поперечными полосками, светлая полоса на крыле узкая, крайние перья хвоста белые, иногда с поперечными полосами. Взлетает молча, прямо, почти не покачиваясь.




Гнездится в болотах, лесах, лесостепях и лесотундрах на восток до Енисея. Самцы токуют на земле, собираясь после захода солнца на групповые токовища. Такие токовища существуют на одних и тех же местах десятилетиями. Их очень трудно найти, поэтому видеть токование дупелей доводилось немногим. Объект охоты.

Лесной дупель [290] —
Gallinago megala

Очень похож на бекаса [288], но крайние перья хвоста сужены (ширина около 3 мм), брюшко часто с сероватым оттенком, крылья сероватые, без белой полосы по заднему краю. Взлетает с тихим треском, покачиваясь.




Гнездится в лиственных и светлохвойных лесах Южной Сибири от Оби до Прибайкалья, а также на юге Дальнего Востока. Звук при токовом полете напоминает далекий шум реактивного самолета, с шипящим свистом в конце, чередуется с тройным криканьем.



Японский бекас [291] —
Gallinago hardwickii
(Таблица 26)

Очень похож на бекаса [288] и лесного дупеля, но размером почти с голубя. Еще светлее, чем дупель; крайние перья хвоста в ширину 5-6 мм; спина черноватая, низ в размытых пестринах. Крыло снизу серое, сверху без белой полосы. Взлетает обычно с резким "чак!"

Гнездится на склонах холмов с зарослями бамбука на юге Сахалина и Курильских островах, в последние годы появился на прибрежных лугах Южного Приморья и постепенно расселяется к северу. Токовый полет, как у лесного дупеля, но звук низкий и очень громкий, чередуется с односложным карканьем.




Азиатский бекас
[292] — *Gallinago*
stenura
(Таблица 25)

Очень похож на бекаса и лесного дупеля [288, 290], но крайние перья хвоста в

ширину всего около 1 мм, крыло острое, бровь охристая, белые полосы на спине и крыле очень узкие и в полете незаметны. Взлетает с тихим кряканьем.

Гнездится по сырым лугам, болотам и гарям в светлой войной тайге, лесотундре и тундре от Печоры до Анадыря. Токовый полет, как у лесного дупеля, но жужжащий звук выше, а крик односложный.



Горный дупель [293] —
Gallinago solitaria
(Таблица 25)

Клюв короче, чем у других видов рода, темя без охристых полосок, верх темный с ржавыми попереч-

ными пятнами, грудь бурая с белыми поперечными полосками. Крайние перья хвоста шириной 5-6 мм. Взлетает с грубым "кыш!"


Гнездится по сырым долинам горных ручьев и гольцам в Южной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Зимует на незамерзающих участках рек и ключах в лесном поясе гор; на Камчатке — у горячих источников. Токовый полет, как у бекаса, но звук выше.

Занесен в Красную книгу России.

10.6.11. Род Гаршнепы — *Lymnocyptes*

Один вид.

Гаршнеп [294] —
Lymnocyptes minima
(Таблица 25)




Похож на бекаса [288], но размером лишь чуть больше воробья. Лоб и темя черные, бровь светлая, спина черновато-бурая с металлическим отливом, хвост коричневатый. Клюв не очень длинный, прямой. Взлетает молча или с очень тихим чмокающим "чи-вик".

Гнездится от Финского залива до Колымы в северной тайге, лесотундре и тундре, а также, возможно, в Калининградской области. Обитает вблизи ручьев и проток на травяных и сфагновых болотах; на пролете встречается на илистых отмелях. Токовый полет, как у бекасов, но звук при пикировании похож на топот скачущей лошади.

10.6.12. Род Вальдшнепы — *Scolopax*

В России один лесной вид.

Вальдшнеп [295] —
Scolopax rusticola
(Таблица 25)



Крупный (с голубя) длинноклювый коротконогий кулик, сверху рыжеватый с бурыми пестринами, низ

серый с узкими поперечными пестринами. Голова, а у молодых и лоб, с черными поперечными полосами. Глаза большие, несколько сдвинуты к затылку. Крылья широкие. Взлетает обычно молча.

Широко распространенный вид, зимой встречается на Черноморском побережье Кавказа. Гнездится в сырых лесах (чаще лиственных или смешанных), реже в лесостепях, на пролете и зимовках встречается в садах и парках, у незамерзающих ручьев и речек. Токовый полет — так называемая "тяга", когда самцы, привлекая самку, медленно летают в сумерках над опушками, гарями, вырубками, лесными болотами с характерным криком "оок...ок-цсси, цсси". Питается, доставая из мягкой почвы дождевых червей и личинки. Скрытная ночная птица. Объект охоты.

10.7. Семейство Цветные бекасы — *Rostratulidae*

В период кочевок на сырые луга и кустарниковые заросли Южного Приморья залетает цветной бекас — *Rostratula benghalensis* [296], (Таблица 26), широко распространенный в тропиках, но очень редкий у нас. Это небольшой кулик с длинным прямым клювом, с широкими короткими крыльями, похожий на бекаса [288], но с кольцом вокруг глаза, желтым у самца и белым у более ярко окрашенной самки. Горло, зоб и шея у самки каштановые. Брюшко белое, на плече белая поперечная полоса, переходящая в желтую вдоль спины. Самец насиживает кладку (4-6 светло-бурых с темными пятнами яиц) и водит птенцов. Питается мелкими беспозвоночными. Голос отрывистый, напоминает звук, получающийся, если подуть в горлышко бутылки.

10.8. Семейство Якановые — *Jacanidae*

Яканы — водоплавающие птицы с очень длинными пальцами, приспособленными для ходьбы по листьям кувшинок и других водных растений. В Приморье залетала фазанохвостая якана — *Hydrophasianus chirurgus* [297], (Таблица 26), с очень длинным хвостом, гнездящаяся в Восточной и Южной Азии. Окраска очень яркая, шоколадно-коричневая, голова, шея и большая часть крыла белые, шея с золотисто-желтыми пятнами. На сгибе крыла короткий шип.

10.9. Семейство Тиркушковые – Glareolidae

Семейство включает тиркушек и бегунков — мелких насекомоядных птиц, гнездящихся небольшими колониями в степях, пустынях и на солончаках. Гнездо — ямка с выстилкой из травы. У тиркушковых короткий острый клюв и глубокий, достигающий до уровня глаза разрез рта.

В России два рода.


10.9.1. Род Тиркушки – Glareola

Немного похожие на больших ласточек дымчато-бурые перелетные птицы с длинными узкими крыльями, короткими ногами и вильчатым хвостом. Горло светлое, окаймлено черной полосой, брюшко белое.

Гнездятся обычно колониями недалеко от водоемов. Гнездо — неглубокая ямка в почве, в кладке 3, реже 4 яйца. Питаются насекомыми, которых ловят в воздухе, реже на земле.

В России три редких вида.


Степная тиркушка
[298] — *Glareola nordmanni*
(Таблица 23)



Крыло снизу черное.


Гнездится в степях, реже на полях от Дона до Алтая, в кладке 3-4 зеленоватых с густым темным крапом яйца. Голос — мелодичная журчащая трель.

Луговая тиркушка
[299] — *Glareola pratincta*
(Таблица 23)



Крыло снизу каштаново-рыжее. Окрашена чуть светлее степной тиркушки, хвост

вырезан не так сильно. Гнездится в степях Предкавказья, часто на солончаках, в кладке 3 белых с густыми темными крапинами яйца. Голос — трескучее стрекотание.



Восточная тиркушка
[300] — *Glareola*
maldivarum
(Таблица 23)

Очень похожа на луговую тиркушку, но хвост сравнительно короткий (у сидящей птицы заметно короче крыльев), крыло сверху без белой полосы.

Гнездится в степях Забайкалья, на пролете встречается на заливе Петра Великого. Крайне редкий вид, занесен в Красную Книгу России.

В Предкавказье и Поволжье залетал гнездящийся в щебнистых пустынях Африки, Юго-Западной и Средней Азии бегунок — *Cursorius cursor* [301], (Таблица 22), желтовато-песочный куличок размером со скворца с коротким закругленным хвостом. Верх головы темный, через глаза и затылок проходит черно-белая полоска, конец крыла и подмышечные перья темные, клюв тонкий, слегка изогнут вниз. Брюшко светлое. Быстро бегаёт, держась почти вертикально. Голос — тихий свист.

10.10. Семейство Поморниковые — *Stercorariidae*

Хищные птицы тундр и морских побережий, несколько похожие на длиннокрылых темноокрашенных чаек с клиновидным хвостом. Клюв темный, с острым крючком, ноги короткие, темные, с перепонками на лапах. Полет быстрый и очень маневренный.

Поморники хорошо знакомы жителям Севера, где местами получили прозвище "фашисты" за привычку отбирать добычу у других морских птиц. Во внутренних районах страны встречаются очень редко, несколько чаще — в пе-

риод полета на больших озерах северо-запада Европейской части и берегах морей Дальнего Востока. Гнездо — ямка иногда со скудной выстилкой из сухих листьев и лишайников. В кладке 2 буроватых или оливковых с темными пятнами яйца. Пуховые птенцы однотонно-бурые. Голос — отрывистый мяукающий крик, протяжный свист, визг и другие звуки.

Два рода.


10.10.1. Род Поморники — *Stercorarius*

Размах крыльев 1-1,3 м. Средняя пара перьев хвоста у взрослых птиц заметно удлинена. Крылья узкие. Окраска бывает двух типов: светлая с желтоватыми щеками и темная. На голове черная шапочка.

Гнездятся отдельными парами в сухих тундрах, в период кочевок встречаются по морским побережьям и в открытом море. Питаются леммингами, птенцами и яйцами птиц, насекомыми и ягодами, отбирают рыбу у чаек, крачек, чистиковых и глупышей.

Три вида.


Длиннохвостый поморник [302] —
Stercorarius longicaudus
(Таблица 27)



Самый мелкий поморник (размах крыльев до метра). Средние перья хвоста очень

длинные, более чем в два раза длиннее хвоста в целом, узкие и острые. Окраска всегда светлого типа, контрастная. Молодые птицы серые с размытыми поперечными пестринами (на боках беловатыми), центральные перья хвоста не удлинены, с закругленными концами. Полет легкий, изящный, птица часто висит над землей, трепеща крыльями, выслеживая леммингов.


Гнездится по всей тундровой зоне, на Камчатке, в районе Магадана, зимует на незамерзающих частях северных и дальневосточных морей. Чаше встречается в азиатской части Севера.



Короткохвостый поморник [303] —
Stercorarius parasiticus
 (Таблица 27)

Похож на длиннохвостого поморника, но несколько крупнее (размах крыльев около метра). Центральные рулевые перья острые и удлинены всего на несколько сантиметров, превышая длину хвоста менее, чем в два раза. Птицы светлой окраски похожи на длиннохвостого поморника. У птиц темной формы спина и брюхо бурые. У молодых птиц поперечные пестрины на боках рыжие.

Обитает там же, где и длиннохвостый поморник, на Белом море и на Командорских островах. Обычен в европейской части Севера. Зимой встречается также на Черном море.



Средний поморник [304] —
Stercorarius pomarinus
 (Таблица 27)

Окраской похож на короткохвостого поморника, но заметно крупнее (размах крыльев больше метра). Средние перья хвоста длиннее крайних не более, чем в два раза, закруглены, расширены на концах и перекручены. У птиц светлой окраски поперек груди темная полоса. Полет более тяжелый. У молодых птиц брюхо с четкими поперечными полосами, средние перья хвоста короткие, заостренные.

Распространен в северных тундрах от полуострова Канин до Чукотки. Численность повсюду невысока.

10.10.2. Род Большие поморники — *Catharacta*

Размах крыльев около 1,5 м. Полет тяжелый, с медленными уверенными взмахами крыльев, часто парят над береговыми скалами, иногда вместе с крупными чайками.

Гнездятся по берегам морей, зимуют в открытом океане. Питаются в основном рыбой, реже яйцами и птенцами, порой ловят и взрослых птиц.

В России два очень редких вида.

Большой поморник
[305] — *Catharacta skua*
(Таблица 27)



Рыжевато-бурый с темной шапочкой. Основания первостепенных маховых перьев белые, что хорошо заметно у летящей птицы.

В последние годы начал гнездиться на островах Мурманского побережья, возможны встречи на Новой Земле. На кочевках встречается на Баренцевом и Балтийском морях.

Антарктический поморник [306] — *Catharacta maccormicki*
(Таблица 27)

Черно-бурый с черной шапочкой или серовато-бурый с чуть более светлыми низом и головой.

Гнездится в Антарктике, на кочевках встречается у Южных Курил и Сахалина.

10.11. Семейство Чайковые — *Laridae*

Кроме всем известных чаек, к этому семейству относятся похожие на них крачки, которые отличаются узкими крыльями, вильчатым хвостом и очень короткими лапами. Большинство крачек белые или дымчато-серые с черной шапочкой, два вида почти черные.

Чайковые гнездятся отдельными парами или колониями по берегам водоемов. Гнезда сделаны в основном из травы, пуховые птенцы светло-серые или рыжевато-серые с темно-бурыми пятнами, реже светлые без пятен.

В России четыре рода.


10.11.1. Род Чайки — *Larus*

Белые птицы, обычно с серыми или черными спиной и крыльями. Хвост у большинства видов слегка закругленный.

Несмотря на внешнее сходство, можно научиться уверенно определять взрослых чаек в природе, особенно весной и летом (примерно до середины августа), когда многие виды (чаще мелкие) имеют черную или бурую окраску головы. Молодые птицы окрашены иначе, чем взрослые, и различаются с большим трудом. Изредка встречаются межвидовые гибриды.

В кладке 2-3 зеленоватых или светлых с темными пятнами яйца. Питаются чайки мелкой рыбой, водными беспозвоночными, реже ягодами, мелкими грызунами, птенцами и яйцами других птиц, насекомыми. Непереваренные остатки пищи (кости, шерсть, хитин, раковины моллюсков) отрыгивают в виде погадок, подобно тому, как это делают хищные птицы и совы. Крупные виды чаек часто имеют круглое красное пятно на подклювье. Птенцы клюют родителей в это пятно, вызывая рефлекс отрыгивания принесенной пищи.

Практически на любом водоеме страны можно встретить хотя бы один из 24 отмеченных в России видов.



Белая чайка [307] —
Larus eburneus
(Таблица 28)

Среднего размера (размах крыльев около метра) чисто-белая чайка с черными ногами и небольшим

темно-желтоватым клювом, молодые в резких черных пестринах и с темным пятном вокруг клюва. Хвост закругленный. Окраска клюва и ног позволяет отличить ее от других крупных чаек, среди которых изредка встречаются альбиносы.


Белую чайку можно назвать "самой северной" из всех птиц. Она распространена на островах Центральной Арктики: Виктория, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Геральд, возможно, Ушакова, Визе и Де-Лонга. Зимой встречается в Баренцевом и реже других северных морях. Изредка залетает вглубь материка. Селится отдельны-

ми парами или небольшими колониями. Гнезда помещает на каменистых участках побережий, карнизах скал, ледниковых уступах, по некоторым данным — также на айсбергах. Недавно крупная колония образовалась на о. Виктория на заброшенной полярной станции. В качестве материала для постройки гнезд использует водоросли, перья птиц, стебли растений. В кладке 2-3 белых с бурыми пятнами яйца. У гнезда ведет себя очень агрессивно. Питается рыбой, раками, отбросами, а также пометом и остатками добычи белых медведей, которых нередко подолгу сопровождает. Голос — резкое "кри-кри".

Занесена в Красную книгу России.

Сизая чайка [308] —
Larus canus
 (Таблица 28)

Среднего размера (с ворону, размах крыльев чуть больше метра) чайка с белой




головой, голубовато-серыми спиной и крыльями. Конец крыла черный с белыми пятнами, клюв и ноги зеленовато-желтые. Зимой на голове серые пестрины. Молодые с бурой полосой по переднему краю крыла, черной полосой по краю белого хвоста, темно-серыми концами крыльев. От серебристых [309-311] и других крупных чаек отличается, кроме размеров, также круглой (не угловатой) головой и слабым клювом.

Гнездится небольшими колониями на озерах и морских островах почти повсюду от южных тундр до лесостепей, зимует на берегах незамерзающих морей. На пролете встречается повсюду, даже на городских прудах. Голос — пронзительный скулящий лай.


Серебристая чайка
[309] — *Larus*
argentatus
 (Таблица 27)

Крупная (значительно больше вороны, размах крыльев около 1,3 м) чайка



с белой головой и серебристо-серыми спиной и крыльями. Клюв массивный, желтый с круглым красным пятном снизу, ноги розовые, конец крыла черный с белыми пятнами. Зимой на голове темные пестрины. Молодые серовато-бурые с черной полосой по краю бурого хвоста и зеленоватым с черным кончиком клювом.


Гнездится по берегам морей, крупных озер и водохранилищ севера и средней полосы Европейской части России, зимует на побережьях незамерзающих морей. Часто попадает на глаза жителям городов, когда во время пролета кружит над ними на большой высоте. Голос — звонкий хохот и хриплые крики.



Южная серебристая чайка [310] — *Larus cachinnans*
(Таблица 27)

Очень похожа на серебристую чайку, но ноги желтые.

Гнездится по озерам и морским островам юга России на восток до Алтая, зимует на Черном, Азовском и Каспийском морях.



Северная серебристая чайка [311] — *Larus heuglini*
(Таблица 27)

Похожа на серебристую чайку [309], но спина и крылья темные, грифельно-

но-серые, ноги желтые или розовые.

Гнездится на морях, озерах и реках по всей территории тундровой и лесотундровой зоны, местами в северной тайге, в Прибайкалье, Туве и на озере Ханка. Зимует на берегах незамерзающих морей.


Примечание. Систематика группы серебристых чаек остается предметом дискуссии специалистов. Некоторые подвиды этого вида многие зоологи считают подвидами южной серебристой чайки или клуши.

Клуша [312] — *Larus fuscus*

(Таблица 27)

Очень похожа на серебристых чашек, особенно на северную, но немного мельче, спина и крылья еще темнее — буровато-черные. Молодые птицы с крупными темными пестринами на спине и черным клювом. Ноги желтые.

Гнездится небольшими колониями и отдельными парами на островах и прибрежных скалах морей и крупных озер северо-запада Европейской части России, зимой встречается в дельте Волги, на пролете изредка в центральных областях. Кроме типичных кормов, часто поедает насекомых, хитиновые остатки которых можно увидеть в погадках. Голос ниже, чем у серебристых чашек.




Морская чайка [313] — *Larus marinus*

(Таблица 27)

Очень крупная чайка (размах крыльев около полутора метров), окраской похожа на клушу, но спина и крылья совсем черные с белой каймой по краю крыла. Ноги розовые. Молодые с охристыми с поперечным рисунком спиной и плечами, светлой головой.


Гнездится по скалистым берегам Баренцева и Белого морей, на Финском заливе, осенью и зимой встречается в Калининградской области. Иногда охотится на птиц возле птичьих базаров или отбирает у них рыбу.



Тихоокеанская чайка [314] — *Larus schistisagus*


(Таблица 27)

Крупная чайка (размах крыльев до полутора метров) с белой головой; чер-



но-серыми крыльями и спиной, розовыми ногами. Клюв желтый с круглым красным пятном снизу. Концы крыла черный с белыми пятнами. Молодые сероватые с серым хвостом. Двухлетки иногда имеют черные поперечные полосы на клюве и хвосте и тогда отличаются от чернохвостой чайки [315] только более крупными размерами и почти черной спиной.

Гнездится по скалистым берегам дальневосточных морей, зимует на свободных ото льда водах.




Чернохвостая чайка
[315] — *Larus*
crassirostris
(Таблица 27)

Среднего размера (размах крыльев около метра) чайка, похожая по окраске

на тихоокеанскую, но немного светлее, с черными полосками по краю хвоста и поперек клюва. Молодые серовато-бурые с темным хвостом. Ноги желтые.

Гнездится на островах и прибрежных скалах на юге Дальнего Востока, обычна во Владивостоке, Находке и портах Южного Сахалина, зимой встречается у Южных Курил. Голос — отрывистый лай.




Серокрылая чайка
[316] — *Larus*
glaucescens

Крупная (размах крыльев около 1,3 м) чайка с белой головой, светло-серой спиной и крыльями. Кон-

цы крыльев серые с мелкими белыми пятнами, ноги розовые, клюв желтый с красным пятном снизу. Молодые серо-бурые с поперечными пестринами на спине и хвосте.

Гнездится на скалах Командорских островов и, возможно, восточной Камчатки, зимует у Камчатки и Курил. Летом чаще всего встречается на лежищах морских котиков.

Бургомистр [317] —
Larus hyperboreus
 (Таблица 27)



Очень крупная чайка (размах крыльев около полутора метров) с белой головой, светло-серыми спиной и крыльями. Концы крыльев белые, ноги розовые. Издали кажется почти белой. Клюв желтый с красным пятном снизу. Молодые светлые, серо-буроватые, на вторую зиму — в мелких размытых пестринах. Вокруг глаза узкое желтое кольцо. У сидящей птицы хвост выступает из-под крыльев.


Гнездится по берегам северных морей, реже в тундре от Горла Белого моря до Корякского нагорья, зимует на незамерзающих частях дальневосточных морей. Часто селится на птичьих базарах или рядом с ними, собирая с их обитателей "налог" яйцами и птенцами, за что, вероятно, и получил свое название.

Малая полярная чайка [318] — *Larus glaucoideus*

Очень похожа на бургомистра, но размах крыльев чуть больше метра, клюв не такой мощный, концы крыльев белые с размытым сероватым рисунком, вокруг глаза узкое оранжевое кольцо. Голова более округлая, как у сизой чайки. Молодые птицы сероватые без бурого оттенка. У сидящей птицы хвост обычно короче сложенных крыльев.

Возможно, гнездится на Новой Земле, на кочевках бывает в Баренцевом море и у острова Врангеля.

Черноголовый хохотун
[319] — *Larus ichthyaetus*
 (Таблица 27)




Очень крупная чайка (размах крыльев около полутора метров). Весной и летом, единственная из крупных видов, имеет черную голову с узким белым полукольцом вокруг глаза, осенью и зимой голова серовато-белая

с белыми пятнами вокруг глаз. Спина и крылья серо-сизые, конец крыла белый с треугольным черным пятном. Клюв желтый с красным кончиком и черной поперечной полосой, ноги желтые. Молодые птицы светлые с серо-охристыми спиной и крыльями, черным клювом и черной полосой по краю хвоста.

Гнездится на островах по большим степным озерам и морским заливам от Азовского моря до Тувы, многие колонии из года в год меняют расположение. Птенцы серебристо-белые, лишь иногда с неясными темными пятнами на спине. Зимой встречается на Азовском и Каспийском морях. Голос — глухой лай.

В нашей стране насчитывается всего несколько тысяч пар этой красивейшей в мире чайки, поэтому черноголовый хохотун занесен в Красную книгу России.

На Черном море может быть встречена редкая чайка **Одуэна** — *Larus audouinii*, гнездящаяся на островах Средиземного моря. Она похожа на серебристых чаек [309, 310], но ноги темные, клюв красный с черной перевязью и желтым кончиком (у молодых птиц серый с черной перевязью), размах крыльев около метра.



**Озерная чайка [320] —
Larus ridibundus
(Таблица 28)**

Мелкая чайка (немного больше голубя, размах крыльев около метра) со светло-серыми спиной и крыльями,


ноги ярко-красные, клюв темно-красный, довольно тонкий, на конце крыла по его заднему краю узкая черная полоса, передний край крыла с узкой белой полоской. Голова весной и летом темно-коричневая (издали кажется черной) с узкими белыми пятнышками над и под глазом, осенью и зимой серовато-белая с темным пятном позади глаза. Молодые птицы с черной полосой на хвосте, крылья серо-бурые с белыми концами.

Самый обычный вид Европейской части страны, гнездится по всей Сибири южнее лесотундры, на юге Дальнего Востока, Колыме и Камчатке, в основном на озерах, иногда в черте городов (известна, например, огромная колония на Люблинских полях фильтрации в Москве); зимой встречается

ся на незамерзающих морских побережьях. Голос — резкое трескучее "кярр".

На озеро Ханка очень редко залетает буроголовая чайка [321] — *Larus brunnicephalus*, похожая на озерную чайку, но более плотного сложения, с черными закругленными концами крыльев. Голос — дребезжащий крик. Гнездится на озерах Памира и Тибета.

Черноголовая чайка
[322] — *Larus melanosephalus*
(Таблица 28)



Мелкая чайка (размах крыльев чуть меньше метра), похожа на озерную [320], с сероватыми спиной и крыльями, красными ногами. Клов более сильный, чем у озерной чайки, алый с черной поперечной полосой на конце. Летом голова черная с белыми пятнами над и под глазом, конец крыла белый, осенью и зимой голова белая с серой полосой через глаз, конец крыла белый с черными полосками и пятнами. Молодые птицы отличаются от молодых озерных чашек черными концами крыльев, клюв и ноги желтоватые.

Гнездится на озере Маныч, на кочевках встречается в Ростовской и Калининградской областях, осенью и зимой — у Черноморского побережья Кавказа. Известен случай гнездования в Подмоскowie.

Реликтовая чайка
[323] — *Larus relictus*
(Таблица 28)



Похожа на черноголовую чайку, но конец крыла черный с белыми пятнами, молодые птицы сверху густо-серые, голова серовато-черная.

Гнездится на Торейских озерах в Читинской области, изредка залетает в другие районы Южной Сибири. Колонии очень чувствительны к беспокойству, при частом посещении гнездовой людьми погибает большинство птенцов.

Занесена в Красную книгу России.


Китайская чайка

[324] — *Larus saundersi*

Похожа на черноголовую чайку [322], но мельче (размах крыльев 80-90 см), клюв черный, конец крыла белый с цепочкой мелких черных пятен по заднему краю, летом голова черная, а вокруг глаза белое кольцо.

Места гнездования этой крайне редкой птицы обнаружены только в последние годы, это островки у побережья Желтого моря и озера на севере и востоке Китая. В период кочевок встречается в Приморье и изредка на Южных Курилах.

На остров Врангеля залетала североамериканская **бонапартова чайка** — *Larus philadelphia* [325], похожая на черноголовую и озерную чаек [322, 320], но мельче (размах крыльев 70-80 см), конец крыла как у озерной (но с узкой черной полоской по переднему краю), а голова — как у черноголовой чайки, клюв черный, молодые птицы с бурой, а не серой спиной. Полет порхающий, обычно с опущенным вниз клювом.




Морской голубок
[326] — *Larus genei*
(Таблица 28)

Мелкая чайка (размах крыльев около 90 см) с белой головой, светло-серыми

спиной и крыльями, красными лапами. На груди иногда легкий розоватый оттенок. Крыло снизу темное, сверху как у озерной чайки [320], но с узкой черной полоской по переднему краю. Клюв длинный, тонкий, ярко-красный, в полете обычно опущен. Молодые сверху рыжевато-серые, более светлой однотонной окраски, чем молодые озерные и черноголовые [322] чайки, с оранжевыми лапами; в первую зиму — с двумя буроватыми полосками на крыле и черной полосой по краю хвоста.

Гнездится на озерах и морских заливах в Предкавказье, изредка на юге Западной Сибири.


Малая чайка [327] —
Larus minutus
 (Таблица 28)



Очень мелкая чайка (размах крыльев 60-70 см), с сероватыми крыльями и спиной, красными ногами и клювом. Голова летом полностью черная, осенью и зимой светлая с темными пятнами позади глаз и на темени. Крыло закругленное на конце, снизу почти черное с узкой белой полосой по заднему краю. Молодые птицы с зеленоватым клювом, узкой черной полосой по краю слегка вырезанного хвоста, темным теменем, на спине и крыльях темная полоса в виде буквы "М", снизу крыло белое. Полет легкий, порхающий. Часто ловит насекомых в воздухе. На воде сидит очень высоко.


Гнездится в средней полосе от Калининградской области до Забайкалья, изредка севернее, обычна на юге Западной Сибири. Селится небольшими колониями на заросших озерах и травяных болотах. Голос — тихое мелодичное "кек-кек-кек".

Вилохвостая чайка
[328] — *Larus sabini*
 (Таблица 28)



Мелкая чайка (размах крыльев около 80 см) с вырезкой на хвосте. Голова летом темно-серая с черной каймой (издали кажется черной), осенью и зимой сероватая с темным пятнышком позади глаза, спина и плечи светло-серые, крыло белое с треугольным черным пятном, захватывающим конец и передний край. Клюв черный (у взрослых с желтым кончиком), вокруг глаза узкое красное кольцо, ноги черные. У молодых серый цвет заменен черно-бурым, такого же цвета голова, ноги бурые, по краю хвоста узкая черная полоса.

Гнездится маленькими колониями на тундровых озерах по северному побережью от Таймыра до Чукотки, на кочевках изредка залетает в Среднюю полосу. Голос — трескучая трель.



Розовая чайка [329] —
Larus rosea
(Таблица 28)

Мелкая чайка (размах крыльев около 80 см) с клиновидным хвостом, красными ногами и коротким

черным клювом. Спина и крылья светлые, голубовато-серые, летом на шее узкий черный полушейник, оперение с легким розоватым оттенком, осенью и зимой за глазом темное пятнышко. Молодые очень похожи на молодых малых чаек [327] и моевок [330, 331], отличаются только формой хвоста, ноги желтые.


Гнездится маленькими колониями в озерных тундрах от восточного побережья Таймыра до Чаунской губы, чаще всего между устьями Яны и Колымы, осенью кочует в арктических морях, зимой — в дальневосточных. Очень редко залетает в Северную Атлантику, где долгое время считалась сказочной птицей из матросских легенд. Голос как у малой чайки.

За пределами нашей страны известны лишь отдельные случаи гнездования. Занесена в Красную книгу России.

10.11.2. Род Моевки — *Rissa*

В отличие от других чаек у моевок нет первого пальца. Гнездятся на скалах морских побережий, образуют большие колонии.

Два вида.



Обыкновенная моевка
[330] — *Rissa tridactyla*
(Таблица 28)


Мелкая морская чайка (размах крыльев до метра), белая с серыми спиной и крыльями, концы крыльев

черные без белых пятен (в отличие от сизой чайки), хвост прямой, клюв небольшой, желтый. Ноги короткие, трехпа-

лые, черные (у птиц с Чукотки и острова Врангеля иногда желтые или оранжевые). Молодые с черным клювом, темным полушейником (в отличие от молодых малой и розовой чаек [327, 329]) и пятном позади глаза (такое же пятно и иногда полушейник осенью и зимой у взрослых птиц); чуть вырезанным хвостом с черной полоской по краю; часто на спине и крыльях темный рисунок в виде буквы "М".

Один из основных видов птичьих базаров северных и дальневосточных (кроме Японского) морей. Гнезда из травы прилеплены к карнизам скал, на птичьих базарах моевки часто гнездятся на самых узких карнизах. В портовых городах Западной Европы иногда гнездится на карнизах домов, у нас такие случаи известны в поселках близ Мурманска. Зимой встречается у Южных Курил. Раз в несколько лет стаями появляется на Байкале. В кладке 2-3 светлых с черными пятнами яйца. Питается в основном мелкой рыбой. Голос — звонкое "китти-вэй" или "йа-йа-йа".

Красноногая моевка
[331] — *Rissa*
brevirostris
(Таблица 28)



Похожа на обыкновенную моевку, но ноги ярко красные (тоже трехпалые), крыло острое, снизу темное, его черный конец не так резко отграничен от серой основной части. Молодые птицы без черной полосы по краю хвоста.

Гнездится на птичьих базарах Командорских островов, залетает на другие побережья Дальнего Востока. В кладке одно, очень редко два серых с коричневыми пятнами яйца.


10.11.3. Род Крачки — *Sterna*

Размером от вороны до скворца. Несколько похожие на больших ласточек белые или светло-серые птицы с черной шапочкой на верхней части головы, вильчатым хвостом и острым шиловидным клювом. Молодые серые с черным затылком. Полет легкий, порхающий, часто зависают над водой, потом пикируют, на мгновение погружаются в воду и

тут же взлетают с пойманной рыбкой в клюве. На земле крачки, в отличие от чаек, чувствуют себя довольно неуверенно и редко ходят пешком.

Питаются мелкой рыбой и водными насекомыми. Гнездо — ямка с выстилкой из травы или без нее, в кладке 2-3 оливковых или охристых с темными пятнами яйца. Весной можно наблюдать своеобразный брачный ритуал крачек. Чтобы добиться благосклонности самки, самец делает ей "свадебный подарок" — маленькую рыбку.

В России семь видов.




Речная крачка [332] —
Sterna hirundo
(Таблица 29)

Самая обычная крачка Средней полосы. Размером меньше голубя, сверху светлая, голубовато-серая, снизу белая. Клюв красный с черным кончиком или черный, лапы красные. У сидящей птицы хвост не выступает из-под сложенных крыльев. Осенью лоб белый. Молодые птицы с темными концами крыльев.

Гнездится на песчаных и галечных косах, на низменных берегах озер практически повсюду южнее тундр. Голос — трескучий крик или тихое "ки-ки-ки".

Гнездится на песчаных и галечных косах, на низменных берегах озер практически повсюду южнее тундр. Голос — трескучий крик или тихое "ки-ки-ки".




Полярная крачка [333] —
Sterna paradisaea
(Таблица 29)

Очень похожа на речную крачку, но снизу с дымчатым оттенком, клюв у взрослых

целиком красный, у сидящей птицы хвост выступает из-под сложенных крыльев.

Гнездится повсюду на озерах и берегах морей в тундре и лесотундре, местами в северной тайге, на островах Арктики и побережье Камчатки. У полярной крачки самый длинный из перелетных птиц мира путь миграции: из Арктики она летает зимовать к берегам Антарктиды.


Малая крачка [334] —
Sterna albifrons
 (Таблица 29)



Размером всего со скворца, сверху светло-серая, снизу белая, клюв желтый, лапы желтоватые, лоб белый, хвост слабо вырезан. Молодые птицы с рыжеватой головой и спиной, конец крыла с черной полосой по переднему краю.

Гнездится по берегам морей, крупных рек и озер средней полосы и юга страны на восток до Оби, а также на Амуре и в Приморье. Довольно редка.

Камчатская крачка
[335] — *Sterna*
camtschatica
 (Таблица 29)




Сизо-серая, снизу чуть светлее, лоб белый, клюв и лапы черные. Молодые птицы с буроватыми головой и спиной.

Редкий вид побережий Дальнего Востока от Анадыря до Сахалина, гнездится на топких берегах в устьях рек, на заливах. Зимой встречается у Сахалина. Голос — тихое чирикание и посвисты.

Занесена в Красную книгу России (у нас гнездится всего несколько тысяч пар).

Примечание. В Красной книге и многих справочниках этот вид назван алеутской крачкой — *S. aleutica*.


Пестроногая крачка
[336] — *Sterna*
sandvicensis
 (Таблица 29)



Размером крупнее голубя, серая сверху и белая снизу, шапочка с коротким хохлом. Клюв черный с желтым кончиком, лапы черные. Зимой лоб и темя белые, черный цвет нигде не доходит до

клюва. Молодые птицы серые, спина с темными поперечными пестринами, концы крыльев не темнее спины.

Гнездится по песчаным берегам Азовского и Каспийского морей, зимой встречается там же и на Черноморском побережье Кавказа. Голос — скрипучий треск.




Чайконосая крачка
[337] — *Sterna nilotica*
(Таблица 29)

Похожа на пестроносую крачку [336], но немного меньше, клюв массивный, полностью черный, хохла

нет, хвост с неглубокой вырезкой.

Гнездится по берегам морей, озер и рек в степной зоне: в Предкавказье, на реке Урал, изредка на юге Западной Сибири, в Туве и Забайкалье, зимой встречается на Черноморском побережье Кавказа. В кладке 3 охристых с белыми пятнами яйца. Питается в основном степными насекомыми, реже рыбой, грызунами и ящерицами. Голос — мягкое "ке-век... ке-век".



Чергава [338] — *Sterna caspia*
(Таблица 29)

Самая крупная крачка (размером с ворону). Шапочка черная (зимой пегая) с коротким хохлом. Клюв

очень массивный, красный, лапы черные. Вырезка на хвосте неглубокая.

Гнездится на крайнем западе России и в Предкавказье, Прикаспии, на оз. Чаны, в дельте Селенги, на Торейских озерах и, возможно, на озерах Убсу-Нур и Ханка, на морях, больших реках и озерах. Питается преимущественно рыбой. В кладке 2-3 охристых с черными пятнами яйца. Пуховой птенец белый или желтовато-серый, почти без пятен. Голос — резкое карканье.

У берегов Приморья может быть встречена темная крачка — *Sterna fuscata*, гнездящаяся в тропиках и субтропиках

всех океанов. Она черная сверху и белая снизу, лоб белый, через глаз черная полоска, клюв и ноги черные.


10.11.4. Род Болотные крачки — *Chlidonias*

Мелкие (крупнее скворца) темноокрашенные птицы со слабо вырезанным хвостом и узкими крыльями. Лапы красные. Полет легкий, порхающий.

Гнездятся на сплавинах, кочках, в тростниках на озерах и тихих реках, реже на травяных болотах. В кладке 3 бурых с темными пятнами яйца. Питаются насекомыми, которых склевывают с земли или с поверхности воды, реже мальками. Голос — тихое "кек-кек-кек".

Три вида.


Черная крачка [339] —
Chlidonias nigra
(Таблица 29)



Летом черная с белым брюшком; в зимнем наряде и у молодых птиц спинная сторона серая, брюхо и шея белые, хвост темный, по бокам груди черные пятна, позади глаз широкая черная поперечная полоса. Клюв черный, крыло снизу светлое.


Гнездится в Средней полосе и на юге на восток до Оби, изредка в Туве и Прибайкалье.

Белокрылая крачка
[340] — *Chlidonias*
leucoptera
(Таблица 29)



Похожа на черную крачку, но крыло сверху белое, а снизу темное. Зимой светлее, хвост белый. Молодые птицы похожи на молодых черных крачек, но спина черная, а хвост белый, черных пятен по бокам груди нет. Клюв черный.

Гнездится в средней полосе и на юге на восток до Приамурья, но в Сибири восточнее Оби очень редка.



Белошекая крачка
[341] — *Chlidonias*
hybrida
 (Таблица 29)

Похожа на речную и полярную крачек [332, 333], но низ темный, а хвост с неглубокой вырезкой. Щеки белые. Зимой бледно-серая с черной полосой через глаз. Молодые птицы с серыми крыльями и буроватой спиной.

Редкий вид, гнездится отдельными колониями в Предкавказье, на Дону, в Поволжье, дельте Селенги, на озерах Торейских и Ханке и, возможно, в Приамурье.

10.12. Семейство Чистиковые — *Alcidae*

Морские птицы, гнездящиеся обычно большими колониями, реже отдельными парами по берегам северных и дальневосточных морей. Самцы и самки окрашены одинаково. Питаются рыбой, мелкие виды — планктоном, хорошо плавают и ныряют. При плавании под водой гребут крыльями. Хвост и крылья короткие, полет быстрый, прямолинейный, на крутых поворотах вместо хвоста "рулят" вытянутой в сторону лапой с расправленной плавательной перепонкой. На суше сидят, опираясь на цевку.

Гнездятся на уступах и в трещинах скал, в каменистых осыпях, некоторые виды роют норы (один вид гнездится на деревьях), откладывая яйца прямо на скалы или голый грунт. Зимуют в открытом море. У видов, гнездящихся на скалах, яйца отчетливо грушевидной формы, что предохраняет их от скатывания с узкого гнездового карниза. Пуховые птенцы большинства видов темно-бурые. Зимой окраска более светлая, и многие мелкие виды становятся трудноразличимы.

В России 11 родов.

10.12.1. Род Кайры — *Uria*


Крупные (с ворону) черно-белые птицы, несколько похожие на пингвинов. Клюв сравнительно длинный, шиловидный, черный. Зимой горло и передняя часть шеи белые. Лапы желтоватые.

Основные обитатели большинства птичьих базаров. Гнездятся на узких скальных карнизах огромными колониями, реже группами в колониях других морских птиц. На некоторых островах известны гнездовья на плоских вершинах скал. В кладке 1 яйцо. Цвет скорлупы весьма изменчив и может быть белым, охристым, голубоватым, или оливковым, крапины также весьма разнообразной формы и величины, часто с большим количеством витых полосок. Голос — хриплое ворчание.

Некоторые народы Севера охотятся на кайр и собирают их яйца на птичьих базарах. В годы войны 1941-1945 гг. сбор яиц был организован в промышленных масштабах и сыграл важную роль в обеспечении питанием жителей северных городов. Сейчас многие "птичьи базары" нуждаются в строгой охране.

Два вида, часто встречающихся вместе.


Тонкоклювая кайра
[342] — *Uria aagle*
(Таблица 30)



Бока с темными пестринами, зимой от глаза вниз отходит косая темная полоса. У некоторых особей белое кольцо вокруг глаза.

Гнездится на Баренцевом и всех дальневосточных морях, на острове Геральд. Зимой встречается на юге Охотского моря и у Курильских о-вов. Колонии на Средних Курилах, острове Тюлений близ Сахалина и острове Ионы насчитывают по несколько сотен тысяч гнезд. Особенно интересна колония на Тюленьем, где насиживающие птицы сидят бок о бок на плоской вершине острова.

Толстоклювая кайра
[343] — *Uria lomvia*
(Таблица 30)




Клюв несколько толще и короче, с беловатой полосой. Бока без пестрин. Зимой темной полосы у глаза нет.

Распространена в северных и дальневосточных морях, кроме Карского, Белого, Японского и южной части Охотского.

Зимует у края плавучих льдов. Самые крупные колонии (до 1 млн. пар) расположены на Новой Земле и Чукотке.

10.12.2. Род Гагарки — *Alca*

Один вид, гнездящийся только на северо-западе страны.



Гагарка [344] — *Alca torda*
(Таблица 30)


Похожа на кайр, но клюв очень высокий, сжатый с боков, черный с белой вертикальной полосой.

У плывущей птицы клюв и хвост обычно приподняты.

Гнездится на Мурмане, в Белом море, Финском заливе, и, возможно, на островах Ладоги. Гнезда, точнее, гнездовые площадки совершенно без выстилки, располагаются в скальных трещинах, россыпях камней или в завалах бревен. В кладке 1 яйцо, окраска которого сильно варьирует. Зимой встречается в Баренцевом море. Голос — скрипучий крик.

10.12.3. Род Люрики — *Alle*

Один вид.



Люрик [345] — *Alle alle*
(Таблица 30)

Мелкая (со скворца) черно-белая птица с белым пятнышком над глазом, серыми ногами и очень коротким черным клювом.

Летом голова и шея черные, зимой горло и щеки белые. Зимой очень похож на длинноклового пьжика [349], отличаясь от него коротким клювом, черной шапочкой, заходящей ниже угла рта, в полете — отсутствием широких белых полос на плечах.

Гнездится огромными колониями в осыпях и трещинах скал на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, возможно гнез-

дование на Северной Земле и восточной Чукотке. Одна из самых многочисленных птиц мира. Самые крупные гнездовья насчитывают, возможно, до миллиона птиц. Зимует у кромки плавучих льдов. В кладке 1 белое с желтыми пятнами яйцо. Голос — резкий трескучий крик.


10.12.4. Род Чистики — *Serphus*

Птицы чуть меньше голубя, с тонким черным клювом и красными (у молодых розоватыми) лапами. Летом черные, зимой серебристо-белые с серыми пестринами и концами крыльев.

Гнездятся в трещинах скал, среди валунов, иногда в норах в слое торфа среди плавника. Местами образуют большие рассеянные колонии. В кладке 1-2 голубовато-белых с крупными темными пятнами яйца. Голос — свист и трели.

Три вида.


Обыкновенный чистик
[346] — *Serphus grylle*
(Таблица 30)



На крыле квадратное белое пятно, подмышечные перья белые. Зимой бока белые, спина белая в буроватых пестринах. Птенец покрыт густым черным пухом.


Гнездится на берегах северных морей, на Ладоге и Финском заливе. Взрослые птицы, птенцы которых покинули норы, продолжают посещать колонию, заглядывая к соседям и докармливая чужих птенцов. Поэтому даже птенцы, потерявшие родителей, не погибают. Зимует на разводьях среди плавучих льдов.

Тихоокеанский чистик
[347] — *Serphus columba*



Белое пятно на крыле рассечено черными полосками, подмышечные перья серые. Зимой бока в буроватых пестринах.

ватых поперечных пестринах, спина серая. Гнездится на побережье Восточной Чукотки и дальневосточных морей (кроме Японского), зимует у берегов Камчатки и Курил.



Очковый чистик
[348] — *Serphus carbo*
(Таблица 30)

белые пятна.

Гнездится на берегах Охотского и Японского морей, на Курилах и, возможно, на Восточной Чукотке. Зимой встречается у берегов Приморья и Южных Курил.


Крыло, а зимой и вся спинная сторона полностью темные, вокруг глаза и (летом) у основания клюва

10.12.5. Род Пыжики — *Brachyramphus*

Мелкие птицы (меньше голубя); летом серые в размытых темных пестринах; зимой белые с темно-серой спиной, резко отграниченной темной шапочкой и белыми плечевыми перьями.

Гнездятся отдельными парами. Это единственная группа чистиковых птиц, гнезда которых бывают расположены далеко от моря (до 30 км). В кладке 1 зеленоватое с темными крапинками яйцо. Голос — короткий скрип.

В России два редких, малоизученных вида.




Длиннокловый пыжик
[349] — *Brachyramphus*
marmoratus
(Таблица 30)

Клюв длиной около 2 см, летом горло светлое, верх головы, спина и крылья темно-бурые, однотонные, зимой темная шапочка спускается ниже глаз. От других мелких чистиковых зимой отличается длинным клювом и белыми плечевыми перьями.

Гнездится на деревьях, преимущественно лиственницах, откладывая яйцо на толстые уплощенные ветви, или открыто на земле. Птенец покрыт желтоватым с темными пестринами на спине и однотонным на брюхе пухом. Распространен по берегам Дальнего Востока к северу до Пенжинской губы и Каргинского залива, зимой может быть встречен у Южных Курил.

Короткоклювый пыжик
[350] — *Brachyramphus*
brevirostris
(Таблица 30)



Клюв короче (длиной до 1 см), края хвоста белые, летом горло темное, спина, грудь и бока серые в мелких пестринах, зимой плечевые перья белые с темными поперечными штрихами, темная шапочка узкая, не доходит до глаз, бока головы белые.

Гнездится отдельными парами в каменных россыпях на севере Охотского и Берингова морей, возможно, на Чукотском море, на Восточной Камчатке, зимует у Командорских и Курильских островов.

Занесен в Красную книгу России.


10.12.6. Род Старики — *Synthliboramphus*

Мелкие птицы (меньше голубя) с коротким светлым клювом, темными ногами, сизым верхом и белым низом. Голова черная, клюв светлый (в отличие от люрика [345]).

Гнездятся между камнями или в норах на небольших островках. В кладке 2 охристых с бурыми пятнами яйца. Голос — тонкий свист.

В России два вида.


Обыкновенный старик
[351] — *Synthliboramphus*
antiquus
(Таблица 30)



Летом горло черное, полоска за глазом белая. Зимой бока, низ шеи и щеки

белые; верх (в отличие от других мелких чистиковых) сизый без белых полос на плечах. Клюв желтый.

Гнездится на берегах Дальнего Востока к северу до Пенжинской губы и Командор, зимой встречается у Командор, Курил, юга Сахалина и Приморья.



Хохлатый старик
[352] —
Synthliboramphus
wumizusume

Очень похож на обыкновенного старика, но горло и затылок белые, на голове

летом прилегающий черный хохолок. Зимой белый цвет на горле доходит до основания клюва, на затылке две продольных белых полосы. Клюв серый.

Гнездится на островах у берегов Японии и, возможно, залива Петра Великого, зимой изредка встречается у берегов Южного Приморья и Южных Курил.

Занесен в Красную книгу России.

10.12.7. Род Алеутские пыжики — *Ptychoramphus*

Один редкий вид.

Алеутский пыжик [353]
— *Ptychoramphus*
aleuticus

Размером со скворца, однотонно-темный с желтым клювом, белым пятнышком над глазом и светлым брюшком. Зимой горло светлое, бока, в отличие от люрика [345], темные.

Гнездится в норах, каменистых россыпях и трещинах скал на берегах запада Северной Америки и Алеутских островов. Залетает на Камчатку и Курилы, гнездовый в России пока не найдено.


10.12.8. Род Конюги — *Aethia*

Мелкие чистиковые с очень коротким толстым клювом, ярко-красным — летом и желто-бурым — зимой; белыми глазами и серовато-голубыми лапами. Некоторые виды летом имеют причудливые хохолки.

Гнездятся большими колониями в каменистых россыпях и трещинах скал, на большинстве колоний появляются, как правило, в сумерках и ночью. В кладке 1 белое яйцо.

Четыре вида.


Большая конюга
[354] — *Aethia*
cristatella
(Таблица 30)



Круглый год однотонной буровато-черной окраски, у взрослых над клювом длинный (особенно летом), свисающий вперед хохол, не заметный только в полете, за глазом узкая белая полоска.


Гнездится по берегам Охотского и Берингова морей, на Курилах и Командорах. Зимует у Северных Курил и Южного Сахалина. Голос — визгливый лай.

Малая конюга [355] —
Aethia *pygmaea*
(Таблица 30)



Черная со светлым брюшком, зимой горло и грудь сероватые. Летом над клювом тонкий свисающий хохол, у глаз по три пучка тонких длинных белых перьев, которые заметны и зимой, хотя короче.

Гнездится на островах Охотского моря, Курильских, Командорских и Монерон. Зимой встречается у Командор, Средних Курил, Южного Сахалина. Голос — громкий стон.




**Конюга-крошка [356] —
Aethia pusilla
(Таблица 30)**

Самый мелкий вид чистиковых (чуть больше воробья). Летом темная с белым горлом и подхвостьем,

серыми в пятнах брюшком и грудью. Зимой брюхо и плечевые перья (в отличие от люрика) белые. За глазом тонкая белая полоска, у основания клюва белые перышки, летом — короткий черный вырост над клювом. Полет более маневренный, чем у других чистиковых, стайки издали напоминают комариный рой.

Гнездится отдельными колониями на Восточной Чукотке, Охотском море, в частности, на острове Верхотурова в Каргинском заливе, на островах Ушишир в средней части Курил. Зимует от Командор до Южных Курил и Северного Приморья. Голос — тихое щебетание.




**Белобрюшка [357] —
Aethia psittacula
(Таблица 30)**

Размером чуть мельче голубя, клюв чуть вздернут. Спина темная, брюхо белое, за глазом белая полоска.

Плечевые перья темные. Гнездится на островах Охотского и Берингова морей, на Командорах и Северных Курилах, зимой встречается от Командор до Южных Курил и Северного Приморья. Голос — вибрирующий свист.

10.12.9. Род Тупики-носороги — *Cerorhinca*

Один редкий дальневосточный вид.



**Тупик-носорог [358] —
Cerorhinca monocerata
(Таблица 30)**

Размером с ворону, спина темно-бурая, брюхо светлое. Летом грудь бурая, за глазом и в углу рта пучки

тонких белых перьев, клюв красный с вертикальным желтым рогом у основания надклювья. Зимой грудь серая, клюв бурый. От молодых ипатов [360] зимой отличается менее высоким клювом и темными щеками, от молодых топорков [361] — клювом и светлыми глазами. Ноги желтоватые.

Гнездится в норах по берегам Приморья, на островах Монерон, Тюлений, Южных и, возможно, Средних Курильских, Шантарских. У гнезд появляется обычно ночью. В кладке 1 белое с сероватыми пятнами яйцо. Зимой может быть встречен у Южных Курил. Голос — гнусавое ворчание.


10.12.10. Род Тупики — *Fratercula*

Птицы размером с голубя, контрастной черно-белой окраски, с белыми (зимой сероватыми) щеками и очень высоким, сплюснутым с боков клювом. Летом лапы и углы рта ярко-красные, клюв ярко-желтый с алым кончиком. Над глазом небольшая кожистая лопасть. Зимой лапы желтые (у молодых птиц черные).

Гнездятся в норах, которые используются на протяжении многих лет, каменных россыпях, трещинах скал. В кладке 1 белое, иногда с сероватыми пятнами яйцо. Своеобразная форма клюва позволяет тупикам приносить птенцам по 10-20 рыбок сразу, экономя силы на дальних перелетах к местам кормежки в открытом море. Голос — глухое ворчание.


Два вида.

Тупик [359] —
Fratercula arctica
(Таблица 30)



Щеки с голубовато-серым оттенком, по бокам клюва серые пятна.

Обитает на Баренцевом и, в очень небольшом количестве, на Белом море. Зимой встречается на западном Мурмане.




Ипатка [360] —
Fratercula corniculata
(Таблица 30)

Летом щеки чисто-белые, бока клюва летом желтые, зимой буроватые.

Гнездится и зимует по берегам морей от острова Врангеля до Средних Курил и Северного Приморья.

10.12.11. Род Топорки — *Lunda*

Один дальневосточный вид.



Топорок [361] — *Lunda*
cirrhata
(Таблица 30)

Похож на тупиков, но окраска однотонно-бурая. Летом бока головы белые, за глазами пучки золотисто-желтых перьев. Зимой бока клюва бурые, за глазом светлое пятно. Молодые со светлым низом, от молодых ипаток отличаются желтым клювом.

Гнездится в норах по всему побережью Дальнего Востока, кроме Приморья, на острове Врангеля, зимой встречается от Командор до Южных Курил и Сахалина. В кладке 1 белое, иногда в бурых крапинках яйцо. Голос — глухое ворчание.

Гнездится в норах по всему побережью Дальнего Востока, кроме Приморья, на острове Врангеля, зимой встречается от Командор до Южных Курил и Сахалина. В кладке 1 белое, иногда в бурых крапинках яйцо. Голос — глухое ворчание.

Примечание. Многие орнитологи выделяют серого чибиса, украшенного чибиса, кречетку, белохвостую пигалицу, шпорцевого чибиса, хрустана, кулика-лопатня, перевозчиков, мородунку, пепельных улитов, белую чайку, малую чайку, вилохвостую чайку, розовую чайку, пестроносную крачку, чеграву, чайконосную крачку и белобрюшку в самостоятельные рода *Microsarcops*, *Lobivanellus*, *Chettusia*, *Vanellochettusia*, *Hoplopterus*, *Eudromias*, *Erythrorhynchus*, *Actitis*, *Xenus*, *Heteroscelus*, *Pagophila*, *Hydrocoloeus*, *Xema*, *Rhodostethia*, *Thalasseus*, *Hydroprogne*, *Gelochelidon* и *Cyclorhynchus*.

Иногда семейство Авдотковых относят к отряду Журавлеобразных (ряд особенностей строения сближает их с дрофами).

11. Отряд Голубеобразные — *Columbiformes*

Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой; потому что голос твой сладок и лице твое приятно.

Песни Песней Соломона.

Голубь издавна служит символом мира, а в христианстве — символом Святого духа, чистоты и непорочности. На самом же деле это довольно агрессивные друг к другу птицы, особенно самцы. Если двух голубей-самцов посадить в одну клетку, более сильный обычно забивает насмерть слабейшего, чего практически никогда не случается, например, у волков или ястребов.

Кроме голубей и горлиц, к этому отряду относятся похожие на них рябки. Все это чисто растительноядные птицы, плотного сложения, с короткими ногами и клювом, длинными острыми крыльями, быстрым маневренным полетом. Из птиц только голуби и рябки умеют пить воду, втягивая ее в себя, а не запрокидывая голову.

Два семейства.

11.1. Семейство Голубиные — *Columbidae*


Голуби и горлицы гнездятся в горах, лесах и населенных пунктах. Гнезда плоские, построены из небрежно уложенных прутьев и перьев. В кладке 2 белых яйца. Птенцы вылупляются беспомощными, покрытыми редким волосовидным пухом.

Первое время родители кормят их так называемым птичьим "молоком" — питательной жидкостью, выделяющейся в зобу. Взрослые птицы питаются преимущественно семенами растений.

В России три рода.

11.1.1. Род Голуби — *Columba*

Хвост прямой или слегка закругленный, с темной полосой по краю, лапы красные или розовые, основная окраска серо-сизая. В России 4-5 видов.



**Сизый голубь [362] —
Columba livia
(Таблица 31)**

Популяции этого вида можно условно разделить на "дикие" и "полудомашние". "Дикие" голуби сизые


с двумя темными полосками на крыле, серым хвостом, светлым надхвостьем и темным клювом. Гнездятся на обрывах, в скалах по северному берегу Азовского моря, на Кавказе и Южном Урале, возможно, на Алтае и в Саянском каньоне Енисея. "Полудомашние" голуби гнездятся в населенных пунктах, преимущественно с застройкой городского типа, повсюду в Европейской части России и Западной Сибири, в Забайкалье и на юге Дальнего Востока. Они очень изменчивы по окраске. Голос — воркование и низкое протяжное стонущее гудение: "ууу...ууу".

Мы привыкли к голубям и почти не обращаем на них внимания. Между тем это довольно красивая птица — мало кто еще обладает таким быстрым, уверенным полетом. Дух захватывает от стремительных виражей голубиных стаяк, независимо от того, лавируют ли они меж заснеженных скал или окутанных смогом небоскребов. В горах нередко приходится видеть, как голуби на огромной скорости с оглушительным свистом пикируют вдоль склона, снижаясь на тысячи метров за считанные секунды. Благодаря скорости и способности к ориентации одомашненные голуби издавна использовались как средство связи. Кроме почтовых, существуют также мясные и декоративные породы.

Высокая численность городских голубей создает массу проблем. Они переносят орнитоз и другие болезни, а их помет окисляет и разрушает памятники и архитектурные сооружения. За рубежом пытаются бороться с голубями, подкармливая их зерном, содержащим противозачаточные препараты.

У многих народов юга России и особенно зарубежной Азии сизый голубь — популярный объект спортивной охоты.

Скалистый голубь
[363] — *Columba*
rupestris
(Таблица 31)




Похож на сизого голубя, но хвост сверху с белым основанием и черной полосой по краю.

Гнездится на скалах в Южной Сибири от Алтая до Приморья, на обрывистых берегах Японского моря и Байкала, а также в населенных пунктах от Алтая до Приамурья, на Ангаре и верхней Лене. Полет еще более стремительный, чем у сизого голубя. Нередко встречается в горах выше снеговой линии, где легко справляется с ураганными ледяными ветрами. Воркование более высокого тона, чем у сизого голубя, с легким пощелкиванием.

Возможно, является предком некоторых домашних пород. В местах совместного обитания изредка встречаются гибриды сизого и скалистого голубей.

Клинтух [364] —
Columba oenas
(Таблица 31)




Похож на сизого голубя [362], но хвост одноцветный, надхвостье и нижняя сторона крыла снизу темные, клюв светлый, темные полосы на крыле менее резкие.

Гнездится в дуплах в смешанных и широколиственных лесах, старых парках на восток до Алтая. На пролете обычен на Кавказе. Во время пролета клинтухи иногда собираются огромными стаями. Несколько лет назад непогода заставила

несколько десятков тысяч голубей остановиться на летном поле одного из кавказских аэропортов, и движение самолетов было парализовано почти на неделю. Голос — громкое гудение "у-гу-гуу".

Местами объект охоты.

В районах, пограничных с Восточным Казахстаном, возможны встречи редкого **бурого голубя** — *Columba evermanni*, гнездящегося в зарубежной Азии. Он похож на клинтуха, но отличается буроватой окраской, темно-бурым надхвостьем, желтым кончиком клюва, крыло снизу белое.



Вяхрь [365] —
Columba palumbus
(Таблица 31)


Заметно крупнее других голубей. На крыле, а у взрослых птиц также на боках шеи яркие белые пятна, клюв желтый, грудь розоватая, хвост снизу с белой поперечной полосой.

Гнездится в глухих лесах, реже в больших парках на восток до Томска, на пролете встречается в степных лесополосах. Голос — громкое трех-пятисложное гудение, передаваемое словами: "ни-ки-ту...ни-ки-ту...ви-дел..." Местами объект охоты.

В Южное Приморье, возможно, залетает **японский вяхрь** — *Columba janthina*, размером больше сизого голубя, почти черный с зеленым отливом, ноги красные.

11.1.2. Род Зеленые голуби — *Treron*

В России один перелетный дальневосточный вид.



Зеленый голубь [366] —
Treron sieboldii
(Таблица 31)

Легко узнается по окраске, зеленой сверху, желтоватой снизу, крылья темные с красноватым перед-


ним краем, брюшко белое.

Гнездится на западном берегу острова Кунашир и, вероятно, на юге Приморья и Сахалина в лиственных лесах. Голос — громкий гудящий вой "аах-оох-оох..." Занесен в Красную книгу России.

11.1.3. Род Горлицы — *Streptopelia*

Мельче и изящней, чем голуби, хвост сильно закругленный или клиновидный. Крайние рулевые перья с белыми вершинами, лапы красные. В России четыре вида, все перелетные, кроме кольчатой горлицы.


Обыкновенная горлица
[367] — *Streptopelia*
turtur
(Таблица 31)



Спинная сторона бурая с чешуйчатым рисунком, брюхо серовато-розовое, хвост черный с белой полосой по краю. У взрослых птиц на шее косые черные и белые полосы.


Гнездится в лесах, садах и парках на восток до Урала. Голос — двусложное воркование "турр-турр".

Большая горлица
[368] — *Streptopelia*
orientalis
(Таблица 31)



Очень похожа на обыкновенную горлицу, но немного крупнее (мельче сизого голубя), темнее, зоб охристый, хвост с серым задним краем.

Гнездится в лесах и лесостепях от Южного Урала до Курильских островов. Голос — отрывистое двусложное гудение, напоминающее голос вяхири. Местами объект охоты.



Кольчатая горлица
[369] — *Streptopelia*
decaocto
 (Таблица 31)

Однотонной серовато-розовой окраски, с узким черным полукольцом на шее, длинным широким хвостом. Еще в начале XX века кольчатая горлица встречалась только в Средиземноморье. Затем начала быстро расселяться и теперь гнездится в населенных пунктах запада России, постепенно продвигаясь к востоку. Залетает в Хабаровский край. В отличие от сизого голубя, который переселился в города из скал и высокогорий, кольчатая горлица — изначально обитатель разреженных лесов. Поэтому она предпочитает самые зеленые улицы, бульвары и скверы. Голос — трехсложное воркование. В полете иногда издает визгливый крик, не похожий на голос других горлиц.

На юг Дальнего Востока залетает **короткохвостая горлица — *Streptopelia tranquebarica* [370]**, гнездящаяся в Южной и Юго-Восточной Азии, мелкая (со скворца), однотонной красноватой окраски с сизой головой, черно-белым полужою и боками хвоста, белым подхвостом.

В населенных пунктах Алтайского края может появиться **малая горлица — *Streptopelia senegalensis* (Таблица 31)**, размером со скворца, однотонно-песочная сверху, серовато-розовая снизу, с рыже-черными пятнами по бокам шеи, которая в последние годы быстро расселяется в Восточном Казахстане. Этот вид был случайно завезен в некоторые города Европейской части России, и, возможно, прижился.

11.2. Семейство Рябковые — *Pterocletidae*

Похожи на коротконогих голубей рыжеватой окраски с длинным острым хвостом и очень коротким клювом. Цевка оперена до пальцев.


Гнездятся на земле в сухих степях и пустынях, в кладке 2-3 пестрых яйца. Птенцы вылупляются покрытыми бурым пухом, но почти сразу покидают гнездо и линяют, становясь пятнистыми. Питаются семенами и насекомыми. Самцы некоторых видов приносят птенцам воду на уплощен-

ных перьях груди. При приближении человека к гнезду или птенцам самка "отводит" его, бегая с опущенным крылом.

В России три редких малоизученных вида, нуждающихся в охране.

11.2.1. Род Саджи — *Syrrhaptes*

Саджа [371] —
Syrrhaptes paradoxus
(Таблица 31)




Хвост на конце вытянут в нить длиной больше 10 см, на лапе три сросшихся пальца образуют нечто вроде копытца для ходьбы по горячей твердой степной почве. Верх песчано-охристый с черным поперечным рисунком, лоб рыжий. У самца брюшко с черным пятном, горло рыжее; у самки брюшко буроватое, горло серое. Крыло снизу светлое. У молодых хвост не удлинен, на зубу поперечный рисунок.

Гнездится и зимует в Чуйской степи, Туве и, возможно, Забайкалье и Нижнем Поволжье в степях и полупустынях. Раз в несколько десятилетий большими стаями залетает в Среднюю полосу и Приморье, где придерживается открытых мест, особенно песчаных, иногда пытается гнездиться, но потом исчезает. Голос — мелодичное "тень-тень".

11.2.2. Род Рябки — *Pterocles*

Хвост заостренный. Верх желто-бурый с темным рисунком, горло у самцов желтое с черным, у самок белое. Крыло снизу темное. Пальцы не сросшиеся. Гнездятся в полупустынях и пустынях. Перелетные птицы.

Чернобрюхий рябок
[372] — *Pterocles*
orientalis
(Таблица 31)



Брюхо и подхвостье черные, грудь светлая с черной поперечной полоской.

Изредка гнездится в местах с плотной почвой в Нижнем Поволжье, Прикаспии и на реке Урал. Птенцы, покинув гнездо, сразу переходят на песчаные участки. Голос — двухсложное журчание.

В Поволжье и район Оренбурга залетает белобрюхий рябок — *Pterocles alchata* [373], (Таблица 31). Брюхо и подхвостье белые, грудь рыжая с двумя черными полосками, через глаз темная полоска, хвост на конце вытянут в короткую (до 5 см) нить. Голос — гнусавое кряканье.

12. Отряд Кукушкообразные — *Cuculiformes*

— Что плачешь, кукушечка?
Что грустишь, бедная?
— Плачу я по малым деточкам,
При живой матери подкидышам...

Поморская народная песня.

Небольшие перелетные птицы с длинными широкими хвостом и крыльями. Два пальца на ноге направлены вперед, два назад.

Виды, встречающиеся в России, питаются преимущественно крупными волосатыми гусеницами. Поскольку такой грубый ядовитый корм непригоден для выкармливания птенцов, кукушки приспособились подбрасывать яйца в гнезда других птиц. Внешне кукушки похожи на мелких ястребов, от которых отличаются прямым клювом и ступенчатым хвостом. Мелкие птицы, приняв их за ястреба-перепелятника, вылетают навстречу, чтобы отогнать от гнезд, и тем выдают их расположение.

Птенец вылупляется слепым и голым, но на следующий же день выбрасывает из гнезда остальных птенцов и яйца. Если по каким-то причинам они все же остаются в гнезде, "инстинкт выбрасывания" в кукушонке вскоре угасает, но птенцы хозяев гнезда обычно все равно погибают от голода. Дело в том, что мелкие воробьиные птицы кормят только желторотых птенцов, а у кукушонка рот шире и более ярко окрашен, поэтому он получает больше корма и быстрее растет.

Интересно, что кукушки американских видов в основном выкармливают птенцов сами. Поэтому в названии известной

книги и фильма "Полет над гнездом кукушки" нет никакого противоречия.


Желудок кукушки изнутри покрыт специальной толстой пленкой, в которой застревают ядовитые волоски гусениц. Время от времени эта пленка отслаивается, и кукушка отгивает ее вместе с волосками. При вспышках размножения непарного и сибирского шелкопрядов, монашенки и других вредителей леса кукушки сотнями слетаются на пораженные участки. Кроме кукушек, почти никто из наших птиц этих гусениц не ест.

В нашей стране пять видов, из которых в средней полосе и на юге Европейской части встречается только обыкновенная кукушка [374].

12.1. Семейство Кукушковые — *Cuculidae*

12.1.1. Род Кукушки — *Cuculus*

Окраска серая, грудь и брюшко белые с черными поперечными полосками. Самки иногда бывают сплошь рыжими с поперечным рисунком. Хвост у сидящей птицы обычно приподнят. Различаются лучше всего по голосу.



Обыкновенная кукушка [374] — *Cuculus canorus*
(Таблица 34)

Немного мельче голубя. На сгибе крыла есть белые перья с черными полосками. Хвост с белым кончиком, у рыжих самок — с темной полосой по краю.


Обитает по всей стране от южных тундр до полупустынь в лесах, кустарниках, горных стланиках. Подкладывает яйца в гнезда многих видов мелких воробьиных птиц. Самки относятся к нескольким наследственным линиям, каждая из которых связана с определенным видом-хозяином и откладывает яйца соответствующей окраски.

Голос самца — двусложное кукование, самки — звонкая трель. Кукушка редко кукует больше десяти раз подряд, поэтому спрашивать у нее, сколько лет вам осталось жить, не рекомендуется.

Глухая кукушка
[375] — *Cuculus*
saturatus

Внешне почти неотличима от обыкновенной кукушки, но чуть темнее, на сгибе крыла чисто-белые перышки, темные полосы на груди немного шире.


Встречается в высокоствольных лесах, реже в лесотундре и лесостепных сосновых борах от Предуралья до Курильских островов, реже на севере Европейской части России. Яйца подкладывает в гнезда пеночек. Голос самца — глухое, монотонное, обычно трехсложное "ду-ду-ду", самки — резкий отрывистый крик.



Индийская кукушка
[376] — *Cuculus*
micropterus
 (Таблица 34)


Очень похожа на обыкновенную и особенно глухую кукушек, но рыжей не бывает (спина изредка с рыжими пестринами), верх (кроме головы) буроватый, по краю хвоста широкая черная полоса, темные полосы на груди шире.

Встречается в широколиственных и светлохвойных лесах юга Дальнего Востока. Яйца подкладывает в гнезда сибирского жулана [468]. Голос — четырехсложное "ха-ха-ха-хо" с более тихим последним слогом.



Малая кукушка [377] —
Cuculus poliocephalus
 (Таблица 34)


Размером немного крупнее скворца, крылья и хвост темные с белыми пятнышками, брюшко и грудь с широкими черными полосами, белых перьев на сгибе крыла нет. Молодые желтоватые с белыми пятнами на затылке.



Встречается на юге Приморья и Южных Курилах. Яйца подкладывает в гнезда короткокрылой широкохвостки [609]. Голос — громкий пятисложный свист, причем 4-й слог выше других, а 5-й ниже.

12.1.2. Род Широкрылые кукушки — *Hierocossux*

В России 1 дальневосточный вид.



Широкрылая кукушка
[378] — *Hierocossux*
fugax
(Таблица 34)

Сверху темно-серая со светлыми пятнами на шее, подбородок черный, низ у самцов розовато-рыжий, у самок белый с темными продольными пестринами. Хвост с темными поперечными полосами и рыжим кончиком. На ветке обычно сидит вертикально.

Встречается в лесах Приамурья и Приморья, подкладывает яйца преимущественно в гнезда синего соловья [556]. Голос — "жю-ичи...жю-ичи" слышен чаще в полете.

13. Отряд Совообразные – *Strigiformes*

Нами доподлинно установлено, что в каждом доме, под кровлей коего находили приют совы, жила ведьма или колдун. Сии сатанинские птицы неизменно сопровождают нечистую силу и жутким криком своим оглашают богомерзкие шабаши. Ежели в каком-либо месте часто видят сов, сие верный признак близких происков Врага рода человеческого...

*Якоб Шпренглер, Готфрид Иститорис.
Молот ведьм.*

Хотя внешний вид сов действительно необычен и может показаться зловещим, он связан с их своеобразным образом жизни. Это хищные птицы, охотящиеся в основном ночью и в сумерках. Крылья широкие, закругленные, клюв и когти острые, изогнутые. Оперение головы образует круглое "лицо", глаза направлены вперед.

Слух сов и их способность видеть в темноте уникальны. Одинаково хорошо видят днем и ночью. Прекрасно слышат и могут охотиться на слух, например, на бегающих под неглубоким снегом мышей. Барабанные перепонки очень большие и повернуты в разных плоскостях, что, вероятно, позволяет совам более точно устанавливать местонахождение источника звука (они определяют его с точностью до 1/10 градуса). Шея очень подвижная, совы могут поворачивать голову более чем на 360 градусов.

Оперение очень мягкое, у большинства видов на маховых перьях специальные зубчики, благодаря которым полет со-

вершенно бесшумный. Некоторые имеют перьевые "ушки" на голове, но они видны только днем, а ночью опускаются.

В кладке 2-8 круглых белых яиц. Птенцы вылупляются слепыми, покрытыми белым пухом. Самка начинает насиживание сразу после откладки первого яйца, поэтому все птенцы обычно разного возраста, как и у дневных хищных птиц.

Питаются в основном грызунами, мелкие виды — насекомыми.

Крики сов придают особое колдовское очарование нашим лесам, особенно ранней весной, когда многие виды поют одновременно. Совы нуждаются в охране, прежде всего филины и другие крупные виды.


В России два семейства.

13.1. Семейство Совиные — *Strigidae*

Включает всех наших сов, кроме одного вида, гнездящегося в Калининградской области. "Лицо" круглое, снизу не заостренное. В России 11 родов.

13.1.1. Род Филины — *Bubo*

В России один редкий вид.



Филин [379] — *Bubo bubo*
(Таблица 32)

Очень крупная сова (размах крыльев до 2 метров), с длинными темными "ушками". Окраска от темно-

рыжей до золотисто-охристой, с резкими продольными черными пестринами, на боках и брюхе темный поперечный рисунок. В Западной Сибири встречаются огромные, почти (но не совсем) белые птицы, в степях — менее крупные, глинисто-желтые. Пальцы оперены, глаза красновато-оранжевые. Полет бесшумный, несмотря на размеры.

Ранее гнезился повсюду южнее тундры, сейчас в большинстве районов страны стал редок или исчез. Гнезда на земле в глухих лесах, на скалах в горных ущельях, в оврагах и развалинах в степи. Гнездовой сезон начинается очень ра-

но. в феврале. Зимой часть птиц, особенно молодых, откочевывает к югу. Питается грызунами, а также птицами, зайцами. Голос — громкое глухое "у-гуух" с ударением на второй слог, иногда раскатистый хохот, один из самых эффектных звуков ночного весеннего леса.


Эта великолепная птица нуждается в строгой охране, особенно последние пары, сохранившиеся в европейской части страны. Занесен в Красную книгу России.

На севере Дальнего Востока возможны встречи **американского филина** — *Bubo virginianus*. Он несколько мельче, более темной окраски, на груди только поперечные пестрины.

13.1.2. Род Рыбные совы — *Ketupa*

В России один редкий вид.

Рыбный филин [380] —
Ketupa blakistoni
(Таблица 32)



Похож на филина, но "ушки" светлые, лохматые, треугольные, окраска более однотонная, "лицо" темное, пальцы не оперены, глаза желтые, полет более шумный.

Гнездится на Дальнем Востоке к северу почти до Магадана. Гнезда в дуплах старых деревьев. Держится в поймах незамерзающих рек, там же и зимует. Питается рыбой, раками, лягушками, которых ловит, бродя по мелководью, или хватая с лета. Голос рыбного филина очень разнообразен. Призывный крик самца — низкое, могучее, постепенно затихающее гудение. Иногда удастся услышать так называемое антифональное пение, когда самец и самка кричат по очереди таким образом, что кажется, будто ухает одна птица. Издает также резкий дребезжащий свист.

Стал очень редким из-за освоения речных долин, занесен в Красную книгу России. Разрабатываются методы разведения в неволе и последующего выпуска в природу.

13.1.3. Род Белые совы — *Nyctea*

Один вид.



Белая сова [381] —
Nyctea scandiaca
(Таблица 32)

Размах крыльев до 1,5 м. Взрослые самцы чисто-белые, самки и молодые с резкими черными пестринами. "Ушек" нет, глаза желтые. Полет легкий, скользящий, с глубокими взмахами длинных крыльев.

Гнездится на земле по всей тундровой зоне, на многих островах Арктики и Командорах, зимой может быть встречена по всей стране. В тундре питается в основном леммингами, южнее — другими грызунами, охотится также на птиц. Активна круглые сутки. Голос — звонкий клекот.


Некоторые народы Севера называют белую сову "гусиным пастухом", потому что гуси и особенно казарки часто селятся по соседству с ее гнездом, используя сову в качестве защитника от песцов, бродячих собак. Даже на человека она бесстрашно пикирует, если он приближается к гнезду, и может ударить когтями.

13.1.4. Род Неясыти — *Strix*

Крупные лесные совы без "ушек". Окраска серая (изредка рыжая) с продольными пестринами. Полет настолько бесшумный, что птицы напоминают гигантских ночных бабочек. Крыло снизу светлое без темного пятна на сгибе. Пальцы оперены, клюв светлый. Птицы часто яростно защищают гнездо от человека, и несколько ученых-зоологов уже лишились глаз при попытке исследовать биологию неясытей.

Гнездятся в старых гнездах дневных хищных птиц, в дуплах. Питаются в основном мелкими грызунами.

В России три вида.




Бородатая неясыть
[382] — *Strix nebulosa*
(Таблица 32)

Очень крупная (размах крыльев до полутора метров), большеголовая, дымчато-серая без рыжих тонов

в окраске сова. Вокруг желтых глаз темные круговые полосы, похожие на рисунок колец на спиле дерева, под клювом черное пятно. В полете отличается от филина полосатой нижней стороной крыла. Охотится вечером и ночью.

Гнездится в основном в перестойной тайге с болотами, гарями, пустошами, иногда в горных лесах от Кольского п-ова до гор Приморья, зимой изредка появляется в Средней полосе. Яйца откладывает в старые гнезда ястребов и канюков. Голос — громкое трубное гудение, причем каждое "вуу" по тону ниже предыдущего; по силе и красоте не уступает голосу филина.


Длиннохвостая неясыть
[383] — *Strix uralensis*
(Таблица 32)



Крупная серая сова (размах крыльев чуть больше метра) с длинным, клиновидным полосатым хвостом и небольшими черными глазами. "Лицо" серое, одноцветное, на груди рисунок из продольных пестрин. Охотится ночью, изредка в сумерках.

Гнездится в высокоствольных смешанных лесах почти по всей лесной зоне, во многих местах — самая обычная из крупных сов. Особенно много ее в Приморье. Использует старые гнезда хищных птиц или большие полудупла. Зимой кочует. Голос — протяжное лающее гудение "хау-хау-хау" и низкое двусложное уханье "ху-буу".

Серая неясыть [384] —
Strix aluco
(Таблица 32)



Серая или рыжая сова среднего размера (размах крыльев до метра), с коротким закругленным хвостом и большими черными глазами. На груди продольные черные пестрины, перечеркнутые тонкими поперечными штрихами. На плечах обычно белые пятна. Охотится только ночью.

Гнездится ранней весной в смешанных и широколиственных лесах, старых парках, иногда в городах Европейской


части России, Зауралья, Кавказа. Зимой из лесов часто перекочевывает в окрестности населенных пунктов. Голос самки — долгая раскатистая басовая трель, издали напоминающая отдаленный гудок поезда, самца — высокое "кувитт".

13.1.5. Род Ушастые совы — *Asio*

Среднего размера рыжеватые совы с черными пятнами вокруг глаз и темным клювом. Крылья довольно длинные (размах до метра), снизу светлые с темным пятном на сгибе, лапы оперены до когтей.

Питаются преимущественно мелкими грызунами. На пролете иногда собираются в небольшие стайки. Сравнительно молчаливы, голос бывает слышен в основном ранней весной.


В России два вида.



Ушастая сова [385] —
Asio otus
(Таблица 33)

Спинная сторона серовато-бурая, брюхо рыжее или желтоватое, с продольными и мелкими поперечными полосами, "ушки" длинные, глаза оранжевые. На ветке сидит вертикально. Охотится в основном ночью.

Гнездится в старых гнездах ворон и хищных птиц, реже в дуплах на большей части лесной зоны, изредка по окраинам населенных пунктов, в горах и лесостепях, на пролете обычна в степных лесополосах. Когда-то встречалась также в городских парках, но исчезла из-за повышения численности ворон, которые упорно преследуют ее и часто забивают насмерть. Голос — жалобное гулкое уханье, свист и скулящие крики.



Болотная сова [386] —
Asio flammeus
(Таблица 33)

Верх рыжевато-бурый, низ светлый с узкими продольными пестринами. "Ушки" очень маленькие, едва

заметные, глаза желтые. На деревья не садится, отдыхает на земле. Чаше всего попадает на глаза, когда в сумерках скользит над болотами на бреющем полете, приподняв крылья, как лунь. Охотится в основном утром и вечером, иногда днем.

Гнездится на земле в открытых местах: по болотам, в долинах рек, на лугах почти всюду от тундр до степей, на равнинах и в горах. Зимой встречается в степях. Голос — глухая барабанная дробь.

13.1.6. Род Ястребиные совы — *Surnia*

Один вид.

Ястребиная сова
[387] — *Surnia ulula*
(Таблица 33)



Среднего размера (размах крыльев 60-70 см) длиннохвостая сова, сверху шоколадно-бурая с белыми пятнами, снизу почти белая с резкими тонкими поперечными полосками. Глаза и клюв желтые, "ушек" нет. Полет быстрый, прямолинейный, обычно невысоко над землей. Чаше всего попадает на глаза, когда одиноко сидит на верхушках елей или лиственниц, высматривая добычу. Охотится преимущественно в сумерках и днем.

Обычна в низкоствольных лесах по всей зоне тайги, особенно на севере страны, зимой появляется на кочевках в смешанных лесах. Гнездится в старых гнездах других птиц в разреженной тайге и лесотундре, зимой встречается по всей лесной зоне. В суровые зимы порой залетает в населенные пункты, где гоняется среди бела дня за воробьями. В основном же питается мелкими грызунами и лишь изредка птицами. Голос — длинная щебечущая трель.


13.1.7. Род Совки — *Otus*

Мелкие короткохвостые лесные совы, днем с треугольными "ушками", продольным рисунком на груди, желтыми,

реже оранжевыми глазами и неоперенными пальцами. Голова меньше и более округлая, чем у сычей [392-394]. На груди мелкий рисунок из продольных и очень тонких поперечных пестрин (у сычей — размытые продольные пятна).

Гнездятся в дуплах, реже в старых гнездах сорок и ворон. Питаются крупными насекомыми и грызунами. Там, где живут совки, их часто можно увидеть ночью под яркими фонарями на окраинах лесных поселков, где они ловят слетевшихся на свет бабочек.

В России три вида.




Сплюшка [388] — *Otus scops*
(Таблица 33)

Серая или буроватая, глаза желтые. "Лицо" не ограничено снизу темной полосой (в отличие от мохноного сына).

Длина тела всего около 20 см.

Гнездится в смешанных и широколиственных лесах, реже в южной тайге, садах и парках на восток до Байкала. Обычна на Кавказе. Перелетный вид. Голос — тихое, печальное свистящее "сплю-ю". Кинематографисты, особенно индийские, часто используют запись этого крика при озвучивании ночных эпизодов в приключенческих фильмах.




Уссурийская совка [389] — *Otus sunia*
(Таблица 33)

Серая или рыжеватая, очень похожа на сплюшку, но пестрины менее яркие, цевка оперена только до по-

ловины.

Гнездится в лиственных и смешанных лесах, деревнях и поселках Приамурья, Приморья и Южных Курил. Перелетный вид. Голос — мелодичный двусложный свист "ке-вюю" или громкое "клок-клок-клок".

Ошейниковая сова
[390] — *Otus bakkamoena*
 (Таблица 33)




Крупнее других совов (длиной около 25 см), темно-коричневая с рыжеватыми пятнами, на затылке большое светлое пятно, "ушки" днем очень длинные, глаза оранжевые, пальцы оперены. "Лицо" часто ограничено снизу черной полосой.

Гнездится в лесах Приморья, Южного Приамурья и Южных Курил, зимой в поисках грызунов часто залетает в поселки. Голос — монотонное двусложное уханье.

13.1.8. Род Иглоногие совы — *Ninox*

В России один перелетный дальневосточный вид.

Северная иглоногая сова
[391] — *Ninox scutulata*
 (Таблица 33)




Мелкая длиннохвостая сова без "ушек", в полете несколько похожая на мелких соколов. Окраска темная, шоколадно-бурая, хвост с поперечными полосами, низ светлый с коричневыми каплевидными пятнами, "лицо" темное с белым пятном у клюва, глаза желтые.

Гнездится на юге Хабаровского и Приморского краев и, возможно, на острове Кунашир в смешанных и широколиственных лесах. Гнезда в дуплах. Охотится после захода солнца на крупных насекомых, под утро — на мелких птиц, грызунов, летучих мышей. Голос — быстрое непрерывное двусложное уханье.

Занесена в Красную книгу России.

13.1.9. Род Мохноногие сычи — *Aegolius*

В России один вид.



Мохноногий сыч
[392] — *Aegolius*
funereus
(Таблица 33)


Мелкая лесная сова, короткохвостая и большеголовая, с густо оперенными

пальцами. "Ушек" нет, но над глазами выступы "лица", похожие на вздернутые черные брови. "Лицо" белое с черной каймой снизу. Верх темный со светлыми крапинами, низ светлый с размытыми темными пестринами. Охотится ночью и в сумерках, днем — только полярным летом на Севере.

Гнездится в дуплах (преимущественно выдолбленных желной) в хвойных лесах почти по всей таежной зоне. Обычен, но редко попадает на глаза. Зимой кочует в зависимости от количества грызунов, часто в окрестностях населенных пунктов. Питается мелкими грызунами и птицами. Голос — быстрая низкая свистовая трель, повышающаяся к концу, несколько похожая на звон капли.

13.1.10. Род Сычи — *Athene*

В России один вид.



Домовый сыч [393] —
Athene noctua.
(Таблица 33)

Мелкая сова, отличается от мохноногого сыча более светлой окраской и светло-бурым "лицом", не отграни-

ченным от шеи и груди. Голова большая, приплюснутая, сверху со светлыми пестринами, пальцы оперены. Сидя, иногда покачивает хвостом, особенно при виде человека.


Гнездится в южной половине Европейской части России, на Кавказе, крайнем юге Сибири, в лесостепях и степях, изредка на юге лесной зоны, там же и зимует. Гнезда в различных укрытиях, норах, трещинах стен. Часто встречается в поселках, сидит днем на столбах и проводах. Питается грызунами, крупными насекомыми, ящерицами. Голос — свист и своеобразный лай.

В древности служил у многих народов символом мудрости.

13.1.11. Род Сычики — *Glaucidium*

В России один вид.

Воробьиный сычик
[394] — *Glaucidium*
passerinum
(Таблица 33)



Очень мелкая (со скворца) сова с большой, чуть приплюснутой головой. "Лицо" с темными круговыми полосками, верх бурый в светлых крапинках, хвост со светлыми поперечными полосками, низ светлый с темными пестринами. Полет порхающий, летящая птица время от времени на секунду складывает крылья. Человека почти не боится. Сидя, часто подергивает приподнятым хвостом. Охотится в основном вечером и утром.


Распространен на большей части лесной зоны России. Гнездится в дуплах в густых темнохвойных лесах. Зимой иногда появляется в смешанных лесах, но чаще держится вблизи от гнездового участка. Питается грызунами, землеройками, реже мелкими птицами. Под жилым дуплом воробьиного сыча всегда масса остатков его добычи — шкурки полевок, перья птиц. Голос — печальный свист.

13.2. Семейство Сипуховые — *Tytonidae*

В России один редкий вид.

13.2.1. Род Сипухи — *Tyto*

Обыкновенная сипуха
[395] — *Tyto* *alba*
(Таблица 33)



Небольшая светлоокрашенная сова с сердцевидным "лицом", черными глазами. Верх песочный с темными

и белыми крапинами, низ почти белый (изредка желтый) с темными точками. Крыло снизу палево-белое без темного пятна на сгибе.

Гнездится и зимует в населенных пунктах Калининградской области на чердаках, в нишах стен, изредка в дуплах. Питается в основном грызунами. Голос — сильное шипящее дребезжание.

14. Отряд Козодоеобразные — *Caprimulgiformes*

Ночная птица бесшумно пронеслась мимо, едва не задев меня крылом. Я вздрогнул, и слова древнего манускрипта пришли мне на память: "Настает время ночи, когда силы зла властвуют безраздельно..."

Артур Конан Дойл. Собака Баскервилей.


Небольшие ночные птицы с мягким охристо-серым оперением. Клюв маленький, но разрез рта очень широкий, с жесткими щетинками по краям, таким ртом козодои, как сачком, ловят на лету мелких насекомых. Крылья настолько длинные, что в полете птицы несколько похожи на больших ласточек. Хвост длинный и широкий, полет маневренный и бесшумный. Глаза большие, черные; ноги очень короткие, так что птицы почти не могут ходить, а на ветки садятся не поперек, а вдоль. Шея очень короткая.

Гнездятся на полянах и опушках, откладывая два серых с темным мраморным рисунком яйца прямо на землю. Птенцы рождаются зрячими, покрытыми пухом, но долгое время остаются в "гнезде". День козодои проводят, затаившись на земле или толстой ветке. Они часто ловят комаров вокруг пасущегося скота. Из-за этой привычки и огромного рта птиц во многих странах возникло поверье, что они пьют по ночам молоко коров и коз. Своеобразное устройство рта привлекло к ним также внимание средневековых живописцев: например, на некоторых картинах Иеронима Босха дьявол изображен с головой козодоя.

В России два перелетных вида, отличающихся в основном по голосу.

14.1. Семейство Козодоевые — *Caprimulgidae*

14.1.1. Род Козодой — *Caprimulgus*




Обыкновенный козодой
[396] — *Caprimulgus*
europaeus
(Таблица 34)

Хвост с двумя большими пятнами, белыми у самцов и рыжими у самок. Крыло

снизу с яркими рыжими полосами.

Гнездится в смешанных и лиственных лесах и в кустарниках на восток до Забайкалья. В последние годы найдены места гнездования в ивниках по берегам горных рек близ Тынды и в "пепловых пустынях" Камчатки. Голос — монотонное жужжащее стрекотание, похожее на треск электрического движка. Иногда в полете громко хлопает крыльями.



Большой козодой
[397] — *Caprimulgus*
indicus
(Таблица 34)

Чуть темнее обыкновенного козодоя, хвост с черной полосой по самому краю,

белые пятна на нем почти сливаются в поперечную полосу, рыжие полоски снизу на крыле почти незаметны.

Гнездится от Забайкалья до Южных Курил. Голос — громкое свистящее тиканье.

В Прикаспии может быть встречен обитающий в зарубежной Азии и Африке буланный козодой — *Caprimulgus aegyptius* (Таблица 34), отличающийся песочной окраской без резких белых пятен и пестрин. Голос — быстрое металлическое "кре-кре-кре".

15. Отряд Стрижеобразные — *Apodiformes*

Кто поднялся в небо и живет полетом, никогда уже не сможет спокойно ходить по земле.

*Антуан де Сент-Экзюпери.
Южный почтовый.*

Стрижи и колибри — мелкие перелетные птицы с очень короткими лапками и узкими крыльями. При летних похолоданиях взрослые откочевывают к югу, а птенцы впадают в спячку. Хотя сотни стрижей каждое лето носятся над нашими головами, мало кто знает, что это одна из самых удивительных птиц с уникальной биологией. А то, что в нашей стране можно увидеть колибри, было сюрпризом даже для специалистов-орнитологов.

В России два семейства, из которых в Европейской части встречается только черный стриж [398].

15.1. Семейство Стрижиные — *Apodidae*

Стрижи похожи на ласточек [426-433], но заметно крупнее, с очень длинными, узкими, серповидно изогнутыми крыльями. Полет очень быстрый, скользящий. Приспособлены к питанию так называемым воздушным планктоном — очень мелкими летающими насекомыми, поэтому имеют короткий клюв и широкий разрез рта. Ноги совсем маленькие, так что стрижи не могут взлетать с земли. Если птица все же оказывается на земле, ей приходится ползти до ближайшей

стены или дерева, чтобы снова взлететь. Зато в воздухе стрижи не имеют себе равных по скорости и выносливости, поскольку проводят в полете почти всю жизнь.


Гнездятся под крышами, в трещинах скал и дуплах. Материал для гнезда — пух и перья — собирают в воздухе, спят и спариваются также на лету. Увидеть молниеносное спаривание летящих стрижей нетрудно — надо лишь некоторое время понаблюдать за стайками птиц в конце мая — начале июня. А вот спящих стрижей приходилось видеть немногим. Если летней ночью подняться на самолете на высоту 3-4 тысячи метров и тихо лететь над городом с выключенным мотором, можно найти стаю спящих стрижей. Птицы плавно скользят в воздухе, каждые несколько секунд просыпаясь для нескольких взмахов крыльями.

За время выкармливания птенцов стрижи пролетают расстояние, превышающее длину земного экватора. В кладке 2-3 белых яйца. Птенцы вылупляются слепыми и голыми. Родители часто бросают их, улетаая на юг первыми, и птенцы, вылетев из гнезда, самостоятельно находят путь к далеким местам зимовок в Южном полушарии.

В России четыре вида.

15.1.1. Род Стрижи — *Apus*

Хвост вильчатый, окраска тускло-черная или бурая, все 4 пальца на лапе направлены вперед. Голос — резкое "скрип".



Черный стриж [398] —
Apus apus
(Таблица 36)


Весь черный с белым горлом.

Гнездится в городах и поселках, реже в высокоствольных лесах почти всюду на восток до Забайкалья. На севере страны — почти исключительно городской вид, в Забайкалье — только лесной. В Москве и других больших городах черный стриж — практически единственная птица, истребляющая комаров, тополевую моль и других мелких насекомых.

Белоносы́ый стри́ж
[399] — *Apus pacificus*
 (Таблица 36)

Черный с белым надхвостом и горлом.


Гнездится в городах и поселках, на скалах и изредка в дуплах от Алтая до Курил и Камчатки, в том числе по обрывистым берегам морей и Байкала.



Белобрюхий стри́ж
[400] — *Apus melba*
 (Таблица 36)

Самый крупный из наших стрижей, сверху глинисто-бурый, снизу белый с широкой темной полосой поперек груди. Окраской напоминает ласточку-береговушку [432], но почти вдвое больше, вырез на хвосте глубже.


Гнездится в скалах Кавказа до высоты 1500 м над уровнем моря.



15.1.2. Род Колючехвостые стрижи — *Hirundapus*

Колючехвостый стри́ж
[401] — *Hirundapus*
caudacutus
 (Таблица 36)

Крупный стри́ж с прямым хвостом, стержни хвостовых перьев выступают в виде острых иголок. Коричнево-бурый с белым горлом и подхвостом, белыми пятнами сверху у основания крыльев. Хвост и крылья темные с сине-зеленым блеском. На лапе три пальца направлены вперед, один — назад. Полет такой быстрый, что слышно гудение рассекаемого воздуха.



Гнездится в лесах юга Сибири и Дальнего Востока в дуплах высоких деревьев. Голос — тихий визг.

15.2. Семейство Колибри — *Trochilidae*

Крошечные птички с широким хвостом и длинным, загнутым вниз клювом. В полете могут с тихим гудением зависать на одном месте. Питаются нектаром цветов и мелкими насекомыми. Крылья колибри работают несколько по-другому, чем у других птиц: механизм их действия напоминает скорее полет вертолета.

На остров Ратманова в Беринговом проливе и, возможно, на Чукотку залетает **охристый колибри** — *Selasphorus rufus* [402], (Таблица 44), гнездящийся на западе Северной Америки. Самец рыжий с зелеными крыльями, самка зеленая с беловатым горлом и крыльями, рыжими боками и черными пятнами на хвосте. Голос — тихое щебетание, полет стремительный, сопровождается жужжащим звуком.

16. Отряд Ракшеобразные – *Coraciiformes*

Когда мне было пять лет, я нашел у реки перо зимородка. Никогда не видел я ничего столь же яркого! Перо казалось занесенным из других, волшебных стран. С тех самых пор в наших скучных северных краях мне мучительно не хватало настоящих красок.

Поль Гоген. Острова Южных морей.

Небольшие перелетные птицы разнообразного сложения, очень ярко окрашенные. Питаются мелким животным кормом. Обычны в степях и лесостепях. Гнездятся в дуплах и норах, иногда в трещинах построек и скал. Гнезда обычно имеют очень неопрятный вид из-за скапливающихся остатков пищи. В кладке 4-8 блестящих, белых, почти круглых яиц. Птенцы вылупляются слепыми и голыми.

В России четыре семейства.


16.1. Семейство Зимородковые – *Alcedinidae*

Мелкие большеголовые птицы с длинным крепким клювом, короткими крыльями и хвостом. Питаются мелкой рыбой, реже крупными водными насекомыми, которых ловят, пикируя в воду с низких веток. Иногда зависают на месте, трепеща крыльями, прежде чем нырнуть в воду и взлететь с рыбкой в клюве. Полет быстрый, прямолинейный, обычно низко над водой.

Гнездятся в норах по обрывистым берегам рек и озер, нередко вход в нору закрыт корнями деревьев. Дно гнездовой камеры выстлано тонкими рыбьими косточками и чешуей.

В России пять видов, из них только обыкновенный зимородок [403] широко распространен и местами обычен, остальные очень редки.

16.1.1. Род Голубые зимородки — *Alcedo*



Обыкновенный зимородок [403] — *Alcedo atthis* (Таблица 34)


Чуть меньше скворца, от всех наших птиц отличается блестящей зеленовато-голубой окраской спины и

головы, благодаря которой летящая птица кажется стремительной голубой искрой. Брюхо рыжее, горло и пятна по бокам шеи белые, ноги красные, клюв темный.

Распространен в южной части лесной и в степной зонах от западных границ России до Южных Курил. Местами отдельные птицы зимуют на незамерзающих реках. Голос — резкий короткий крик.

16.1.2. Род Пегие зимородки — *Ceryle*

Окраска черно-белая, клюв и лапы черные, на голове хол. Рыбу ловят обычно с воздуха, как крачки. Голос — пронзительный отрывистый крик "пиик".



Большой пегий зимородок [404] — *Ceryle lugubris*

Размером с голубя, белый с густыми темно-серыми или черными поперечными

пестринами на спине, крыльях, груди и хвосте, грудь иногда с рыжеватым оттенком. Крыло снизу с большим пятном, рыжим у самки и белым у самца.


Гнездится на Южных Курилах по берегам лесных ручьев.

В дельту Волги залетал **малый пегий зимородок** — *Ceryle rudis* [405] (таблица 34), больше скворца, сверху черный с густыми белыми пестринами, снизу белый с черной полосой (самец с двумя) поперек груди, хвост с черным кончиком. Гнездится в Африке и Южной Азии.

16.1.3. Род Красноносые зимородки — *Halcyon*

Зимородки размером меньше голубя, с синими или красно-рыжими спиной и головой, очень большим ярко-красным клювом. Голос — каркающий крик.

Ошейниковый зимородок [406] —
Halcyon pileata
(Таблица 34)



Верх темно-синий с белым или рыжим ошейником, низ белый с рыжим налетом. В полете видны большие белые пятна на крыльях.

Изредка гнездится на юге Приморья.

На Сахалин залетал **красный зимородок** — *Halcyon coromanda* [407], красно-рыжий с голубым надхвостьем, гнездящийся в Южной Азии, Корее и Японии. Может быть встречен также на юге Приморья.


16.2. Семейство Щурковые — *Meropidae*

Мелкие (со скворца) птицы с тонким, слегка загнутым вниз клювом, длинными острыми крыльями и длинным хвостом. Центральные рулевые перья удлинены и далеко выдаются за край хвоста. Ноги короткие, передние пальцы наполовину сросшиеся. Через глаз проходит черная полоска. Полет быстрый и легкий, с чередованием частых взмахов и планирования на раскрытых крыльях.

Гнездятся колониями в норах по степным оврагам и балкам, часто сидят большими стаями на проводах, то и дело взлетая. Питаются крупными насекомыми, которых ловят в основном на лету. Голос — звонкое "крю-крю".

В России два вида.

16.2.1. Род Щурки — *Merops*




Золотистая щурка
[408] — *Merops apiaster*
(Таблица 34)

Верх головы и (у взрослых птиц) спина каштаново-рыжие, горло ярко-желтое, низ ярко-голубой, хвост

и часть крыльев зеленые.

Распространена на юге лесной и в степной зонах европейской части страны, на Кавказе и в Зауралье. Пчеловоды очень не любят эту красивую птицу за то, что стайки щурок порой охотятся на пчел. Не боясь острого жала, щурка ловит даже шершней и других крупных ос.



Зеленая щурка [409] —
Merops superciliosus
(Таблица 34)

Ярко-зеленая с рыже-коричневым горлом и более светлыми боками головы.

Редкая птица Прикаспия и, возможно, Ставрополя. Голос тише и выше, чем у золотистой щурки.

16.3. Семейство Сизоворонковые — *Coracidae*

Птицы величиной с галку, синей или зеленовато-голубой окраски, с коротким сильным клювом, большими крыльями

и прямым хвостом. Полет маневренный, с резкими глубокими взмахами крыльев. По земле передвигаются довольно неуклюже.

Только для сизоворонок достоверно известна способность переносить птенцов из одного гнезда в другое.


В России два вида.

16.3.1. Род Сизоворонки — *Coracias*

Сизоворонка [410] —
Coracias garrulus
(Таблица 34)

Голубая с бурой спиной и плечами, клюв черный. Крылья острые, в полете синие. Молодые с бледно-коричневой головой.

Распространена на юге лесной и в степной зонах Европейской части России и на юге Западной Сибири. Гнездится в норах и дуплах. Питается насекомыми, реже ящерицами, грызунами, которых высматривает, сидя на ветвях или проводах. Голос — резкий скрипучий крик "краак".




16.3.2. Род Широкороты — *Eurystomus*

Широкорот [411] —
Eurystomus orientalis
(Таблица 34)


Темно-синий, фиолетовый или изумрудно-зеленый (в зависимости от освещения) с ярко-красными клювом и ногами. На крыльях в полете видны круглые серебристо-белые пятна, за которые широкорот получил английское название "долларовая птица". Разрез рта очень широкий.

Распространен на юге Хабаровского края, в Приморье и, вероятно, на Южных Курилах. Гнездится в дуплах в высокоствольных лесах. Питается насекомыми, которых ловит в основном на лету. Голос — хриплое "черр-черр".



16.4. Семейство Удодовые — *Upupidae*

Один вид.

16.4.1. Род Удоды — *Upupa*

Удод [412] — *Upupa
epops*
(Таблица 34)

Небольшая птица, сверху с широкими черными и белыми полосами, низ и голова рыжевато-розовые (издали иногда кажутся желто-оранжевыми). На голове хохол с черным кончиком, который птица может раскрывать в виде веера. Клюв длинный, тонкий, загнут книзу. Крылья широкие, полет медленный, порхающий. При опасности иногда затаивается, распластавшись по земле и подняв вверх клюв, а потом внезапно взлетает. Полет неровный, птица то складывает, то резко раскрывает яркие широкие крылья.

Распространен в южной половине страны, обычен в степной зоне. Гнездится в дуплах, норах, россыпях камней, в развалинах зданий. Питается насекомыми, которых ловит на земле или извлекает из навоза. Голос — глухое "уп-уп-уп".

17. Отряд Дятлообразные — *Piciformes*

На днях ко мне в гостиную залетел дятел и принялся долбить клювом дедушкины часы. Возможно ли такой случай считать необычным?

Из писем читателей писателю-натуралисту Джералду Дарреллу.

Из птиц нашей страны, кроме всем известных дятлов, отряд включает вертишейку [425] — мелкую птицу рыжевато-серой окраски, которую можно узнать по характерному поведению. В России одно семейство с пятью родами, из них перелетная только вертишейка.

17.1. Семейство Дятловые — *Picidae*

Два пальца на ноге обращены вперед, один или два — назад. Перья хвоста очень жесткие, заостренные на конце и служат дополнительной опорой при лазании по вертикальным стволам деревьев (только у вертишейки хвост мягкий). Клюв прямой, долотообразный. Для извлечения насекомых из ходов в древесине дятлам служит чрезвычайно длинный и тонкий язык с зубчатыми краями, и покрытый липкой слюной.

Весной самцы многих видов выстукивают раскатистую барабанную дробь, заменяющую песню. Гнездятся в дуплах, в кладке 3-8, у вертишейки 7-12 белых яиц. Птенцы вылупляются слепыми и голыми.


Подросшие птенцы выдают свое месторасположение настойчивыми громкими криками. Питаются дятлы и вертишейка насекомыми, которых извлекают из ходов в древеси-

не или собирают на земле, поедают также семена хвойных растений, выдалбливая их из шишек.

Полезьа, приносимая дятлами лесному хозяйству, общеизвестна. Кроме того, дупла дятлов по многу лет служат убежищем самым различным животным, в том числе разнообразным птицам. В христианской литературе Средневековья дятлы, особенно желна, считались птицами сатаны, и немало безобидных черных дятлов сложили головы в котлах колдунов и знахарей, а также в лабораториях алхимиков.

17.1.1. Род Черные дятлы — *Dryocopus*

В России один широко распространенный вид.



**Желна [413] —
Dryocopus martius
(Таблица 35)**

Крупная (с ворону) угольно-черная птица, верх головы (у самцов) или затылок (у самок) ярко-красный.

Полет тяжелый, прямолинейный. Характерна привычка сопровождать некоторое время идущего по лесу человека, залетая вперед и выглядывая из-за дерева.

Гнездится по всей лесной зоне, в основном в хвойных лесах, на Кавказе — в буковых. Выдалбливает дупла с прямоугольным входом в старовозрастных лесах. Для строительства гнездовых дупел нуждается в старых толстых деревьях, поэтому исчезает там, где прошли санитарные рубки леса. Иногда полностью превращает в опилки березовые пни с колониями муравья-древоточца.

Голос — заунывное "кьюээ", в полете — резкий крик "кри-кри-кри". Весенняя дробь гулкая, низкого тона.

17.1.2. Род Зеленые дятлы — *Picus*

Размером с голубя. Основной тон окраски тускло-зеленый. Надхвостье желто-зеленое. Питаются преимущественно муравьями, которых собирают на земле, стволах деревьев или прямо из муравейников. В тех же муравейниках часто и ночу-


ют, особенно зимой. Голос — хохочущий крик. Почти никогда не выстукивают трели и редко долбят стволы деревьев.

В России два вида.

**Седой дятел [414] —
Picus canus
(Таблица 35)**

Голова, шея и брюхо сероватые, у самцов лоб красный, по бокам головы черные "усы". Молодые птицы чуть буроватые, "усов" нет.


Распространен на юге лесной зоны от западных границ России до Сахалина. Обычный обитатель лиственных и смешанных лесов.



**Зеленый дятел [415] —
Picus viridis
(Таблица 35)**

Весь зеленый, верх головы красный, лоб и окаймление глаза черные, "усы" широкие черные у самцов с красными пестринами. Молодые птицы с частыми темными пестринами, "усов" нет.

Гнездится в широколиственных лесах средней полосы Европейской России и Кавказа. Голос более резкий, чем у седого дятла.




17.1.3. Род Трехпалые дятлы — *Picoides*

Один вид.

**Трехпалый дятел
[416] — *Picoides tridactylus*
(Таблица 35)**

Размером с дрозда. Черно-белой окраски, с поперечным рисунком на боках



и иногда на брюшке, белыми подхвостьем и верхней частью спины. Темя у самцов золотистое, у самок белое с темными пестринами. Выглядит более темным, чем пестрые дятлы [417-424], особенно в полете. Ноги трехпалые. Полет быстрый, прямолинейный.


Распространен почти по всей лесной зоне России, но чаще встречается на севере ареала. Обитает в густых темнохвойных лесах. Питается в основном древесными насекомыми. Барабанная трель тихая и короткая.

17.1.4. Род Пестрые дятлы — *Dendrocopos*

Средние и мелкие дятлы черно-белой, реже буро-белой окраски. Голова у самцов и молодых птиц большинства видов с красной шапочкой или затылком, подхвостье розовое или белое, крыло с круглым белым пятном или поперечными полосками. Ноги четырехпалые. Полет волнообразный, птица после каждого нескольких взмахов складывает крылья, летит снижаясь, а затем снова набирает высоту.

Питаются летом в основном древесными насекомыми, зимой семенами хвойных деревьев. Выдалбливают дупла с круглым входом. В кладке до 6 чисто-белых яиц.

В России восемь видов.



Большой пестрый дятел
[417] — *Dendrocopos*
major
(Таблица 35)


На крыле большое белое пятно, спина черная, бока белые (у кавказских птиц буроватые), на голове у молодых красная шапочка, на груди иногда пестрины, у самцов красное пятно на затылке. Подхвостье розовое.

Распространен повсюду в лесной и лесостепной зонах, в период кочевок появляется в тундрах и степях. В лесу можно найти так называемые "кузницы" дятла — пни или трухлявые стволы, в щелях которых он заклинивает шишки и желуды, чтобы было удобнее расклевать. Внизу под старой "кузницей" нередко образуются кучи характерно расклеванных ши-

шек. Весной часто пьет березовый сок, оставляя на стволах аккуратные горизонтальные ряды маленьких отверстий в бересте. Нередко поедает яйца и птенцов, разоряя гнезда мелких воробьиных птиц. Голос — резкое "ки-ки-ки". Барабанная дробь короткая (около одной секунды), сливающаяся.

Сирийский дятел
[418] — *Dendrocopos*
syriacus


(Таблица 35)



Очень похож на большого пестрого дятла, но черная полоса от клюва не доходит до черного затылка. В России наблюдался лишь несколько раз в широколиственных лесах Ростовской и Воронежской областей.

Средний пестрый дятел
[419] — *Dendrocopos*
medius

(Таблица 35)




Похож на большого пестрого дятла [417], но чуть мельче, бока с темными пестринами, верх головы у взрослых птиц всегда красный, черная полоса под глазом не доходит до основания клюва, белые щеки связаны с белым цветом на брюхе непрерывной полосой (как и у сирийского дятла), брюшко желтоватое.

Гнездится в лиственных лесах запада Европейской части России и Кавказа, повсюду очень редок.

Белоспинный дятел
[420] — *Dendrocopos*
leucotos


(Таблица 35)



Нижняя часть спины и надхвостье белые, крыло без большого круглого белого

пятна, но с белыми поперечными полосками, верх головы у самцов красный, бока с темными продольными пестринами.

Гнездится в смешанных и лиственных лесах почти по всей лесной зоне, кроме Севера. Голос — медленное "геть-геть-геть", барабанная дробь продолжительностью около двух секунд, удары разделены более отчетливо, чем у большого пестрого дятла [417].




Рыжебрюхий дятел
[421] — *Dendrocopos*
hyperythrus
(Таблица 35)

Меньше большого пестрого дятла [417], спина и крылья черные с попереч-

ными белыми полосками, брюхо светло-каштановое, верх головы у самцов красный.

Изредка гнездится в районе Хабаровска и, вероятно, в Приморье. Барабанная трель с повышающимся к концу тоном.



Малый пестрый дятел
[422] — *Dendrocopos*
minor
(Таблица 35)


Мелкий (чуть больше воробья) дятел. Спина и крылья черные с белыми по-

лосками, верх головы у самца красный, у самки белый, у молодых буроватый. Брюхо белое, изредка с темными пестринами. Кормится в основном на тонких стволах и на ветках.

Гнездится в лесах, парках, иногда кустарниках по всей территории лесной и лесостепной зон, обычно выдалбливая гнездовые дупла в тонких гнилых стволах. Зимой часто кокует в стайках синиц. Точнее, стайки синиц следуют за дятлом, выискивая мелких насекомых в кусочках коры, осыпающейся, когда дятел долбит деревья. Голос — быстрое громкое "ки-ки-ки", похожее на клекот мелких соколов. Барабанная трель тихая и глухая.

На Чукотке возможны встречи канадского пестрого дятла — *Dendrocopos villosus*, похожего на малого пестрого, но крупнее, с белым пятном над глазом.


Большой острокрылый дятел [423] —
Dendrocopos canicapillus
(Таблица 35)



Меньше скворца, голова серо-бурая со светлыми полосками, шея сзади с белой поперечной полосой, спина белая, брюхо буро-серое с темными продольными пестринами, на крыле большое белое пятно, у самцов на затылке редкие красные перышки. Дупла выдалбливает в основном на боковых ветках, реже держится на стволах.

Гнездится в смешанных и широколиственных лесах Приморья и юга Хабаровского края.

Малый острокрылый дятел [424] — *Dendrocopos kizuki*
(Таблица 35)




Похож на большого острокрылого дятла, но еще меньше (чуть больше воробья), спина бурая в белых поперечных полосках, крыло черное с белыми пестринами. От малого пестрого дятла [422] легко отличим по буро-серому с темными пестринами низу. Выдалбливает дупла обычно на боковых ветках, часто кормится даже на высоких травянистых растениях, например, на борщевике.

Гнездится в пойменных лесах от Амура до Южных Курил. Почти везде чаще встречается, чем большой острокрылый дятел.

17.1.5. Род Вертишейки — *Junco*

Один вид.



Вертишейка [425] —
Junco torquilla
(Таблица 35)

Чуть больше воробья, спина серо-бурая, на голове и шее темные продольные полосы, брюхо серое с

тонким поперечным рисунком, крылья и хвост рыжеватые. Хвост довольно длинный, мягкий, с поперечными полосками. Лазить по вертикальным стволам деревьев не умеет и держится в основном на ветвях, часто ходит по земле.

Широко распространена в лесной зоне, повсюду обычна, но нечасто попадает на глаза. Гнездится в дуплах, но сама их не выдалбливает, а пользуется готовыми. Потревоженная на гнезде вертишейка высовывается из дупла, вертит головой и шипит наподобие змеи. Питается преимущественно муравьями. Голос — громкое "кяй-кяй-кяй".

18. Отряд Воробьеобразные — *Passeriformes*

*Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья —
Это русская сторонка,
Это Родина моя!*

Русская народная песня.

К этому отряду принадлежит почти половина видов птиц нашей страны, они обычны повсюду, несколько реже встречаются только в Арктике. Большинство воробьеобразных — мелкие птицы, но в семействе врановых есть и крупные.

Гортань имеет сложное строение, благодаря чему у многих видов красивая песня, некоторые пользуются множеством различных звуковых сигналов. К воробьеобразным относятся практически все лучшие певцы среди птиц, и многие из них встречаются в России. Немногие страны могут похвастаться таким великолепным птичьим хором, какой звучит весенним утром в наших лесах. Особенно славятся песни соловьев, некоторых дроздов, славок и вьюрковых. Хотя большинство людей не воспринимает, например, ворону как певчую птицу, песня и у нее очень сложная, пусть и не кажется нам красивой. Чаще всего поют самцы весной, когда их песня привлекает самок своего вида к занятым ими гнездовым участкам и предупреждает других самцов, что территория занята. При этом из-за различий в строении органов слуха сами птицы слышат свои песни совсем не так, как мы.

Насекомоядные виды обычно имеют тонкий шиловидный клюв, зерноядные — утолщенный, хотя бывают и исключения.

Из всех птиц воробьиные строят наиболее сложные гнезда, постройки некоторых видов настолько совершенны, что кажутся настоящим произведением искусства. Гнезда весьма разнообразны по расположению, конструкции и по материалу, из которого они сделаны, и обеспечивают птенцам комфортные условия существования. Птенцы вылупляются слепыми, голыми или покрытыми редким пухом и сравнительно долгое время проводят в гнезде. За очень редкими исключениями, родители выкармливают их в основном насекомыми и только клесты — семенами хвойных деревьев. От откладки яиц до вылупления птенцов у большинства видов проходит 10-14 суток, у представителей семейства врановых до 20 суток. Примерно столько же времени птенцы проводят в гнезде до того, как достаточно подрастут. Многие виды способны выводить птенцов несколько раз за лето. Птенцы, покинувшие гнездо (слетки) еще довольно долго нуждаются в опеке родителей. Если вы встретили в лесу такого "желторотика", не пытайтесь взять его домой и выкормить самостоятельно. Даже если он кажется "потерявшимся", родители скорее всего знают, где он, и время от времени кормят сами.

Это сравнительно молодой (с точки зрения палеонтологии) отряд, который находится в процессе активного образования новых видов. Недавно возникшие виды часто мало отличаются друг от друга, поэтому определение в природе многих воробьеобразных довольно сложно. Нередко близкие виды лучше отличаются по голосу, чем по внешнему виду.

Всего в России встречаются воробьеобразные 28 семейств.

18.1. Семейство Ласточковые — *Hirundinidae*

Ласточки так же, как и стрижи [398-401], питаются насекомыми, которых ловят в воздухе, поэтому у них тоже короткий клюв, широкий разрез рта, длинные узкие крылья и маленькие лапки. Но ласточки могут ходить по земле и взлетать с нее. Они часто сидят на проводах, чего никогда не делают стрижи. На пролете ласточки иногда собираются огромными стаями в зарослях тростников.

Гнездятся на скалах и зданиях, один вид — в норах на песчаных обрывах, лоток гнезда выстилают перьями. В клад-

ке 4–8 белых (у деревенской и скалистой ласточек с коричневыми крапинками) яиц. За лето обычно бывает несколько выводков (до 5 на юге страны). Голос — негромкое щебетание и чириканье.

У большинства народов нашей страны ласточка издавна считалась символом добра, счастья, надежды, весны. Ежегодное исчезновение ласточек осенью и их появление весной символизировало круговорот жизни и смерти в природе. Все наши ласточки — перелетные птицы; мигрируют они по ночам, поэтому их исчезновение и появление часто кажется внезапным. Натуралистам прошлого трудно было поверить, что такие маленькие нежные создания могут дважды в год преодолевать тысячи километров. Еще в XVIII веке многие ученые считали правильным народное поверье, согласно которому ласточки проводят зиму в спячке на дне глубоких озер.

В России пять родов, из них в Европейской части встречаются только деревенская, городская ласточки и береговушка [426, 429, 432].

18.1.1. Под Касатки — *Hirundo*


Спинная сторона черная, брюшко белое или рыжеватое, надхвостье черное или рыжеватое, хвост у взрослых птиц с длинными и тонкими крайними рулевыми перьями — "косицами" (их нет только у залетной белолобой ласточки [428]).

Гнездятся колониями или поодиночке на стенах зданий, под крышами и нависающими козырьками, на обрывах и скалах. Ловят довольно крупных насекомых, стремительно летая над самой землей.

В России три вида.


Деревенская ласточка
[426] — *Hirundo rustica*
(Таблица 36)

Лоб и горло красно-коричневые, поперек горла черная полоса, спинная сторона полностью черная.



Распространена повсюду южнее тундр. Гнездится в поселках, по окраинам городов, на Кавказе — изредка в скалистых ущельях. Гнездо из глины, смешанной с тонкой соломой, открытое сверху, обычно прикрепляется к стене, но при отсутствии достаточно вязкой глины строится на балках или карнизах. Песня — щебечущее "тиль-вили-вили-трр...", крик — звонкое "тви-вит".

Считается, что ласточки низко летают перед дождем. На самом деле деревенская ласточка практически всегда кормится на небольшой высоте, а городская ласточка и стрижи — высоко в небе. Теплыми летними вечерами, во время массового лета насекомых, городские ласточки и стрижи тоже спускаются вниз, но с прогнозом погоды это никак не связано.



Рыжепоясничная ласточка [427] — *Hirundo daurica*
(Таблица 36)

Верх шеи и надхвостье рыжие, остальное оперение спины черное, брюхо с тем-

ными продольными пестринами.

Гнездится на юге Сибири и Дальнего Востока в населенных пунктах, под мостами, на скалах в невысоких горах. Гнездо в виде глиняного кувшина с трубкой — входом, прикрепляется к потолку или стенам строений и скал. Голос — щебет и мяуканье.

На о-в Врангеля и, возможно, на Чукотку залетает североамериканская белолобая ласточка — *Hirundo pyrrhonota* [428], окрашенная как рыжепоясничная ласточка, но с прямым хвостом и белыми пестринами на спине, голос — двойной свист.

18.1.2. Под Воронки — *Delichon*

Спинная сторона иссиня-черная, брюхо и надхвостье белые, хвост без "косиц". Гнездятся колониями на скалах и стенах зданий под карнизами и навесами. Гнездо в виде чаши сделано из глины без примеси травинок. Ловят мел-


ких насекомых, обычно высоко в воздухе. Голос — звонкое "тирч".

В России два вида.

Городская ласточка
[429] — *Delichon urbica*
(Таблица 36)

Брюхо и надхвостье чисто-белые.

Гнездится в населенных пунктах преимущественно городского типа почти повсюду южнее тундры, в скалистых горах Кавказа, Алтая и Саян и Чукотки. Гнездо с круглым входом. В больших городах обычно исчезает, сохраняясь лишь на окраинах. В степях иногда селится в норах ласточки-береговушки. В курортных городах юга России и на Кавказе известны гигантские колонии городской ласточки, насчитывающие до 2000 гнезд. Старые гнезда часто используются воробьями.




Восточный воронек
[430] — *Delichon*
dasyurus

Бока бурые, брюхо и надхвостье с буроватым налетом, хвост почти без вырезки.


Распространен от Восточного Саяна до Южных Курил. Гнездится небольшими колониями на скалах или в населенных пунктах. Гнездо открытое сверху или закрытое с боковым входом.

На о-в Врангеля и, возможно, Чукотку залетает североамериканская древесная ласточка — *Tachycineta bicolor* [431], сверху черная, снизу белая, от воронков отличается зеленым оттенком верха и отсутствием белого цвета на надхвостье.



18.1.3. Род Береговые ласточки — *Riparia*

В России один широко распространенный вид.



Береговушка [432] —
Riparia riparia
(Таблица 36)


Спинная сторона серовато-бурая, брюхо белое, поперек груди бурая полоса. Хвост с неглубокой вырез-

кой. От похожего по окраске белобрюхого стрижа [400], встречающегося на Кавказе, отличается размерами (немного меньше воробья) и менее длинными крыльями.

Гнездится колониями по всей стране до южных тундр, в норах по обрывистым берегам рек. Во многих колониях появляется не каждый год. На Амуре и некоторых сибирских реках известны гигантские колонии, насчитывающие десятки тысяч гнезд и существующие по меньшей мере несколько столетий. Но обычно осыпание берегов заставляет их время от времени переселяться на новые обрывы. Ловит насекомых обычно низко над водой. Голос — резкое "чрр".

18.1.4. Род Горные ласточки — *Ptyonoprogne*

В России один вид.



Скалистая ласточка
[433] — *Ptyonoprogne*
rupestris
(Таблица 36)

Спинная сторона буровато-серая, брюшная светло-серая без поперечной по-

лосы на груди, на слабовырезанном хвосте белые пятна.

Распространена на Кавказе (до высоты 3500 м н.у.м.), Алтае и в Туве. Гнездо — глиняная чашечка, открытая сверху, устраивается под выступами скал. Голос — тихое щебетание.

18.2. Семейство Жаворонковые — *Alaudidae*

Мелкие птицы, населяющие открытые ландшафты: поля, луга, степи, сухие тундры, безлесные горы и лесные поляны.

Окраска серая или буроватая, у большинства видов с мелкими темными пестринами, только у одного вида самцы черные. От коньков [445-454] отличаются более плотным сложением, широкими крыльями, коротким хвостом, клюв у жаворонков короче и толще. Полет более уверенный, хотя и несколько ныряющий. Многие виды поют в полете, зависая в воздухе и трепеща крыльями.

Гнезда строят на земле, часто под куртиной травы или небольшого куста. Основным материалом служит солома, лоток выстилают более тонкими стеблями. Питаются семенами и насекомыми. В России шесть родов. За пределами степной и тундровой зон чаще других встречается полевой жаворонок.

18.2.1. Род Полевые жаворонки — *Alauda*

Немного крупнее воробья, спинная сторона серо- или буровато-охристая с густыми бурыми продольными пестринами, брюхо белое, на груди мелкие бурые пестрины. На голове короткий округлый хохолок, по бокам хвоста белые полосы.


Гнездятся в полях, лугах и степях, в том числе горных. В кладке 4-5 сероватых или красноватых с темными пятнами яиц. Крик — негромкое "чрр-ик", песня — долгая звонкая трель. Часто поют, зависая в воздухе на месте, иногда очень высоко.


В России два перелетных вида.

Полевой жаворонок
[434] — *Alauda arvensis*
(Таблица 37)

Бровь светлая.

Гнездится почти по всей стране, доходя на север до зоны тундр, в основном по сухим открытым местам, зимой встречается на юге Европейской части России. Обычен на полях и сухих лугах. Красивая песня полевого жаворонка часто бывает слышна в небе в солнечные летние дни даже на окраинах городов.






Японский жаворонок
[435] — *Alauda japonica*

Очень похож на полевого жаворонка, но окрашен темнее, особенно голова и спина, бровь темно-серая.

Гнездится по сырым лугам и полям юга Сахалина и Курил.

18.2.2. Род Лесные жаворонки — *Lullula*

Один перелетный вид.



Юла [436] — *Lullula arborea*
(Таблица 37)

Похожа на полевых жаворонков, с которыми иногда собирается в общие стайки, но мельче (с воробья),

Спинная сторона с коричневым оттенком, над глазом более четкая светлая полоска, хвост относительно короткий, без белых полос по бокам, на сгибе крыла черное пятнышко, хохолок почти не заметен.

Распространен в средней полосе Европейской части России и на Кавказе (до высоты 3500 м над уровнем моря). Гнездится на опушках сосновых лесов, полянах, в горных степях. В кладке 5-6 белых с буроватыми или красноватыми крапинками яиц. Голос — звонкая трель "тюю-люлю" или "люлюлю", часто поет в воздухе, летая кругами.


18.2.3. Род Малые жаворонки — *Calandrella*

Похожи на полевых жаворонков [434-435], но мельче (с воробья), без хохолка, клюв более толстый, окраска светлее, серая без охристого оттенка, пестрины не такие резкие.

Гнездятся в сухих степях. В кладке 4-5 беловатых с темными пятнами яиц. Голос — короткое щебетание.

В России два или три перелетных вида.


Серый жаворонок
[437] — *Calandrella*
rufescens
 (Таблица 37)



На груди продольные бурые пестрины.

Гнездится в степях от Дона до Забайкалья. Поет, летая кругами высоко в воздухе.

Малый жаворонок
[438] — *Calandrella*
cinerea



Грудь чисто-белая, по бокам шеи небольшие темные пятна.


Гнездится в степях от Дона до Забайкалья и в предгорьях Кавказа. Поет обычно на земле или летая на небольшой высоте.

В Туве и на юге Забайкалья может быть встречен **солончаковый жаворонок — *Calandrella cheleensis*** (Таблица 37). Он похож на серого и малого жаворонков, но отличается пепельно-серой окраской. Обитает в сухих солончаковых полных степях Центральной Азии. Песня — набор двусложных щебетаний, обычно поет в воздухе.

18.2.4. Род Хохлатые жаворонки — *Galerida*

В России один вид.

Хохлатый жаворонок
[439] — *Galerida cristata*
 (Таблица 37)




Крупнее воробья. Похож на полевых жаворонков, но на голове приподнятый остроконечный хохол, полоски по бокам хвоста и крылья снизу рыжие. Очень быстро бегает, держась при этом вертикально.

Гнездится и зимует в степной зоне от Дона до Поволжья, в предгорьях Кавказа в полях, полупустынях, на окраинах населенных пунктов. Известны регулярные залеты до Белого моря к северу. В кладке 3-5 беловатых с темными пятнами яиц. Голос — мелодичное чириканье "тии-ти-ту" или "ии-тии". Поет обычно, сидя на земле, камне или заборе.

18.2.5. Род Степные жаворонки — *Melanocorypha*

Крупные (со скворца) короткохвостые жаворонки с длинным массивным клювом и широкими крыльями. Гнездятся в степях, в кладке 3-6 светлых с бурыми пятнами яиц. Голос — трели и свист, часто подражают голосам других птиц. Поют обычно в воздухе.

В России четыре вида.




Степной жаворонок
[440] — *Melanocorypha calandra*
(Таблица 37)

Окраска, как у полевого жаворонка [434], но по бокам груди большие черные

пятна, брюхо чисто-белое, по заднему краю крыла узкая белая полоса, заметная только в полете.

Гнездится и зимует в степях от Дона до Поволжья и в предгорьях Кавказа.




Белокрылый жаворонок
[441] — *Melanocorypha leucoptera*
(Таблица 37)

Похож на степного жаворонка, но голова, плечи и пятна по бокам груди рыжеватые или коричневые, белая полоса на крыле широкая, видна и у сидящей птицы.

Гнездится и зимует в степях от Среднего Дона до Оби, зимой обычен также в Предкавказье.


Монгольский жаворонок
[442] — *Melanocorypha*
mongolica
(Таблица 37)



Очень похож на белокрылого жаворонка, но крупнее, пятна по бокам груди черные.

Гнездится и зимует в сухих степях Тувы и Южного Забайкалья.

Черный жаворонок
[443] — *Melanocorypha*
yeltoniensis
(Таблица 37)




Самки окрашены как полевые жаворонки [434, 435], но с бурым оттенком, крыло снизу темное. Самцы летом черные или очень темные, зимой со светлым рисунком, образованным светлыми каемками перьев.

Гнездится в сухих степях и полупустынях от Нижнего Поволжья до Омской области, зимует в степях от Дона до Оби. Редок.

В Дагестане и районах, пограничных с Казахстаном, могут быть встречены обитающие в пустынях зарубежной Азии **двупятнистый жаворонок** — *Melanocorypha bimaculata* (Таблица 37), похожий на степного [440], но без белой полосы по краю крыла, и **пустынный жаворонок** — *Ammomanes deserti* (Таблица 37), который отличается от всех наших жаворонков однотонной глинисто-серой окраской с розоватым оттенком, обитает в пустынях зарубежной Азии.

18.2.6. Род Рогатые жаворонки — *Eremophila*

В России один вид.



Рогатый жаворонок
[444] — *Eremophila*
alpestris
(Таблица 37)

Окраска розовато-серая, лоб, горло и щеки белые или светло-желтые с черным,

на голове короткие черные "рожки".

Обычен в сухих каменистых тундрах от Кольского полуострова до Колымы, на некоторых островах Арктики, в степях Нижнего Поволжья и юга Сибири, в высокогорьях Сибири и Кавказа. Зимой кочует в Предкавказье. В кладке 3-5 буроватых или зеленоватых с бурыми пятнышками яиц. Песня-набор чирикающих трелей, крик — тихий мелодичный свист.

Как правило, гнезда рогатого жаворонка расположены с подветренной стороны какого-либо укрытия: камня, скалы или кустика. По нескольким гнездам иногда можно приблизительно определить направление господствующих ветров в данном районе.

18.3. Семейство Трясогузковые — *Motacillidae*

Мелкие насекомоядные перелетные птицы с довольно длинными ногами и хвостом, тонким шиловидным клювом. Быстро бегают. Характерна привычка все время покачивать хвостом. Полет ныряющий.

В России три рода.


18.3.1. Род Коньки — *Anthus*

Похожи на мелких жаворонков [434-438], но отличаются более легким и стройным сложением, длинным тонким клювом; сидя, держатся более вертикально; лоб более показный. Стаями встречаются редко, только на пролете.

Гнездо из тонкой соломы устраивают в ямке на земле, обычно под кустиком травы. В кладке 4-6 светлых (у степного конька оливково-шоколадных) с темными пятнами яиц.

В России десять видов.

Лесной конек [445] —
Anthus trivialis
 (Таблица 38)



Спинная сторона глинисто-сероватая с темными пестринами на голове и спине, брюхо светлое, по бокам хвоста белые полосы, на груди и боках шеи охристый оттенок и четкие черные пестрины. Ноги светло-розовые, коготь заднего пальца удлиннен и изогнут.

Гнездится в разреженных лесах, на полянах и опушках почти всюду южнее тундры на восток до верхней Колымы и Байкала, в высокогорьях Южной Сибири. Поет, сидя на вершине дерева или куста, затем взлетает, описывает круг и снова садится (так называемый токовый полет). Песня — громкое "сип-сип-сип-сиа-сиа-сиа", реже медленное "чи-чи-чи", крик — короткое "цит".


Луговой конек [446] —
Anthus pratensis
 (Таблица 38)



Очень похож на лесного конька, но грудь без охристого оттенка, ноги бурые, верх темно-серый, коготь заднего пальца почти прямой.


Гнездится на сырых лугах, болотах и в тундрах Средней полосы и Севера на восток до Оби, зимой встречается близ Сочи и в Дагестане. Песня — монотонное "ит-ит-ититити", поет во время прямолинейного токового полета, после чего опускается с тихим "чрр". Крик — тонкое "зиип".

Пятнистый конек
[447] — *Anthus hodgsoni*
 (Таблица 38)



Похож на лесного конька [445], но спина одноцветная, зеленоватая, маховые перья с зеленоватыми каемками, пестрины на груди широкие, треугольные. Ноги светлые.

Гнездится в лесах, на моховых болотах и в горных тундрах от Северного Урала до Камчатки и Курил и, возможно, под Архангельском. Голос как у лесного конька, но звонче. Токовый полет тоже как у лесного конька.




Сибирский конек
[448] — *Anthus gustavi*
(Таблица 38)

Похож на лесного конька [445], но верх темно-буроватый со светлыми пестринами, сливающимися в

белые полосы на плечах, бока хвоста светлые, но не белые, темные пестрины на груди часто сливаются в темные продольные полосы. Коготь заднего пальца почти прямой.

Гнездится в лесотундре и кустарниковой тундре от Печоры до Чукотки и Командор, на болотах Камчатки и Приханкайской низменности. Голос как у лесного конька, но первая часть песни значительно выше по тону, чем вторая. Поет в воздухе.




Конек Годлевского
[449] — *Anthus godlewskii*

Похож на лесного конька [445], но окраска с рыжим налетом, особенно на груди, коготь заднего пальца почти прямой. От краснозобого конька [450] отличается

светлыми ногами.

Гнездится на сухих склонах гор и холмов Забайкалья. Голос и токовый полет как у лесного конька.




Краснозобый конек
[450] — *Anthus cervinus*
(Таблица 38)

У птиц в весеннем наряде грудь с красноватым оттенком, у самца бока головы ржаво-красноватые, но-

ги темные, коготь заднего пальца почти прямой. В зимнем наряде практически неотличим от лесного конька [445].

Гнездится в сырых кочкарниковых тундрах на восток до Командор и Северных Курил, на пролете встречается в степях и лугах по всей стране. Песня — тихие трели, крик — негромкое "фюррисс", поет на земле и в воздухе.


Степной конек [451] —
Anthus richardi
 (Таблица 38)



Самый крупный конек (заметно больше воробья). Спинная сторона рыжевато-бурая с темными пестринами, на груди охристый налет.

Гнездится в степях и лугах юга Сибири и Дальнего Востока. Поет, летая кругами высоко в воздухе, песня — монотонное "три-иа-иа-иа", крик — громкое "ррип" и короткое "пит".


Полевой конек [452] —
Anthus campestris
 (Таблица 38)



Спинная сторона песочно-серая, однотонная, брюшная желтоватая без пестрин.

Гнездится на полях, лугах, лесных полянах, в степях и горах запада и юга России на восток до Тувы. Поет, сидя на земле или кустах, изредка во время волнообразного токового полета, песня — короткая трель, крик — короткое "тви" или "циррюй".


Горный конек [453] —
Anthus spinoletta
 (Таблица 38)



Спинная сторона буровато-серая почти без пестрин, верх головы и надхвостье несколько светлее. Брюш-

ная сторона охристая, более яркая на груди, у самок с мелкими пестринами. Ноги черные.

Гнездится в высокогорьях Кавказа и Южной Сибири. На северном побережье Кольского полуострова обитают очень темные птицы с темно-зеленым оттенком верха и крупными черными пестринами на груди, которых многие зоологи считают самостоятельным видом **скалистый конек** — *Anthus littoralis*. Песня, как у лугового конька [446], но с металлическим оттенком, крик — тихое "цит".



Гольцовый конек
[454] — *Anthus rubescens*

Сверху очень темный, буrowатый, снизу охристый, грудь в крупных черных пестринах. Ноги черные.

Гнездится в тундрах от Таймыра до Чукотки, в высокогорьях от Прибайкалья до Курил. Голос как у горного конька.

18.3.2. Род Трясогузки — *Motacilla*

Размером с воробья. Наземные птицы бело-серо-черной или желто-серой окраски с очень длинным хвостом. Обычны в самых различных открытых ландшафтах, населенных пунктах, по берегам водоемов. Весной прилетают рано, когда реки еще скованы льдом; у многих народов существует поверье, что трясогузка хвостом взламывает лед, начиная ледоход.

В России не менее шести видов.




Белая трясогузка
[455] — *Motacilla alba*
(Таблица 38)

Окраска черно-серо-белая, различная в деталях у птиц из разных частей страны. Молодые птицы серые.

Гнездится в поймах рек, на берегах водоемов и в населенных пунктах по всей России, кроме некоторых районов Арктики. Обычна даже в больших городах. Камчатскую форму с черной полоской через глаз ряд исследователей считает самостоятельным видом **камчатская трясогузка** — *Motacilla lugens*. Гнезда расположены в дуплах, под крышами строений, в нишах и трещинах стен, скал и обрывов, иногда просто на земле под кочкой. В кладке 5-7 белых с серыми пятнами яиц. В последние годы часто остается зимовать и даже гнездится зимой в крупных парниковых хозяйствах Предкавказья. Голос — громкое "цити-тюри" и короткое "чтерличь".

В Южное Приморье и на Сахалин залетает **японская белая трясогузка** — *Motacilla grandis* [456], очень похожая на белую трясогузку, с черными головой и спиной, черно-белыми крыльями, белым брюхом, подбородком и бровью, молодые птицы с серой головой и белой бровью, голос — мягкое "джучжу".

Желтая трясогузка
[457] — *Motacilla flava*
(Таблица 38)




Верх головы у самца серый или черный, у самки серый, брюшная сторона тела желтая или охристая.

Спина серая, зеленоватая или черная. Ноги черные. Часто садится на кусты и высокие травинки.

Распространена по всей стране, кроме Сахалина, гор Кавказа и арктических тундр. Гнездится на сырых лугах, болотах, в горах, на заросших бурьяном пустырях. Гнездо на земле, обычно под кустиком травы, в кладке 5-7 зеленоватобелых с темными крапинками яиц. Голос — тихое "ци".


Желтоголовая трясогузка
[458] — *Motacilla citreola*
(Таблица 38)



Похожа на желтую трясогузку, но голова желтая или зеленоватая (молодые птицы неотличимы).

Распространена от Валдая и Архангельска до Вилюя и Забайкалья. Гнездится на болотах и сырых лугах. В

кладке 4-5 голубоватых с бурыми пятнами яиц. Песня — звонкий отрывистый щебет, крик — звонкое "тсюили".




Желтоголовая трясогузка
[459] — *Motacilla lutea*
(Таблица 38)

Очень похожа на желтоголовую и желтую трясогузку, но спина желтовато-зеленая, голова желтая или,

у птиц из восточной части ареала, черная с желтой бровью (молодые птицы неотличимы).

Распространена от Нижнего Поволжья до Южного Зауралья, в Южной Якутии, на севере Хабаровского края, Сахалине. Гнездится по сырым лугам и травянистым болотам и тростникам вблизи водоемов. Гнездо на земле. В кладке 4-5 голубовато-зеленых с пятнами яиц.



Горная трясогузка
[460] — *Motacilla cinerea*
(Таблица 38)

Хвост очень длинный (длиннее тела). Спинная сторона темно-серая (голова одного цвета со спиной), брюхо и надхвостье желтые, бровь белая.


Самки окрашены заметно тусклее. У самцов в весеннем наряде и летом горло и зоб черные. Ноги светлые.

Обитает по берегам быстрых, чаще горных рек и ручьев от Урала до Камчатки и Курил, на Кольском полуострове и на Кавказе. Гнезда строит под камнями или корнями растений на обрывах и в трещинах скал. В кладке 4-6 желтовато-серых с темными пятнами яиц. Голос — громкое "цитт".

18.3.3. Род Древесные трясогузки — *Dendronanthus*

Один дальневосточный вид.

Древесная трясогузка
[461] — *Dendronanthus*
indicus
 (Таблица 38)



Мелкая древесная птица с довольно длинным хвостом, серо-белая с черно-белыми крыльями и хвостом и двумя поперечными черными полосками на груди. Сидя, слегка покачивается из стороны в сторону. Кормится на деревьях или на земле.


Распространена на юге Дальнего Востока в смешанных и лиственных лесах, садах и парках, местами довольно обычна, хотя попадается на глаза гораздо реже, чем другие трясогузки. Гнездо — корзиночку из травы, паутины и лишайников — строит на ветке дерева. В кладке 5 голубовато-серых или розоватых с темными пестринами яиц. Голос — звонкое "пинь".

18.4. Семейство Личинкыедовые — *Campephagidae*

Мелкие длиннохвостые насекомоядные лесные птицы. В России один перелетный вид, обитающий на юге Дальнего Востока.

18.4.1. Род Личинкыеды — *Pericrocotus*

Серый личинкеед
[462] — *Pericrocotus*
divaricatus
 (Таблица 39)



Похож на белую трясогузку [455], но клюв чуть крючковатый, хвост ступенчатый, сидит на ветке вертикально, держится высоко в кронах деревьев, почти не спускаясь на землю. Верх головы и шеи у самца черный, у самки серый; через глаз проходит черная полоска, лоб и брюхо белые. Полет ныряю-

ший, заметны белые полосы на черной нижней стороне крыла. Часто попадает на глаза, когда сидит на сухой ветке или верхушке дерева, взлетая за пролетающими насекомыми, за что получил местное название "вершинник". В конце лета встречается небольшими стайками.


Обитает на юге Дальнего Востока, в смешанных и широколиственных лесах. Гнездо — постройка из травы, кедровой хвои и лишайников — строится на дереве. В кладке 4-5 голубоватых с темными пятнами яиц. Голос — звонкая мелодичная трель "хи-хи-рии", обычно слышен в полете.

18.5. Семейство Бюльбюлевые — *Rhyonotidae*

Древесные и кустарниковые птицы размером со скворца, с длинным хвостом. В углах рта щетинки. По всему телу есть тонкие волосовидные перья.

В России один редкий перелетный вид, обитающий на юге Дальнего Востока.

18.5.1. Род Короткопалые бюльбюли — *Microscelis*



**Короткопалый бюль-
бюль [463] —
Microscelis amaurotis
(Таблица 39)**

Спинная сторона серая с голубоватым оттенком, брюшная светлая с мелкими пестринами, на голове короткий округлый хохолок. Голова серебристо-седая, словно покрытая голубоватым инеем, щеки и нижняя сторона крыльев коричневые. На ветке сидит вертикально. Полет ныряющий.

Гнездится на острове Кунашир, на юге Сахалина и, вероятно, Приморья и острова Итуруп, на кустах и деревьях в разреженных лесах, обычно смешанных и лиственных. Питается ягодами, мелкими плодами и насекомыми. В кладке 4-5 светлых с крапинками яиц. Голос — тихий свист.

18.6. Семейство Сорокопутовые — *Laniidae*

Мелкие и средние (размером с дрозда) птицы с длинным клиновидным или ступенчатым хвостом, крючковатым клювом и широкой черной полосой через глаз. Крылья широкие, короткие, полет ныряющий. В углах рта щетинки.


Питаются крупными насекомыми, мелкими зверьками, птицами, лягушками и ящерицами, которых высматривают с присады — вершины куста, проводов или сухой ветки. Часто запасают корм, накалывая добычу на шип колючего куста или острый сучок.

Гнезда располагают в густых кустах, как правило, невысоко над землей. Окраска яиц весьма изменчива. Голос — резкое трескучее односложное или, чаще, двусложное (у японского сорокопута — четырехсложное) чириканье.

В России девять видов, в основном перелетных. В Европейской части страны чаще других сорокопутов встречается обыкновенный жулан [467].


18.6.1. Род Сорокопуть — *Lanius*

Серый сорокопут
[464] — *Lanius excubitor*
(Таблица 39)



Размером немного больше скворца. Самец и самка окрашены одинаково. Спинная сторона пепельно-серая, брюшная — белая (на Алтае встречаются темно-серые, а в Западной Сибири — очень светлые птицы), у молодых птиц с неясным чешуйчатым рисунком. Хвост и крылья черные с узкими белыми полосами.

Распространен по всей стране от лесотундр до степей, кроме Камчатки и Приморья. На юге ареала гнездится на открытых местах с зарослями кустарников, на севере в разреженных лесах по краю болот или старых гарей. Гнездо с обильной выстилкой из перьев располагает в кусте или на дереве. В кладке 5-9 зеленоватых с бурыми пятнами яиц. Некоторые птицы остаются на зимовку, иногда в населенных пунктах. Питается мелкими птицами, которых нередко ловит на лету, мышевидными грызунами, ящерицами, насекомыми. Почти повсюду редок.




Клинохвостый сорокопут [465] — *Lanius sphenocercus*
(Таблица 39)

Очень похож на серого сорокопута, но крупнее, на плечах и крыльях широкие

белые полосы, хвост резко ступенчатый, длиннее 12 см, надхвостье не светлее спины. Молодые птицы с мелким поперечным рисунком на груди.

Гнездится по пойменным лугам и на поросших кустарником склонах сопок в Южном Приморье, в кладке 5-6 белых с ржавыми пятнами яиц.




Чернолобый сорокопут [466] — *Lanius minor*
(Таблица 39)

Размером со скворца, окраской в целом похож на серого сорокопута [464], но лоб черный, бока груди с

розоватым оттенком, в полете на крыле заметно треугольное белое пятно.

Обитает в степной и лесостепной зонах, от западных границ России на восток до Алтая. Гнездится в группах деревьев или зарослях кустарников. Материалом для гнезда служат цветonoсные побеги полыни и других растений с примесью тонких веточек и корешков. В кладке 5-7 зеленоватых с буrowатыми пятнами яиц. Питается почти исключительно насекомыми и пауками.



Обыкновенный жулан [467] — *Lanius collurio*
(Таблица 39)


Мельче скворца, спина розовато-каштановая или светло-бурая, у самцов верх головы и надхвостье серые;

брюшная сторона белая с розоватым оттенком на груди, хвост у самцов черно-белый; у самок и молодых птиц хвост бурый,

на боках тонкий темный поперечный рисунок (у молодых также на голове и спине). В полете крыло без белых пятен или полос.

Распространен южнее зоны тундры, от западных границ России, доходя на востоке до Томска и Нерчинска. Гнездится на лесных опушках, вырубках, в садах и парках. В кладке от 4 до 7 яиц крайне разнообразной окраски: фон белый или розоватый, крап буроватый или серый.


Сибирский жулан
[468] — *Lanius cristatus*
(Таблица 39)



Похож на обыкновенного жулана, но спинная сторона рыжеватая, надхвостье рыжее, бровь широкая, белая. На крыле белое пятно. От японского сорокопута отличается рыжеватыми крыльями и хвостом. Молодые птицы с поперечным рисунком на боках.

Обычен в кустарниковых зарослях и на лесных опушках почти по всей Сибири и Дальнему Востоку южнее тундр.


Буланый сорокопут [469]
— *Lanius isabellinus*
(Таблица 39)



Самец очень похож на самца сибирского жулана, но на лбу над черной полоской проходит серая, белая бровь узкая, крыло без белого пятна. Самка очень похожа на самку обыкновенного жулана [467], но хвост рыжий.

Обитает в степных кустарниках Центрального Алтая и Тувы.


Японский сорокопут
[470] — *Lanius*
bucephalus
(Таблица 39)



Очень похож на сибирского жулана [468]. У самца верх головы и шеи корич-

невато-рыжий (иногда серый), спина и надхвостье серые, крылья и хвост буровато-черные, белая бровь широкая, в полете видно белое пятнышко на крыле. У самки голова рыжеватая, крылья и хвост бурые, брюхо рыжеватое с поперечным рисунком.

Гнездится на юге Приморья, Сахалина и Курил, в кладке 4-6 зеленоватых с серыми пятнами яиц.



Тигровый сорокопут
[471] — *Lanius tigrinus*
(Таблица 39)

Очень похож на обыкновенного жулана [467], но спина и хвост рыжие, у самца с узкими темными по-

перечными полосками; брюхо чисто-белое, у самки с темными поперечными крапинами на боках. От сибирского жулана [468] отличается голубовато-серой головой. Клюв толстый.

Редкий вид опушек смешанных лесов Южного Приморья. Наружные стенки гнезда облицованы цветоносными побегами полыни. В кладке 3-6 бледно-оранжевых или голубоватых с темными пятнами яиц.

В Европейскую часть России залетает (а в прошлом гнездился) **красноголовый сорокопут** — *Lanius senator* [472], (Таблица 39), с черной или бурой спиной, красно-каштановым верхом головы, белыми пятнами на крыле и плечах, белым надхвостом, гнездящийся в Закавказье и в Южной Европе.

18.7. Семейство Свиристелевые — *Bombycillidae*

Птицы размером со скворца, с густым пушистым оперением и большим хохлом на голове. Окраска розовато-серая, крылья черные с желтыми и белыми полосками, хвост, горло и полоска через глаз черные. Кончики второстепенных маховых перьев превращены в маленькие ярко-красные пластинки, заметные только вблизи.

Гнездятся небольшими колониями в разреженных хвойных и смешанных лесах, на зарастающих гарях и вырубках. Гнездо из тонких веточек, переплетенных лишайниками и


мхом, строят на хвойных деревьях. В кладке 4-6 голубоватых с бурыми пятнами яиц. Птенцов выкармливают насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и молодыми побегами растений. В иное время питаются преимущественно ягодами и плодами, например, брусникой, рябиной, калиной, омелью.

Зимой широко кочуют, появляясь большими стаями в городах, особенно в годы урожая рябины. Стайки ярких, шумных свиристелей настолько бросаются в глаза, что даже вечно спешащие москвичи обращают на них внимание. В зависимости от степени знакомства с биологией горожане нередко называют их "хохлатыми синицами", "петушками" и даже "попугайчиками". В период размножения свиристели очень скрытны, и видеть их летом доводилось немногим.

В России два вида.

18.7.1. Род Свиристели — *Bombycilla*


Обыкновенный свиристель [473] —
Bombycilla garrulus
(Таблица 39)



По краю хвоста желтая полоса, на крыле узкая белая полоска.

Распространен почти по всей таежной зоне страны. Довольно обычен, хотя численность в отдельных районах сильно меняется по годам. Зимой чаще всего встречается на юге страны, а поздней осенью и ранней весной — в Средней полосе. Голос — нежная журчащая трель "свиририри".

Японский свиристель [474] —
Bombycilla japonica
(Таблица 39)



По краю хвоста красная полоса, на брюхе желтоватое пятно, у самцов красное подхвостье.

Гнездится в кедровых и лиственничных лесах Приамурья, Алдана и северного Сахалина, зимует на юге Дальнего Востока. Голос — тонкий нежный свист.


18.8. Семейство Иволговые — *Oriolidae*

Птицы крупнее скворца, с несколько удлинённым телом, самцы и иногда самки очень ярко окрашены. Обычно держатся высоко в кронах деревьев.

Обитают в светлых высокоствольных лиственных и смешанных лесах, садах и парках. Гнезда сплетают в развилке тонких горизонтальных ветвей, причем края гнезда оплетают ветки, на которые оно опирается, образуя подобие гамака. В кладке 3-4 белых с темными пятнами яиц. Держатся в основном в кронах деревьев. Питаются насекомыми, в том числе крупными волосатыми гусеницами, которых не ест почти никто из других птиц, а также плодами и ягодами. Голос — резкое мяуканье "вжяаа" и флейтовый свист "фиу-у-лиу".

В России два перелетных вида.


18.8.1. Род Иволги — *Oriolus*



Обыкновенная иволга
[475] — *Oriolus oriolus*
(Таблица 40)

Самец ярко-желтый, черные полосы через глаз не соединяются на затылке, самки и молодые птицы желтовато-зеленые со светлым в пестринах брюшком.

Гнездится в Средней полосе и на юге на восток до Тувы.



Китайская иволга
[476] — *Oriolus chinensis*
(Таблица 40)

Взрослые птицы ярко-желтые, черная полоска проходит через затылок, у

молодых птиц спинная сторона оливковая, брюшко светлое с пестринами.

Гнездится на юге Дальнего Востока и, возможно, Забайкалья.

18.9. Семейство Трупияловые — *Icteridae*

Американские птицы, обычно несколько похожие на скворцов. На Чукотку залетал **ржавчатый трупиял** — *Euphagus carolinus* [477], (Таблица 40), черный с металлическим блеском, перья осенью с рыжими каемками, так что птица кажется коричневой, хвост длинный, закрученный, клюв длинный и острый, глаза светлые. Голос — высокий мяукающий крик.

18.10. Семейство Скворцовые — *Sturnidae*

Небольшие птицы с довольно длинным клювом, широкими острыми крыльями. Полет прямой, быстрый, частые взмахи крыльев чередуются с коротким планированием.

Питаются различной животной и растительной пищей, по окончании периода гнездования собираются большими плотными стаями. В кладке 3–8 чисто белых или голубых яиц. У большинства скворцов грубоватый голос, но песня довольно красива. Многие виды при содержании в неволе обучаются подражать человеческой речи.


В России два рода, из которых в Европейской части обычны только обыкновенный и (на юге) розовый скворцы [478, 479].

18.10.1. Род Скворцы — *Sturnus*

В России пять перелетных видов.

Обыкновенный скворец
[478] — *Sturnus vulgaris*
(Таблица 40)


Короткохвостый, блестяще-черный, осенью и зимой в частых белых крапинках. К весне светлые кончики



перьев стираются, и крапинки исчезают. Молодые птицы темно-бурые со светлым горлом.

Распространен от западных границ России до Забайкалья, залетает на юг Дальнего Востока. На севере ареала по сельскохозяйственным районам доходит до северной тайги. Обычен в редколесьях, степях и населенных пунктах. Гнездится в нишах стен, дуплах, реже норах. Зимой встречается на Кавказе и кое-где в больших городах, причем нередко стаи скворцов из года в год зимуют в одних и тех же скверах и парках. Песня состоит из свистов, скрипов, подражаний другим птицам и различным шумам. Иногда в песне вернувшегося с зимовки скворца можно услышать голоса субтропических птиц. Крик — разнообразные мяукающие звуки, часто слышные из летящей стаи.


На юге страны стаи скворцов иногда наносят большой ущерб садам и виноградникам.



Розовый скворец
[479] — *Sturnus roseus*
(Таблица 40)

Розовый с черными головой, хохлом, крыльями и хвостом. Молодые птицы серовато-бурые со светлым брюхом.

Распространен на юге России от Приазовья до Алтая, возможно, в Туве. Залетает в Среднюю полосу и на юг Дальнего Востока. Селится колониями в щелях скал и обрывов, между камнями, в норах в степной зоне. Питается преимущественно саранчой, при ее массовых залетах иногда собираются стаи скворцов до сотен тысяч птиц. Голос — резкие хриплые и скрипучие звуки. Кое-где образует большие колонии, но в большинстве мест редок.




Серый скворец [480] —
Sturnus cineraceus
(Таблица 40)

Дымчато-серый с белым брюшком и надхвостьем; у самцов голова белая или черная в густых бе-

лых пестринах, у самок черно-бурая; клюв и ноги оранжево-желтые.

Гнездится на юге Забайкалья и Дальнего Востока колониями в лесах, рощах и поселках. Гнезда устраивает в дуплах. На юге Дальнего Востока, возможно, зимует. Голос — резкий треск.


Малый скворец [481] —
Sturnus sturninus
(Таблица 40)



Светло-серый с блестяще-черными спиной, крыльями и хвостом. По бокам спины белые полосы, на крыле — белые и желтые, у самца на затылке черное пятно, надхвостье рыжеватое, клюв и глаза черные, ноги серые. У летящей птицы видны светлые подхвостье и пятна на крыльях.

Гнездится на юге Забайкалья, в Приамурье и Приморье в дуплах по лиственным перелескам и опушкам. Довольно редок. Залетает на Сахалин. Песня состоит из свистов, трелей, подражаний другим птицам, крик — резкий треск.

Японский скворец
[482] — *Sturnus*
philippensis
(Таблица 40)




Похож на малого скворца, но вся спина темная, у самца бока головы и надхвостье рыжие, а на крыле белая полоса. Клюв, глаза и ноги черные.

Редкий вид юга Приморья, Сахалина и Курил. Гнездится в дуплах в лиственных лесах, строениях. Голос как у малого скворца.

В Приморье залетал китайский скворец — *Sturnus sinensis* [483], (Таблица 40), серый с белыми пятнами на хвосте, белыми крыльями с черными кончиками, серыми ногами, глазами и клювом.

18.10.2. Род Майны — *Acridotheres*

В России один редкий вид.



Майна [484] —
Acridotheres tristis
(Таблица 40)

Большоголовая, размером со скворца, птица с желтым клювом, бурая с черной головой, черно-белыми

крыльями и белым концом хвоста. Под глазом желтое пятно.

Обычна в Средней и Южной Азии. В 1970-х годах завозилась в Россию в качестве клеточной птицы. Улетевшие случайно или выпущенные на свободу майны с тех пор прижились в Москве и некоторых других городах. Селится небольшими колониями в различных укрытиях, в кладке 3-6 голубых яиц. Голос — скрипучие хриплые крики и свисты, подражание другим птицам и различным шумам. Легко обучается говорить.

18.11. Семейство Дронговые — *Dicruridae*

Блестяще-черные птицы размером со скворца с очень длинным хвостом. Часто сидят на проводах или одиночных торчащих ветках, взлетая за пролетающими насекомыми. В Приморье и на Сахалин залетали два китайских вида: **черный дронго — *Dicrurus macrocercus* [485]**, (Таблица 40), с глубоко вильчатым хвостом; и **индийский дронго — *Dicrurus hottentotus* [486]**, (Таблица 40), с широким, прямым хвостом, крайние перья которого изогнуты вверх.

18.12. Семейство Врановые — *Corvidae*

Самые крупные из воробьиных птиц (вес ворона достигает 1,5 кг) с сильным клювом и широкими крыльями. В полете несколько напоминают хищных птиц семейства ястребиных, но отличаются более длинным, прямым или чуть изогнутым книзу клювом.

Всеядны, но некоторые виды питаются в основном семенами хвойных деревьев. Врановые — очень сообразительные птицы, некоторые из них научились жить рядом с человеком и в последние десятилетия многократно увеличили свою численность.

Тревожные крики соек и сорок часто позволяют обнаруживать в лесу мелких хищных зверей, сов и другие интересные вещи. Эти громкие звуки служат сигналом тревоги не только для других сорок и соек — его отлично понимают многие обитатели леса. Любой охотник может припомнить случай, когда крик сороки в последний момент спугнул зверя и вся охота пошла насмарку.


В России семь родов.

18.12.1. Род Вороны — *Corvus*

Черные или черно-серые с металлическим блеском, клюв черный, у взрослых грачей с белым основанием. Полет машущий с редкими взмахами крыльев или парящий. В ветреные дни часто занимаются "воздушной акробатикой", паря вокруг высоких зданий, шпилей, колоколен. Характерна привычка собираться на групповые ночевки. В кладке 3-7 зеленовато-голубых с бурными крапинками яиц.

В России семь видов.

**Ворон [487] — *Corvus*
corax
(Таблица 41)**



Примерно в полтора раза больше вороны, полностью черный с синеватым металлическим отливом, молодые птицы с чуть буроватыми концами крыльев. Клюв очень мощный. Хвост клиновидный (в отличие от ворон и грача [491]), что особенно заметно в полете. Перья на горле заострены, птица то и дело их топорщит, словно бороду. Чаше парит и реже машет крыльями в полете, чем другие врановые.

Распространен почти по всей России. Массивные гнезда строит на деревьях, скалах, опорах ЛЭП, иногда на земле. В последние годы стал встречаться в населенных пунктах, где

гнездится на высоких зданиях. Взрослые вороны обычно зимуют на гнездовых участках, молодые кочуют, собираясь на ночлег большими стаями. Питается как живой добычей (грызунами, птицами, яйцами и птенцами, лягушками, ящерицами), так и падалью. В Сибири, где народные поверья запрещают стрелять в ворона, он иногда сопровождает охотников или прилетает на звук выстрела, чтобы поживиться остатками добычи. Порой следует также за стаями волков. Голос — громкое трубное гортанное "крук", разнообразное карканье, барабанные дробы.

Ворон занимает важное место в фольклоре и мифологии северных народов. В сказках коренных жителей Севера ворон играет примерно ту же роль, что лисица — в русских сказках.



Серая ворона [488] —
Corvus corax
(Таблица 41)

Серая с черной головой, крыльями и хвостом.


Гнездится на деревьях, скалах, тростниковых залемах

в пойменных лесах, зарослях тростника, населенных пунктах почти повсюду к западу от Енисея. В окрестностях свалок и промышленных предприятий иногда строит гнезда из кусков проводов и обрывков проволоки. При попытке разорить гнездо или поймать птенца-слетка на тревожный крик родителей собираются десятки птиц, и самые смелые даже могут надавать обидчику тумаков клювом и крыльями. Зимой частично откочевывает к югу или в города, где собирается огромными стаями, кормясь на свалках. Голос — хриплое "карр" и другие звуки.

Эти сообразительные птицы прекрасно приспособились к соседству человека. В последние годы они, например, научились систематически проверять вывешенные зимой за окно сумки с продуктами. Умеют поднимать крыши скворечников, если они не прикручены проволокой. Быстрый рост численности ворон привел к тому, что в городах Европейской части страны почти не осталось мелких птиц, кроме воробьев и стрижей. Вороны разоряют множество гнезд водоплавающих и даже хищных птиц.

Черная ворона [489] —
Corvus corone
 (Таблица 41)


Полностью черная, голова с фиолетовым блеском, лоб покатый (в отличие от большеклювой вороны и грача [490, 491]).



Гнездится на деревьях в лесах и населенных пунктах почти повсюду восточнее Енисея и Алтая, изредка залетает в Европейскую часть России. Иногда встречаются гибриды с серой вороной, темно-серые с черной головой, хвостом и крыльями. Зимой из северной части ареала откочевывает на юг и большими стаями появляется в городах и поселках. Голос — хриплое "корр" и другие звуки.

Большеклювая ворона [490] — *Corvus*
macrorhynchos
 (Таблица 41)


Полностью черная, голова с зеленым отливом, клюв мощный (у основания выше 2 см), лоб крутой.



Гнездится и зимует в лесах (в основном пойменных) и парках юга Дальнего Востока. Гнезда на деревьях. Голос — звонкое "кроо" или "кау".

Грач [491] — *Corvus*
frugilegus
 (Таблица 41)


Полностью черный; клюв более тонкий, чем у ворон, прямой, у взрослых птиц с белым основанием и белой голой кожей вокруг клюва. Крылья несколько уже, чем у ворон, оперение голеней слегка удлинено и как бы взлохмачено. Гораздо чаще ворон кормится на полях.



Гнездится колониями на деревьях в лесостепи и культурном ландшафте почти повсюду, кроме большей части Сибири и Дальнего Востока. Обычен к югу от лесной зоны, а в центральных областях, вероятно, появился лишь во время сельскохозяйственного освоения в IX-XII веках. В Центральной Якутии селится на лугах, образующихся среди тайги на участках с нарушенной вечной мерзлотой. Колонии-грачевники иногда существуют десятки лет.

Зимует на юге России, некоторые птицы — вместе с воронами и галками в населенных пунктах Средней полосы. Такие зимующие особи порой попадают на глаза журналистам, и, начиная с середины февраля наши газеты по очереди сообщают о "необычно раннем прилете грачей". Голос — хриплое "краа".

Во время весенней пахоты грачи поедают в огромном количестве проволочника (личинки жука-шелкуна) и других вредителей сельского хозяйства. Позже они с не меньшим энтузиазмом выдергивают всходы пшеницы и других культур, так что не всегда можно с уверенностью сказать, чего от них больше — пользы или вреда. Тем не менее на Руси грачей всегда берегли, считая их первыми вестниками весны (на самом деле крупные чайки обычно прилетают несколько раньше).




Обыкновенная галка
[492] — *Corvus monedula*
(Таблица 41)

Размером примерно с голубя, черная с серыми шеей и верхом головы. Глаза у взрослых птиц светлые, голубые, у молодых темные. В полете отличается от ворон и грача [488-491] слабым клювом, короткими крыльями и узким хвостом.

Гнездится в городах на высоких зданиях, в дуплах в пойменных лесах и парках, в норах и на обрывах в степях по всей Средней полосе и югу на восток до Енисея; часто колониями. На Кавказе и Алтае поднимается высоко в горы, где гнездится в скалах. Зимует в населенных пунктах, где обычно встречается вместе с воронами. Голос — звонкое "кау" или "кья".

Галки обладают отличной памятью, они могут в течение долгих лет поднимать крик при виде человека, разорившего в детстве гнездо, и научить этому следующие поколения галчат.

Даурская галка [493] —
Corvus dauricus
(Таблица 41)



Взрослые серые или почти белые с черными головой, крыльями и хвостом. Молодые черные с темно-серой шеей и белым зашейком. Встречаются также молодые птицы, почти не отличающиеся от обыкновенной галки.


Гнездится и зимует в Центральном Алтае и от Тувы до Приморья в степях и предгорьях, зимой появляется стаями в культурном ландшафте, но всегда гораздо более осторожна, чем обыкновенная галка. Голос как у обыкновенной галки.

18.12.2. Род Клушицы — *Pyrrhoroax*

Блестяще-черные птицы размером меньше вороны, с тонким красным или желтым клювом и красными (у взрослых) ногами. Полет уверенный, изящный, часто выписывают фигуры высшего пилотажа над отдельными горными вершинами или стремительно пикируют с них, свистя крыльями.


Гнездятся и зимуют в горах, гнезда в трещинах и нишах скал, в кладке 3-9 серовато-зеленых с бурыми крапинками яиц. Два вида.

Клушица [494] —
Pyrrhoroax pyrrhoroax
(Таблица 41)



Клюв изогнутый, красный, у молодых оранжевый.

Гнездится на Кавказе, Алтае, Саянах, в Туве, Забайкалье и, возможно, Енисейском крае, зимой иногда появляется в безлесных предгорьях, а также у альпинистских лагерей, кошар, горных аулов. Голос — звонкое "клиа".




Альпийская галка
[495] — *Ruphobora*
graculus
 (Таблица 41)

Клюв прямой, желтый, крылья несколько уже, чем у клушицы, а хвост длиннее.

Гнездится в высокогорьях Кавказа и Алтая, иногда в зоне вечных снегов. Голос — тихое "кири" и звонкое "криа". В Гималаях отмечено гнездование этого вида на высоте 7000 м над уровнем моря — рекорд среди птиц.

18.12.3. Род Кедровки — *Nucifraga*

В России один вид.



Кедровка [496] —
Nucifraga caryocatactes
 (Таблица 41)

Птица размером чуть больше голубя, коричневая (реже почти черная) в частых белых пестринах; верх

головы, крылья и хвост черные; конец хвоста и надхвостье белые; клюв длинный, черный, чуть изогнутый книзу. Полет тяжелый, крылья короткие и очень широкие. Часто сидит на торчащих ветках или сухих верхушках деревьев.

Гнездится и зимует почти по всей лесной зоне, местами в лесотундре и горных стланиках, на деревьях или скалах. В кладке 4-5 зеленоватых с темными пятнами яиц. Питается в основном семенами кедра, лещины, дуба. Для кедровки характерна привычка прятать в укромные места семена про запас. О большей части подобных "кладовых" птица потом не вспоминает, а семена впоследствии прорастают. Вероятно, без этих птиц не было бы большей части сибирских кедровников — ведь кедровые орешки, в отличие от семян других наших хвойных, не переносятся ветром.

В отдельные годы при неурожае кедровых орехов большие стаи кедровок мигрируют за пределы гнездового ареала. В Средней Европе, где они появляются раз в несколько де-


сятилетий. этих птиц считали предвестниками войн, эпидемий и голода.

Голос — хриплое долгое "рээж" или "крэй".

18.12.4. Род Кукши — *Perisoreus*

В России один вид.

Кукша [497] —
Perisoreus infaustus
(Таблица 41)



Птица с рыхлым пушистым оперением размером чуть меньше голубя, серовато-бурая с темными крыльями, хвост длинный, рыжий с черной продольной полосой, на сгибе крыла рыжее пятно. Клюв короткий, голова большая, округлая. Полет тяжелый, с широко развернутым хвостом.

Гнездится и зимует почти по всей таежной зоне, особенно в лиственничных и сырых еловых лесах. Гнезда строит на деревьях в тайге, обычно очень рано, в кладке 3-5 зеленовато-серых с темными пятнами яиц. В Восточной Сибири самки иногда начинают насиживание при температуре -30°C ; в это время птица так плотно сидит на гнезде, что позволяет поворачивать себя для фотографирования.


Сибирские охотники не любят кукшу, потому что она часто попадает в капканы, поставленные на пушных зверьков. Только жители Оймяконской котловины относятся к ней с симпатией — ведь это одна из немногих птиц, способных оставаться здесь на зиму и выдерживать 70-градусные морозы. Зимние ночи кукша нередко проводит, зарывшись в снег или спрятавшись в старое гнездо белки.

Песня — набор свистов и глухих звуков, крик — громкое "кжээ" и низкое "куук".

На Чукотке возможны встречи **канадской кукши** — ***Perisoreus canadensis***, серой с белым лбом, щеками и горлом.

18.12.5. Род Сойки — *Garrulus*

В России один широко распространенный вид.




Сойка [498] — *Garrulus glandarius*
(Таблица 41)

Мельче вороны, буровато-серая с коротким круглым хохлом. Крылья, хвост и "усы" черные, горло, надхвостье и пятна на крыльях белые, на сгибе крыла ярко-голубое с черными полосками "зеркальце". Очень подвижная, шумная птица. Полет тяжелый, с частыми взмахами широких крыльев. Верх головы у европейских птиц светлый, у сибирских — рыжий, у кавказских — черный.

Гнездится и зимует в Средней полосе и на юге страны на деревьях в лесах (чаще лиственных и смешанных), в кладке 5-7 зеленоватых с бурыми пятнами яиц. Песня — громкий треск и подражания другим птицам, крик — резкое "чжээ". При содержании в неволе иногда обучается подражать человеческой речи.

18.12.6. Род Сороки — *Pica*

В России один широко распространенный вид.



Сорока [499] — *Pica pica*
(Таблица 41)

Черно-белая птица с очень длинным ступенчатым хвостом. Полет — чередование частых взмахов

и скольжения на расправленных широких крыльях.

Распространена почти по всей стране, кроме тундр и большей части Восточной Сибири. Нередко встречается в поселках и городских парках. Гнездо с крышей из веток строит в лесу или в зарослях густых кустарников. В кладке 5-8 голубоватых с бурыми пятнами яиц. Оседла или совершает недалекие кочевки. Голос — резкое стрекотание.


Подобно ящерице, сорока нередко оставляет свой длинный хвост в зубах или когтях хищника. Вплоть до следующей линьки, когда перья хвоста отрастут заново, несчастная

птица представляет собой неуклюжий черно-белый комок, перьев, едва способный летать.

18.12.7. Род Голубые сороки — *Syaenoria*

Один дальневосточный вид.

Голубая сорока [500] —
Syaenoria syanus
(Таблица 41)



Спина серая, крылья и хвост голубые, низ и кончик хвоста белые, на голове черая шапочка, хвост очень длинный, ступенчатый.

Гнездится и зимует на юге Дальнего Востока, Забайкалья и, возможно, Иркутской обл. в широколиственных и пойменных лесах, в кладке 3-7 голубоватых с темными крапинками яиц. Летом часто появляется на рассвете в таежных поселках, чтобы собрать насекомых, слетевшихся за ночь под фонари. Голос — громкое "чииль-чинь-чинь".

Весной, когда голубые сороки собирают материал для гнезда, их можно увидеть на спинах оленей и других крупных зверей. Звери в это время линяют, и сороки клочьями выдергивают у них старую шерсть и пух.

В Южной Туве может быть встречена **монгольская сойка** — ***Podoces hendersoni*** (Таблица 40), гнездящаяся в сопредельных районах Монголии. Это серо-рыжая птица с длинным изогнутым книзу клювом, черными крыльями, хвостом и верхом головы. В полете бросается в глаза белая полоса на крыле. Взлетает неохотно, зато очень быстро бегаёт. Иногда встречается в безводных каменистых пустынях, где практически нет других птиц. Голос — резкий свист.

18.13. Семейство Крапивниковые — *Troglodytidae*

Мелкие и очень мелкие подвижные насекомоядные птицы, легко узнаются по плотному сложению и короткому, поднятому вверх хвосту. Крылья очень короткие и широкие, полет прямолинейный, обычно низко над землей или водой.

Гнездо — большой шар с боковым входом из мелких веточек, мха и корней, в кладке 4-7 белых (у крапивника до 8 белых с красноватыми крапинками) яиц. Песня — громкая звонкая трель, крик — резкое "черр" или "дзит".


В России три вида.

18.13.1. Род Оляпки — *Cinclus*

Темно-бурые птицы размером со скворца с очень густым, несмачивающимся оперением. Хорошо плавают. Питаются водными насекомыми и рачками, которых собирают среди камней на отмелях или ныряя под воду и бегая по дну быстротекущих ручьев и речек. Под водой раскрывают крылья так, что сила потока прижимает птицу ко дну, а сложив их — пробкой всплывают. Нырять в стоячей или медленно текущей воде не могут.

Гнездятся по берегам быстрых прозрачных рек, нередко под водопадами. Зимуют на незамерзающих участках рек.


У многих коренных жителей Севера принято вешать над колыбелью ребенка крылышко оляпки, чтобы он, когда вырастет, тоже не боялся холода и воды.



Обыкновенная оляпка
[501] — *Cinclus cinclus*
(Таблица 50)

Горло, грудь, а у азиатских птиц также брюшко белые; молодые серые с темным чешуйчатым рисунком.

Гнездится в Карелии, на Кольском полуострове, Урале, Кавказе, в Южной Сибири, зимует в предгорьях, некоторые птицы зимой кочуют по северу Европейской части России.



Бурая оляпка [502] —
Cinclus pallasii
(Таблица 50)

Окраска полностью бурая, молодые темные с серым чешуйчатым рисунком.

Гнездится в горах Даль-


него Востока, доходя на север до Камчатки и верхней Колымы, на зимовке отмечена в горах Сунтар-Хаяты, где ныряет в горные ручьи при температуре -60 С.

На севере Дальнего Востока возможны встречи североамериканской мексиканской оляпки — *Cinclus mexicanus*, однотонно-серой окраски.

18.13.2. Род Крапивники — *Troglodytes*

В России один вид.

Крапивник [503] —
Troglodytes troglodytes
(Таблица 50)



Очень мелкая, почти вдвое мельче воробья, птичка (одна из самых мелких в фауне России), каштаново-бурая с темным поперечным рисунком. Короткий хвост поднят вверх. От мелких представителей семейства славковых отличается отсутствием светлой брови.

Распространен в лесах и горах Европейской части России, Юго-Восточной Сибири, Дальнего Востока, Камчатки, Командор и Курил, возможно, на Алтае. В южных районах России зимует. Обитает в различных типах лесов с густым подлеском, как правило, недалеко от воды. Похожий на крошечный пушистый шарик, шустрый крапивник своей звонкой песенкой нередко оживляет самые глухие и мрачные уголки леса. Гнезда располагает под корнями или в кронах упавших деревьев, в кучах валежника, камней, на ветках елей, за отставшей корой или в других укрытиях. Шарообразная постройка с боковым входом из веточек и мха часто маскируется снаружи сухими листьями папоротников. Самец строит на участке основу нескольких гнезд, а окончательный выбор делает самка, она же выстилает лоток перьями и шерстью. Остальные гнезда в период насиживания самкой кладки используются для ночлега самцом. Иногда одно гнездо занимает на протяжении нескольких лет. Питается насекомыми и пауками. Песня, громкая напористая трель, бывает слышна до поздней осени.


18.14. Семейство Завирушковые — *Prunellidae*

Мелкие (с воробья) птицы буроватой окраски с темными пестринами, отличающиеся от воробьев [685-688] и горных выюрков [663-667] более тонким клювом. По земле передвигаются не прыжками, а шагом. Встречаются обычно поодиночке или парами. Ноздри прикрыты кожистыми крышечками.

Обитают в тайге, лесотундре и высокогорьях. Гнездо сделано из мелких веточек и большого количества зеленого мха, располагается невысоко на дереве или на земле. В кладке 4-6 ярко-голубых яиц. Песня — громкая трель, крик — тихое чирикание или короткая трель. Питаются насекомыми, зимой иногда семенами растений. Местами довольно обычны, но из-за скрытного образа жизни редко попадают на глаза.

В России семь видов.


18.14.1. Род Завирушки — *Prunella*



Лесная завирушка
[504] — *Prunella modularis*
(Таблица 42)

Спина буроватая, брюшко темно-серое, по бокам размытые бурые пестрины.

Распространена в Европейской части России, Западной Сибири, на Кавказе. Гнездится в подлеске преимущественно хвойных лесов, в старых парках. Гнезда, как правило, строит на молодых елочках. Поющий самец обычно сидит на вершине ели. Зимой может быть встречена в предгорьях Кавказа и дельте Волги.




Японская завирушка
[505] — *Prunella rubida*
(Таблица 42)

Очень похожа на лесную завирушку, но темнее: верх с шоколадным оттенком, брюшко почти черное в черных продольных пестринах.

Обитает в горах на Южных Курилах и Сахалине. Гнездится на кустах в поясе стланиковой растительности. Отдельные птицы зимуют в горных лесах.

Черногорлая завирушка
[506] — *Prunella atrogularis*
(Таблица 42)


Похожа на лесную завирушку [504], но голова черная с белой бровью, брюшко охристое.



Обитает на Северном Урале, Алтае, в Архангельской области. Гнездится в глухих хвойных лесах на кустах или невысоко на деревьях. Отдельные птицы зимуют в предгорьях.

Сибирская завирушка
[507] — *Prunella montanella*
(Таблица 42)


Очень похожа на черногорлую завирушку, но горло светлое, надхвостье серое, бровь и брюхо желтовато-охристые.




Распространена в северной тайге, лесотундре и горных лесах Сибири, в горах Дальнего Востока. Гнездится невысоко на деревьях. Самец поет, сидя на вершине дерева. Зимует на юге Приморья.

Бледная завирушка
[508] — *Prunella fulvescens*
(Таблица 42)

Похожа на черногорлую [506] и сибирскую завирушек, но окраска сероватая, горло и низ светлые.



Гнездится на земле в горах у верхней границы леса на Алтае, в Саянах, Прибайкалье и, возможно, Становом нагорье. Зимой кочует в предгорьях.




Альпийская завирушка
[509] — *Prunella collaris*
(Таблица 42)

Самая крупная из завирушек (почти со скворца), буровато-серая с черноватыми крыльями и хвостом,

горло светлое с черными пестринами, бока с ржавым оттенком (у молодых птиц бока и горло буро-серые), по бокам хвоста белые пятна.

Гнездится в трещинах скал и под камнями в высокогорьях Кавказа, юга Сибири и Дальнего Востока. Зимой кочует по горным лесам.



Гималайская завирушка
[510] — *Prunella himalayana*
(Таблица 42)

Похожа на альпийскую завирушку, но мельче, грудь с рыжими пятнами, на гор-

ле чисто-белое пятно, бока пестрые.

Обитает в высокогорьях Алтая, Саян и Прибайкалья. Гнездится на земле.

18.15. Семейство Дроздовые — *Turdidae*

К этому семейству относятся такие всем известные птицы, как дрозды, соловьи, горихвостки, зарянки, каменки. У многих видов самцы окрашены гораздо ярче самок. Молодые обычно менее яркие, но более пестрые из-за светлых и темных каемок перьев. Характерна привычка сидеть с несколько опущенными крыльями, при этом птицы многих видов покачивают хвостом.

Все дроздовые — в основном насекомоядные птицы, но поедают также ягоды и семена. Большинство видов перелетные, но некоторые зимой только кочуют.

В России девять родов, с которыми можно встретиться практически всюду от тундры до пустынь.


18.15.1. Род Дрозды — *Turdus*

Птицы размером со скворца или крупнее, с относительно длинными крыльями и хвостом. Питаются дождевыми червями, моллюсками, насекомыми, которых собирают на земле, роясь в подстилке. Гнездо — глубокая чашечка из травы, веточек, земли, древесной трухи — устраивается на земле, в развилке дерева или в кустах. Осенью и зимой некоторые виды собираются в стаи и кочуют, питаясь преимущественно семенами и ягодами.

В России 13 видов.

Рябинник [511] —
Turdus pilaris
 (Таблица 43)


Крупный дрозд, верх головы и надхвостье голубовато-серые, брюшко и крыло снизу белые, спина каштаново-бурая, крылья и хвост темные, грудь и бока охристые с черными пестринами.



Распространен от западных границ России на восток до рек Алдан и Витим, а также на Сахалине. Гнездится небольшими, до 20-30 пар, разреженными колониями в светлых лесах и парках повсюду по лесной и лесостепной зонам, местами заходит и в южные тундры. Гнездо, сделанное в основном из соломы и мелких веточек, тяжелое, с большим количеством земли; располагается, как правило, на кустах, деревьях, поваленных стволах, редко на земле. В кладке 4-8 зеленоватых с бурыми пятнами яиц. У гнезда птицы ведут себя очень шумно, летая неподалеку с громкими криками. Зимой кочует в основном по югу страны, в последние годы большие стаи рябинников нередко зимуют в парках и скверах городов Европейской части России. Голос — громкий треск.


Деряба [512] — *Turdus*
viscivorus
 (Таблица 43)

Крупный дрозд (немного меньше голубя), спинная сторона оливково-серая с кремовым оттенком, брюш-



ко белое с яркими черными пестринами, крыло снизу белое. Полет с чередованием частых взмахов и скольжения со сложенными крыльями.

Распространен в лесах и лесостепях Европейской части России, Кавказа, Зауралья и юга Сибири на восток до Байкала. Довольно редок, колоний не образует. Гнездо с большим количеством мха и лишайников располагает чаще на соснах и других деревьях. В кладке 4-5 голубоватых или розоватых с серыми и бурыми пятнами яиц. Песня — громкие флейтовые свисты, крик — громкий треск.




Белобровик [513] —
Turdus iliacus
(Таблица 43)

Мелкий дрозд (со скворца), спинная сторона оливково-бурая, брюшко белое с черными крапинами,

крыло снизу и бока ржаво-рыжие, над глазом желтовато-белая бровь.

Обычен в лесах и лесотундре от западных границ России до Байкала, Якутска и низовий Колымы. Зимой кочующих птиц можно встретить на Кавказе, часто в стаях рябинников. Гнездо из соломы и мелких веточек с большим количеством земли располагается, как правило, на земле или невысоко над ней. В кладке 5-6 голубовато-зеленых с красноватыми пятнами яиц. Песня — треск и свистовые трели, крик — громкий треск.



Певчий дрозд [514] —
Turdus philomelos
(Таблица 43)


Спинная сторона оливково-серая, бока бледно-охристые, на груди и брюшке округлые темные пестрины,

крыло снизу светло-рыжее.

Обитает в лесах и лесостепях на восток до Байкала, на Кавказе. Гнездо строит в основном из еловых веточек и ли-

шайников, лоток обмазывает размоленной древесной трухой, так что в готовом гнезде ровные, почти гладкие стенки. В кладке 4-7 ярко-голубых с черными пятнами яиц. Песня — громкая звучная свистовая трель, более или менее передаваемая фразой "спиридон-спиридон-чайпить-чайпить-витю-витю", крик — резкое циканье и треск.


Рыжий дрозд [515] —
Turdus naumanni
 (Таблица 43)



Среднего размера (больше скворца), спинная сторона рыжевато-серая, зоб, грудь и бока ржаво-рыжие с чешуйчатым рисунком, образованным светлыми каемками перьев, брюхо белое. Рулевые перья рыжие, кроме бурой средней пары. Крылья сверху рыжеватые, в отличие от оливкового дрозда. Над глазом беловато-охристая бровь.


Обычен в тайге и горах от Енисея до Колымы и Охотского побережья, на юг до северного Байкала. В кладке 4-5 зеленых с бурыми пятнами яиц. Песня — красивый свист, крик — резкое "чак-чак".

Бурый дрозд [516] —
Turdus eunomus
 (Таблица 43)



Спинная сторона темно-бурая, часто с чешуйчатым рисунком, крылья ржаво-коричневые, горло светло-охристое, грудь и бока белые с темным чешуйчатым рисунком. Хвост темно-бурый. Над глазом беловато-охристая бровь.

Обычен в тундре и тайге к востоку от реки Таз и Восточного Саяна, зимой встречается на юге Приморья, Сахалина и Курил. В кладке 4-5 зеленых с ржавыми пятнами яиц. Песня — громкий свист, крик — резкое "чак-чак". Возможны встречи гибридов бурого и рыжего дроздов, промежуточных по окраске.




Чернозобый дрозд [517]
— *Turdus atrogularis*
(Таблица 43)

Среднего размера, спинная сторона оливково-серая, брюшко и бока белые, горло и зоб у самцов черные,

у самок буроватые с темными пестринами. Крыло снизу охристое со светлым или бурым пятном.

Распространен в лесах от верховий Камы и Урала до Енисея. Зимой встречается на юге Западной Сибири. В кладке 4-7 голубоватых с коричневыми пятнами яиц. Песня — треск, крик — резкое "чак-чак".




Краснозобый дрозд [518] — *Turdus ruficollis*
(Таблица 43)

Дрозд среднего размера, спинная сторона оливково-серая, брюшко и бока белые, горло и зоб у самцов

ярко-рыжие с контрастным переходом к белому брюху, у самок рыжеватые с темными пестринами. Крыло снизу охристое со светлым или бурым пятном. Иногда у самцов заметна рыжая бровь. Хвост сверху черный, а не рыжий, как у рыжего дрозда [515].

Гнездится в лесах Тувы, Прибайкалья, Станового нагорья. Зимой встречается на юге Восточной Сибири. В кладке 4-7 голубоватых с бурыми пятнами яиц. Песня — треск, крик — резкое "чак-чак".



Сизый дрозд [519] — *Turdus hortulorum*
(Таблица 43)


Мелкий (чуть больше скворца), сверху темно-серый, снизу белый с ярко-рыжими боками и грудью.

Крыло снизу ярко-рыжее, светлой брови нет (в отличие от рыжего дрозда [515]), у самок бока иногда в редких темных пестринах, у самцов горло серое.

Гнездится в пойменных и лиственных лесах от Алдана до Приморья. В кладке 5 зеленоватых с рыжими пятнами яиц. Песня — громкие красивые свисты, похожие на голос певчего дрозда [514] — резкое "чак-чак".

Оливковый дрозд
[520] — *Turdus obscurus*


Больше скворца, голова пепельно-серая, бровь белая, спина оливково-серая, бока буровато-рыжие; у самки горло белое, бока серо-оливковые; у самца горло серое с белым пятнышком



Обычен в лесах от Енисея до Камчатки и Приамурья. В кладке 4-6 зеленоватых с красно-бурыми крапинами яиц. Песня — однообразный двусложный свист, крик — громкое циканье и сухой треск.

Бледный дрозд [521] —
Turdus pallidus
(Таблица 43)


Очень похож на оливкового дрозда, но белой брови нет, грудь и бока серые или палевые, хвост с двумя белыми пятнами на конце. Крыло снизу ярко-рыжее, в отличие от рыжего дрозда [515].




Гнездится в лесах Приморья и Приамурья. Голос как у оливкового дрозда.

Золотистый дрозд
[522] — *Turdus*
chrysolaus
(Таблица 42)

Похож на оливкового дрозда [520], но белой брови нет, голова темная, грудь и бока ярко-рыжие (ярче, чем у рыжего дрозда [515]), крыло снизу светло-серое.




Гнездится в лесах кустарниковых зарослях на Южных Курилах, южном Сахалине и острове Монерон. Песня — трехсложное "чрр-чрр-шии", крик — как у оливкового и бледного дроздов.



Сибирский дрозд
[523] — *Turdus sibiricus*
(Таблица 43)

Среднего размера (крупнее скворца), самец почти полностью серовато-черный с яркой белой бровью и белым брюшком, самка и молодые сверху оливково-бурые, снизу белые с широкими поперечными бурыми пестринами. Крыло снизу с двумя белыми полосками.


Гнездится в приречных лесах от Енисея до Магадана и Сахалина. В кладке 4-5 голубоватых с бурыми пятнами яиц. Песня — двусложный свист и тихий щебет, крик — громкий треск.



Белозобый дрозд [524]
— *Turdus torquatus*
(Таблица 42)

Крупный дрозд (заметно крупнее скворца). Самец буро-черный со светлыми каемками перьев и белым пятном на зобе в форме полумесяца, крылья с белыми продольными полосками. Самка буро-серая со светлым пятном на зобе.

Гнездится у верхней границы леса в горах Кавказа и северо-запада Кольского полуострова. В кладке 4-5 голубовато-зеленых с рыже-бурыми пятнами яиц. Песня — красивый свист "тью, тью, тью", крик — резкий треск и циканье.



Черный дрозд [525] —
Turdus merula
(Таблица 42)

Крупный дрозд. Самец полностью черный с оранжевыми клювом и кольцом вокруг глаза, самка и мо-

лодые бурые с темным хвостом, поперечным рисунком на груди и светлыми горлом и брюшком.

Обитает в смешанных и лиственных лесах, садах и парках Европейской части России. В Калининградской области и на Кавказе гнездится и нередко остается зимовать. Гнездо из мелких веточек, соломы, листьев, с большим количеством земли, располагается на земле, кустах или деревьях. В кладке 4-6 зеленоватых с красноватыми пятнами яиц. Песня — печальные флейтовые свисты, крик — сухой треск и циканье.

На острова Сахалин и Монерон, в Приморье залетает японский белобрюхий дрозд — *Turdus cardis* [526], (Таблица 43). Самец черный с белым в крапинках брюшком и желтым клювом, самка серо-оливковая с рыжими боками и исподом крыла, без белой брови (в отличие от рыжего дрозда [515]) и с черным клювом (в отличие от оливкового и золотистого дроздов [520, 522], у которых клюв более светлый).

На Дальний Восток может залетать североамериканский странствующий дрозд — *Turdus migratorius*, темно-серый с ярко-рыжей грудью и белым кольцом вокруг глаза.


18.15.2. Род Малые дрозды — *Catharus*

Мелкие, заметно мельче скворца, дрозды, оливково-серые сверху, белые с охристым налетом снизу, на груди и горле темные пятнышки, сливающиеся возле угла рта в темную косую полосу. Сидя, медленно покачивают хвостом.

Гнездятся в пойменных ивняках в тундре. В кладке 5-6 голубых с красноватыми или желтоватыми пятнами яиц. Самец поет, сидя на вершине куста.

В России три редких вида.

Малый дрозд [527] —
Catharus minimus
(Таблица 43)



Мелкий дрозд (чуть мельче скворца). Спинная сторона и щеки серые, брюшная — светлая с темными пестринами на груди.

Гнездится в пойменных ивняках долины Анадыря и, возможно, низовий Колымы. Голос — резкое "држи" и короткое "цъох".

На остров Врангеля залетал североамериканский **связисонов дрозд** — *Catharus guttatus* [528], похожий на малого дрозда, но крупнее, сверху с буроватым оттенком, верх головы и хвост рыжеватые, вокруг глаз тонкое белое кольцо.


В Приморье и, вероятно, в другие районы Дальнего Востока и Северо-Запада очень редко залетает североамериканский **дрозд-отшельник** — *Catharus ustulatus* [529], похожий на малого дрозда, но мельче и с тонким желтым кольцом вокруг глаза.

Голос у птиц обоих видов — короткое тихое "вить".

18.15.3. Род Земляные дрозды — *Zoothera*

Крупные дрозды золотисто-рыжеватой окраски, с рыжими полосками сверху на крыльях.

В России два вида.



Пестрый дрозд [530] — *Zoothera dauma*
(Таблица 43)

Крупный (почти с голубя) дрозд, сверху золотисто-оливковый с черными поперечными пестринами, снизу белый с черно-бурными пятнами. Крыло снизу с двумя широкими белыми полосами, по бокам хвоста белые полоски.


Распространен от Южного и Среднего Урала до Южных Курил и Сихотэ-Алиня. Гнездится на земле или на деревьях по берегам таежных ручьев. Гнездо из папоротника, веточек, мха и земли. В кладке 4-5 охристых с ржавчатыми пятнами яиц. Поет в основном по ночам. Песня — монотонный печальный свист, заканчивающийся тихим щебетанием, крик — глухое "хорр". Гораздо более скрытная птица, чем другие дрозды.

На остров Врангеля и, возможно, Чукотку залетает североамериканский **разноголосый дрозд** — *Zoothera naevia* [531], с желтой бровью, снизу ярко-рыжий, поперек груди черная полоса; самка сверху темно-серая, снизу палевая, полоса поперек груди серая. Голос очень разнообразный и напоминает звук сработавшей автомобильной сигнализации.

18.15.4. Род Лесные дрозды – *Petrophila*

Один перелетный вид.

Белогорлый дрозд
[532] — *Petrophila*
gularis
(Таблица 42)



Птица размером со скворца; самец яркий, с голубым верхом головы, черными спиной, щеками, крыльями и хвостом, рыжими брюхом и надхвостьем, белыми горлом и пятнами на крыльях; самка и молодые птицы буровато-серые с серой головой и темными поперечными пестринами на спине, более светлые с брюшной стороны (гораздо светлее самок сибирского [523] и каменных [533, 534] дроздов) с бурыми поперечными пестринами.

Гнездится в горных лесах Забайкалья, Приамурья и Приморья на земле или на стволе упавшего дерева, в кладке 5-7 белых с ржавыми крапинками яиц. Голос — очень красивые свисты. Одна из лучших певчих птиц России.


18.15.5. Род Каменные дрозды – *Monticola*

Дрозды размером со скворца, населяющие сухие горные склоны со скалами и зарослями кустарников. Самцы сверху яркого серовато-голубого цвета, самки и молодые серые с темным поперечным рисунком.

Гнездо между камнями или в трещинах скал, в кладке 4-6 голубовато-зеленых яиц. Песня — набор трелей, свистов и подражаний другим птицам, крик — резкое "чек".

В России два перелетных вида.


Пестрый каменный дрозд [533] — *Monticola*
saxatilis
(Таблица 42)



Самец с белым надхвостьем, ржаво-рыжими грудью и брюшком, самки и

молодые рыжеватые; бока хвоста рыжие.

Гнездится в горах Кавказа (до высоты 3500 м над уровнем моря) и Южной Сибири, на Ставропольской возвышенности.



Синий каменный дрозд
[534] — *Monticola*
solitarius
(Таблица 42)

Самец полностью голубой с черноватыми крыльями и хвостом, у птиц с Дальнего Востока брюшко красно-коричневое. Самки и молодые темные с синим налетом на спине и темным хвостом.

Гнездится в горах Восточного Кавказа, на скалистых берегах Приморского края и Южного Сахалина.

18.15.6. Род Каменки — *Oenanthe*

Птицы размером с воробья, хвост белый с темным рисунком в виде перевернутой буквы "Т" (у пустынной каменки [539] хвост черный до половины длины). Сидя, все время приседают, кланяются и поводят вверх-вниз хвостом.

Населяют открытые места, обычны в сухих степях и предгорьях. Гнездятся в норах, трещинах скал, под камнями. В кладке 4-6 голубых яиц. Песня — в основном набор подражаний разным птицам и другим звукам, крик — резкое "чек".

В России пять перелетных видов, из которых за пределами степной зоны встречается только обыкновенная каменка [535].




Обыкновенная каменка
[535] — *Oenanthe oenanthe*
(Таблица 44)

Самец весной и летом пепельно-серый с черными крыльями и широкой полосой через глаз, белым брюхом. Самка, молодые птицы и самец осенью охристо-буроватые, горло и грудь рыжеватые, надхвостье и брюшко белые.

Гнездится по всей стране, кроме большей части Дальнего Востока, в каменистых тундрах, на лугах, в степях, на окраинах городов и поселков, заброшенных стройках и поросших бурьяном пустырях.


Каменка-пleshанка
[536] — *Oenanthe*
pleschanka
(Таблица 44)



У самца верх головы, брюхо, бока и надхвостье белые, остальная часть головы, шея, спина и крылья черные, у птиц, обитающих на Кавказе, спина белая, черные участки на голове и крыльях разделены светлой полосой. Черная полоса на крайних рулевых перьях шире, чем на средних, центральные рулевые полностью черные. Самки и молодые птицы похожи на самок обыкновенной каменки, но грудь сероватая.

Гнездится в сухих каменистых степях от Дона до Забайкалья, в предгорьях Кавказа до высоты 3000 м над уровнем моря.


Чернопегая каменка
[537] — *Oenanthe*
hispanica
(Таблица 44)



Похожа на плешанку, но у самца вся спина светло-серая или палевая, от головы к крылу черная полоса. Самки и молодые птицы с темно-серыми горлом и зобом.

Гнездится в сухих горах Дагестана.


Каменка-плянунья
[538] — *Oenanthe*
isabellina
(Таблица 44)



Самец и самка окрашены одинаково и похожи на самок других каменок, но

окраска более тусклая, сероватая, крыло сверху ненамного темнее спины, снизу белое. От основания клюва к глазу проходит узкая черная полоска.

Гнездится в сухих степях юга России от Приазовья до Забайкалья, в горах Восточного Кавказа. Голос — металлическое "чеканье".



Пустынная каменка
[539] — *Oenanthe*
deserti
(Таблица 44)

Самец сверху охристо-сероватый, горло, бока головы, крылья и хвост до

половины длины черные, брюхо и надхвостье белые. Самка и молодые птицы окрашены светлее, чем другие каменки, хвост бурый.

Гнездится в полупустынях Алтая и Тувы.

В Приэльбрусье и других районах Кавказа может быть встречена **златогузая каменка** — *Oenanthe xanthopygna* (Таблица 44). Она похожа на самок других каменок, но легко отличается по рыжему хвосту с черным рисунком в форме буквы "Т" (в отличие от горихвосток [544-548]). Обитает на сухих каменистых горных склонах зарубежной Азии.

18.15.7. Род Чеканы — *Saxicola*


Мелкие (мельче воробья) насекомоядные птицы, высокие на ногах и сравнительно короткохвостые. На плече белая полоска. Характерна повадка сидеть на вершинке или сбоку высоких стеблей злаков или кустов. Обитатели преимущественно лугов и степей.

Гнездо располагается на земле и сделано в основном из соломы с выстилкой из более тонких стеблей или из шерсти. В кладке 3-8 ярких, с блестящей скорлупой, зеленовато-голубых иногда с очень мелкими бурными пятнами яиц. Песня — короткая щебечущая трель, при тревоге покачивают хвостом и кричат "туи-чек-чек".

В России четыре перелетных вида.

Луговой чекан [540] —***Saxicola rubetra***

(Таблица 44)




Спинная сторона охристая с темными продольными пестринами, горло и грудь ржаво-розоватые, брюшко светлое, по бокам хвоста белые пятна, бровь белая, бока головы темные. Самка и молодые птицы окрашены более тускло.

Распространен повсюду в лесной и лесостепной зонах Европейской части России, в Зауралье, на Кавказе и в Южной Сибири, доходя на восток до Тувы. Гнездится на лугах с высокой травой и кустарниками, полянах, вырубках, верховых болотах, пустырях, в горах до высоты 2000 м над уровнем моря.

Черноголовый чекан**[541] — *Saxicola******torquata***

(Таблица 44)



У самца голова, горло, спина, крылья и хвост черные; грудь рыжая; брюшко, надхвостье и пятна по бокам шеи белые. У самки спинная сторона бурая с пестринами, но, в отличие от лугового чекана, надхвостье тоже белое, а голова полностью темная.

Распространен почти всюду до южных тундр, но в Европейской части России очень редок. Гнездится на вырубках, высокотравных лугах, в высокогорьях и степях.

Большой чекан [542] — *Saxicola insignis*

Похож на черноголового чекана, но горло белое и на крыле два белых пятна.

Гнезился на высокогорных лугах Алтая, но, возможно, уже исчез на нашей территории. Занесен в Красную книгу России.

В Оренбургскую область залетает **черный чекан** — *Saxicola caprata* [543], (Таблица 44), самец черный с белым брюшком и надхвостьем, самка и молодые птицы бурые, с размы-


тыми пестринами и рыжим надхвостом. Гнездится в Средней и Южной Азии.

18.15.8. Род Горихвостки — *Phoenicurus*

Мелкие (с воробья, реже немного крупнее) птицы с рыжими надхвостом и хвостом, которым постоянно подергивают. Самки тусклой буровато-серой окраски, самцы очень яркие.

Гнездятся в лесах, садах, парках и горах. Песня — звонкая трель, заканчивающаяся сухим шорохом, похожим на звук осыпающихся камешков; крик — громкое "фюить-тик-тик". Питаются преимущественно насекомыми.


В России пять видов, большинство из них перелетные.



Обыкновенная горихвостка [544] —
Phoenicurus phoenicurus
(Таблица 45)

У самца верх головы и спина пепельно-серые, лоб белый, бока головы и горло черные, крылья бурые, иногда с белым пятном, брюшко ярко-рыжее. Самка буровато-серая, брюшко и горло светлые.

Обычна в светлых лесах, садах и парках почти повсюду южнее тундровой зоны от западных границ России до Енисея, в Предбайкалье. Гнездится в дуплах и полудуплах, трещинах стен, охотно заселяет искусственные гнездовья, изредка строит гнезда на земле. В кладке 6-9 голубых яиц.




Горихвостка-чернушка [545] —
Phoenicurus ochruros
(Таблица 45)

У самца верх головы и спина пепельно-серые; бока головы, горло и грудь черные; брюшко рыжее или серое. Самка похожа на самку обыкновенной горихвостки, но темнее и с охристым налетом.

Гнездится в горах Кавказа, Алтая, Саян и Тувы выше границы леса. В послевоенные годы горихвостка-чернушка селилась на развалинах городов, и с тех пор встречается в населенных пунктах Калининградской и Смоленской областей, откуда постепенно расселяется дальше на восток. Гнезда в трещинах скал, под камнями или крышами домов, в кладке 4-6 белых или голубоватых яиц.


Сибирская горихвостка
[546] — *Phoenicurus*
aurogeus
(Таблица 45)



У самца верх головы и шеи светло-серые; бока головы, горло, спина и крылья черные; на крыле белое пятно; брюхо ярко-рыжее. Самка похожа на самку обыкновенной горихвостки [544], но с белым пятном на крыле.


Обычна в светлых лесах, пойменных кустарниках, садах и поселках юга Сибири, Приамурья и Приморья. Гнездо делает в дупле, трещине скалы, куче камней или под крышей. В кладке 5-6 розоватых или голубых с красными крапинками яиц.

Краснобрюхая горихвостка
[547] — *Phoenicurus*
erythrogaster
(Таблица 45)



Похожа на сибирскую горихвостку, но заметно крупнее (почти со скворца) и окрашена еще ярче, у самца грудь красно-рыжая, у самки крыло без белого пятна, брюхо рыжеватое.

Распространена в высокогорьях Центрального Кавказа на высотах 2000-3500 м, в горах Южной Сибири выше границы леса. Зимует в низкогорьях, на Кавказе — в зарослях облепихи, в Сибири — в пойменных ивняках. Гнездо строит в трещине скалы или между камнями, иногда выше снеговой линии. В кладке 3-5 белых с красноватыми пятнами яиц. Песня включает красивые флейтовые свисты, напоминающие голос черного дрозда.




Красноспинная горихвостка [548] —
Phoenicurus erythronotus
(Таблица 45)

Самец рыжий с серым верхом головы; черными боками головы, лбом и крылом; белыми пятном на крыле и брюшке. Самка похожа на самку обыкновенной горихвостки [544], но брюшко и горло буровато-серые.

Гнездится в высокогорьях Алтая, Саян, Кузнецкого Алатау и гор Танну-Ола. Гнездо строит под корнями дерева или между камней. В кладке 3-5 зеленоватых с буроватыми крапинками яиц.

18.15.9. Род Зарянки — *Erithacus*

В России один вид.



Зарянка [549] —
Erithacus rubecula
(Таблица 45)

Мелкая сероватая птичка с рыхлым оперением. Грудь, горло и бока головы рыжие, брюшко белое. Спинная сторона с оливковым оттенком, хвост серый. Молодые птицы буроватые со светлыми пестринами.

Обычна почти по всей лесной зоне Европейской части России, в Зауралье, на юге Западной Сибири и Кавказе. Зимой часто встречается в предгорьях Кавказа, в мягкие малоснежные зимы остается зимовать и в более северных районах. Обитает в лесах разных типов (особенно часто в ольшаниках), садах, парках. Осенью нередко посещает кормушки и иногда появляется в городских скверах. Гнездо строит на земле, в гнилых пнях, дуплах, охотно занимает искусственные гнездовья. Постройка сделана из сухих листьев, мха, соломы с выстилкой из тонких стебельков, шерсти и перьев. В кладке 5-6 розоватых с красно-бурыми крапинками яиц.


Песня — громкая звенящая трель, крик — резкое "тик-тик-тик". Активно поет в утренние и вечерние часы.

18.15.10. Род Соловьи — *Luscinia*

Мелкие стройные птицы. Характерна манера подергивать хвостом и сидеть со слегка опущенными крыльями.

Гнездятся в лесах и кустарниковых зарослях. Поющая птица, как правило, держится в глубине кустов или в густой кроне невысокого дерева. В России восемь перелетных видов.

Обыкновенный соловей
[550] — *Luscinia luscinia*
(Таблица 46)




Немного крупнее воробья, сверху буровато-коричневый, снизу буровато-серый, хвост довольно длинный, закругленный, одного цвета со спиной.

Распространен в лесной и лесостепной зонах Европейской части России, на юге Сибири к востоку до Ачинска.

Гнездится в светлых лесах, поймах рек, садах и парках, обычно по сырым местам. Гнездо из сухих листьев, соломы и тонких веточек с выстилкой из тонких стеблей и шерсти строит на земле. В кладке 4-6 однотонных оливковых или коричневатых яиц. Песня — набор повторяющихся свистов и шелканий. Каждый элемент песни (колено), число которых может достигать 12, повторяется несколько раз. Крик — низкое "фюить-трр".


До появления радиоприемников и магнитофонов редкий трактир, постоялый двор или купеческий дом обходились без клетки с соловьем. В то время хорошо поющий соловей стоил огромных денег. Некоторые знатоки могли по голосу мгновенно определить, из какой губернии доставлена птица. В начале XX века дороже всего ценились курские соловьи, сейчас лучшими считаются рязанские и тульские. Впрочем, талантливого певца можно встретить в любом месте, где водятся соловьи, даже в черте Москвы.



Южный соловей [551]
— *Luscinia megarhynchos*
(Таблица 46)

Похож на обыкновенного соловья, но брюхо светлее, хвост рыжеватый.

Обитает на Кавказе в лесах с густым подлеском и садах, доходя до высоты 2000 м над уровнем моря. Гнездо строит на земле. В кладке 4-6 бурувато-оливковых яиц. Голос как у обыкновенного соловья. Правда, в отечественной орнитологической литературе обычно указывается, что песня южного соловья более простая. Зоологи Западной Европы, где обитает в основном южный соловей, считают его песню более музыкальной, чем у обыкновенного. На наш взгляд, среди обоих видов встречаются и таланты, и посредственности, и бездары.




Соловей-красношейка [552] — *Luscinia calliope*
(Таблица 46)

Похож на обыкновенного соловья [550], но брюшко, бровь и полосы по бокам горла белые, грудь и бока головы

серые, горло у самцов красное, у самок белое или розовое.

Распространен почти по всей лесной зоне Сибири, на Северном Урале, Дальнем Востоке, Камчатке. Обитает в поймах рек, кустарниковых зарослях, в горы поднимается до границы леса. Гнездо — шарообразная постройка с боковым входом, располагается на земле. В кладке 3-5 зеленоватых, иногда с голубыми пятнами яиц. Песня — красивый набор звонких трелей, крик — резкий свист и потрескивание.



Соловей-свистун [553] — *Luscinia sibilans*
(Таблица 46)

Размером с воробья, спинная сторона коричневато-бурая, брюшная светлая, бока и грудь с темным


чешуйчатым рисунком, изредка сливающимся в поперечные полосы. Хвост каштановый, довольно короткий.

Обитает в сырой захлавленной тайге южной половины Сибири и Дальнего Востока. Гнездо строит на земле или невысоко на пнях. В кладке 5-6 голубых яиц. Песня — дрожащий свист, немного похожий на ржание жеребенка, крик — негромкий свист, заканчивающийся чоканьем.

Японская зарянка
[554] — *Luscinia akahige*
(Таблица 45)

Бока головы, грудь и хвост ярко-рыжие, верх красноватый, хвост темно-рыжий, зоб серый, брюшко белое.


Гнездится в темнохвойных лесах Южных Курил, Южного Сахалина и о. Монерон. В кладке 5 зеленовато-голубых яиц. Песня — короткая трель, крик — короткий треск.




Синехвостка [555] —
Luscinia sulaugus
(Таблица 45)

Мелкая (мельче воробья) птица с синими надхвостьем и хвостом. У самца спинная сторона синяя, крылья

бурые, бровь и брюхо светлые, бока рыжие. Самка и молодые птицы буровато-серые, брюхо и бровь светлые, бока рыжеватые, грудь с темными пятнами. По манере поведения похожа на зарянку или горихвостку [544-549], но держится в основном на земле, скрытна и редко попадает на глаза. Распространена от Предуралья до Курил, отдельными очагами на севере Европейской части России. Обитает в глухой тайге и высокоствольных пойменных лесах. Гнездо на земле, поваленном дереве, в гнилом пне или дупле, в кладке 5-7 белых с бежевым венчиком на тупом конце яиц. Песня — набор свистов, более тихих в начале и в конце; самец поет, сидя на вершине дерева. Крик — громкое "фьить-



тр". Питается насекомыми, которых высматривает с ветки, реже ягодами.




Синий соловей [556] —
Luscinia cyane
(Таблица 45)

У самца спинная сторона синяя, брюхо белое, через глаз проходит черная полоса. Спинная сторона сам-

ки буроватая с синим оттенком (особенно заметным на хвосте). Рыжих пятен на боках нет.

Обитает в лесах с густым подлеском в южной части Сибири и Дальнего Востока. Гнездо из сухих листьев и мха строит на земле. В кладке 4-6 голубых яиц. Песня — набор красивых свистов, крик — громкое "чок".



Варакушка [557] —
Luscinia svecica
(Таблица 46)

Оливково-серая с бурыми крыльями, хвост рыжий с темным рисунком в виде буквы "Т", брюшко белое.


На горле и груди яркое, окаймленное черной полосой пятно: у самца синее с рыжим или белым пятнышком в середине (иногда целиком синее), у самки белое с черными пестринами. Молодые птицы темные с продольными светлыми пестринами и рыжим надхвостьем.

Гнездится в кустарниковых зарослях (обычно вблизи водоемов) почти по всей стране, но чаще встречается на Севере. В кладке 4-7 серо-зеленых с бурыми пятнами яиц. Песня — громкие трели и подражание другим птицам, крик — громкое "чок".

18.15.11. Род Тугайные соловьи — *Cercotrichas*

Один редкий вид.

Тутайный соловей
[558] — *Cercotrichas*
galactotes
 (Таблица 46)



Мелкая стройная птица, серовато-коричневая с белыми брюхом и бровью. Легко узнается по длинному и широкому ступенчатому хвосту, рыжему с черной и белой полосами по краю.

Встречается в кустарниковых зарослях низовьев Терека. Довольно редок, но в местах обитания часто попадает на глаза. Гнездо строит невысоко на кустах или на земле. В кладке 3-5 зеленоватых с бурыми пятнами яиц. Песня — набор свистов и трелей, крик — резкое "тции-тци".


18.16. Семейство Суторовые — *Paradoxornithidae*

Мелкие, мельче воробья, преимущественно насекомоядные птицы с очень длинным ступенчатым хвостом и коротким толстым клювом. Обитают в лесах, кустарниках и тростниковых зарослях.

В России четыре рода, в каждом по одному виду.

18.16.1. Род Длиннохвостые синицы — *Aegithalos*

Ополовник [559] —
Aegithalos caudatus
 (Таблица 51)




Пушистая бело-черно-рыжая птичка. Клюв очень маленький, короткий и толстый. Голова у северных птиц белая, у южных — с черной полосой через глаз.

Распространен в лиственных и смешанных лесах почти по всей лесной зоне, кроме северной тайги, на Кавказе. Обычен в березняках и ольшаниках. Гнездо шарообразное, с боковым входом, сделанное из зеленого мха, скрепленного паутиной, и покрытое снаружи кусочками лишайников, строит в развилке толстых ветвей деревьев. В кладке 9-12 белых с розоватым рисунком яиц. Насиживающая птица легко

узнается по согнутому вбок от долгого сидения в гнезде хвосту. В зимнее время кочует стайками (часто вместе с большой и другими синицами) недалеко от мест гнездования. Голос — звонкое "чэrr".

Название свое получил за то, что издали напоминает маленький круглый половник с длинной узкой ручкой. В XIX веке птицеловы считали его самой красивой из мелких птиц России и называли "аполлоновка".

18.16.2. Род Усатые синицы — *Parus*




Усатая синица [560] —
Parus biarmicus
(Таблица 51)

Рыжевато-буроватая птица с длинным ступенчатым, заостренным на конце хвостом. Глаза желтые. У самца голова голубовато-серая, под клювом удлинённые черные перья-"усы".

У самца голова голубовато-серая, под клювом удлинённые черные перья-"усы".

Круглый год обитает в тростниковых зарослях Калининградской области, на юге Европейской части России, на озере Чаны, в Хакасии, Туве и Забайкалье; на кочевках изредка встречается на юге Западной Сибири. Обычна в Прикаспии. Гнездо — глубокая чашечка, устраивается в тростниковых зарослях или в основании кустов. Нередко селится группами. В кладке 5-7 белых с темными крапинками яиц. Голос — звонкое "чвинь".

18.16.3. Род Тростниковые сutores — *Paradoxornis*



Тростниковая сutura
[561] — *Paradoxornis*
heudei


Палевая с рыжими пятнами и черноватыми полосками, в том числе на темени. Клюв желтый, очень толстый.

Крайне редкий вид побережья озера Ханка и, возможно, долины реки Раздольная. Гнездится и зимует в густых тростниковых зарослях. В кладке 5-9 голубых с темными крапинками яиц. Толстый клюв служит для разламывания стеблей тростника, в полостях которых укрываются насекомые. Голос — короткие посвисты.

В мире сохранилось всего несколько сотен пар, из них около 400 — в России. Особенно страдает из-за пожаров и уничтожения тростниковых крепей. Занесена в Красную книгу России.

18.16.4. Под Суторы — *Suthora*

Буряя сутора [562] —
Suthora webbiana
(Таблица 51)



Однотонно-буряя с рыжеватым оттенком, голова округлая, хвост длинный, ступенчатый. Полет неуверенный; птицы избегают открытых мест, предпочитая держаться в зарослях травянистой или кустарниковой растительности.

Гнездится и зимует на юге Приморья в пойменных кустарниках, гнездо в виде глубокой чаши или шара. В кладке 5-6 голубых яиц. Кормится, разламывая клювом стебли тростника и доставая личинок насекомых. Кроме того, поедает семена различных растений. Своеобразно проходит линька: осенью можно встретить птиц, полностью лишенных хвоста. Местами довольно обычна, но редко попадает на глаза. Голос — тихое щебетание, своеобразный свист. В стае птицы переключаются трескучими криками "че-че-че".

18.17. Семейство Славковые — *Sylviidae*

Мелкие и очень мелкие, подвижные птички тусклой зеленовато- или буровато-серой окраски, с короткими широ-

кими крыльями, тонким шиловидным клювом и несколько удлинненным телом. Самцы и самки почти всех видов окрашены одинаково.

Из всех наших птиц славковые, пожалуй, наиболее трудно поддаются определению в полевых условиях. Большинство из них можно уверенно различить только по голосу. К тому же их намного труднее увидеть, чем услышать, и почти никогда не удастся толком рассмотреть: можно долго стоять возле куста, в котором прыгает, например, пеночка, и все время видеть ее только мельком.


Обитатели лесов, садов, парков, кустарниковых и тростниковых зарослей, реже открытых ландшафтов. Питаются насекомыми, некоторые иногда ягодами.

В России встречаются славковые девяти родов, все перелетные.

18.17.1. Род Славки — *Sylvia*

Хвост прямой. Спина окрашена заметно темнее брюшной стороны. Обитают в разреженных лесах, кустарниках, садах и парках. Гнездо — рыхлую чашеобразную постройку из соломы и тонких веточек — строят на кусте, реже невысоко на дереве, в кладке 4-6 белых или зеленоватых с темными пятнами яиц.

В России не менее семи видов.




**Садовая славка [563] —
Sylvia borin
(Таблица 46)**

Спинная сторона оливково-серая, брюшко светло-серое, хвост однотонный, от пересмешек [585-588] отличается отсутствием светлой брови.

Распространена в лесной зоне Европейской части России, на Кавказе, в Сибири на восток до долины Енисея. Обычна в поймах рек. Песня — набор длинных журчащих трелей, крик — резкое "чек".

Серая славка [564] —
Sylvia communis
 (Таблица 46)



Спина, крылья и хвост бурые, крайние рулевые перья белые, темя сизовато-серое, плечи рыжеватые, горло белое, брюшко с розоватым оттенком.

Обычна в лесной зоне Европейской части России, Кавказа, Зауралья, на юге Сибири до Забайкалья. Гнездится в кустарниках и бурьяне. Песня — щебетание "тирли-ви-тирли-чет-чит-читирли", поющий самец часто взлетает. Крик — громкое "чек".


Славка-завирушка
[565] — *Sylvia sibilatrix*
 (Таблица 46)



Похожа на серую славку, но плечи серые, через глаз проходит размытая темная полоса.


Распространена во всей Европейской части России кроме тундр, от Урала на восток доходит до Забайкалья и Центральной Якутии. Песня — набор щебетаний, в том числе громкое "кле-кле-кле", заканчивается сухой быстрой трелью "тиктиктиктик", крик — тихое "чек". Птицы, гнездящиеся на Кавказе, отличаются серой спиной без бурого оттенка и более длинным клювом (около 1 см); возможно, они относятся к азиатскому виду горная славка — *Sylvia althaea*.

Славка-черноголовка
[566] — *Sylvia atricapilla*
 (Таблица 46)



Спина буровато-серая, брюшко светло-серое, хвост однотонный, у самца на голове черная шапочка, у самки и молодых птиц шапочка рыжевато-коричневая.

Распространена в Европейской части России, Зауралье, на юге Сибири, на восток до Алтая. Обычна в лиственных и смешанных лесах с густым подлеском, садах и парках. Песня — набор очень красивых флейтовых свистов, все время меняющихся по громкости, крик — резкое "чек".




Ястребиная славка
[567] — *Sylvia nisoria*
(Таблица 46)

Самая крупная из славков (размером с воробья). Спинная сторона пепельно-серая (у молодых птиц

бурая), брюхо светлое с темным поперечным струйчатым рисунком (у молодых птиц рисунок лишь на боках). Надхвостье и плечевые перья с белыми пестринами. Глаза ярко-желтые. Рулевые перья, кроме центральных, со светлыми вершинами.

Распространена в Европейской части России, на Кавказе, Зауралье и на юге Сибири на восток до Тувы. Чаще встречается на юге ареала. Гнездится в разреженных лесах, гарях, кустарниковых зарослях, садах, парках и лесополосах. Песня — громкие отрывистые свисты, крик — резкое "чек".



Белосая славка
[568] — *Sylvia mystacea*
(Таблица 46)

Спинная сторона серая, голова более темная, хвост темный с белыми полосами по бокам, по бокам


горла и хвоста белые полосы, брюхо розоватое. У самца голова почти черная, причем темная шапочка спускается ниже уровня глаз, в отличие от славки-черноголовки [566]. Вокруг глаза узкое красноватое кольцо, заметное только вблизи.

Гнездится в степях Прикаспия. Песня — короткая щебечущая трель, крик — громкое "черр".

Пустынная славка
[569] — *Sylvia papa*
 (Таблица 46)

Очень мелкая, светло-песочной окраски, хвост рыжий с белыми полосками по бокам, обычно приподнят. Глаза желтые.

Гнездится в низовьях Волги, залетает на Алтай. Песня - звенящее "тири-титю-тю-тю", крик — тихий треск.



18.17.2. Род Пеночки — *Phylloscopus*

Очень мелкие птички с прямым или чуть-чуть вырезанным хвостом (в отличие от сверчков [595-609] и мелких камышевок). Бровь светлая, под ней проходит размытая темная полоска. Самцы и самки внешне неразличимы. От пересмешек [585-588] отличаются покатым лбом, придающим голове несколько заостренную форму.


Гнездо — шалашик из травы на земле или низко в кустах (у некоторых видов может быть устроено на дереве) в лесу с густым подлеском, кустарнике, реже в тростнике. Нередко детали строения гнезда различаются у близких видов, что может помочь в определении. В кладке 3-8 белых, у большинства видов с красноватыми пятнами яиц. В конце лета и осенью часто кочуют в стаях синиц.

Пеночки иногда совсем не боятся человека, особенно в тундре, где они порой склевывают комаров с неподвижно сидящих у костра людей.

В России 15 видов, многие из которых лучше различают по голосу.


Пеночка-весничка
[570] — *Phylloscopus trochilus*
 (Таблица 47)

Верх буровато- или зеленовато-серый, брюхо и бровь желтовато-белые. Но-



ги светлые, крыло без светлых полос. Часто поет, сидя на вершине дерева или куста.


Обычна в подлеске, прибрежных кустарниках и садах почти всюду от южных тундр до лесостепей, кроме юга Восточной Сибири и большей части Дальнего Востока. Лоток гнезда с обильной выстилкой из перьев. Песня — набор частых посвистов, сливающихся в постепенно понижающуюся трель типа "твиттвитви-тютютю-виувиви-фью-фью", крик — короткий свист "фюить".



Пеночка-теньковка
[571] — *Phylloscopus*
collybitus
(Таблица 47)

Похожа на весничку, но зеленых тонов в оперении нет, брюшко чуть буроватое, ноги почти всегда темные. Чаше держится в кронах высоких деревьев.

Обычна в лесах и высокогорных кустарниках примерно в тех же частях страны, что и весничка. Гнезда устраивает чаще на земле, но иногда на кустах и деревьях, чаще всего на елях. Лоток гнезда выстлан перьями. Песня — звонкое, размеренное, монотонно повторяемое на разные лады "тень-тинь-тянь-тюн...тр...тр...тень-тинь...", крик как у веснички. Для теньковки характерно осеннее пение во время пролета и послегнездовых кочевок.




Кавказская пеночка
[572] — *Phylloscopus*
lorenzii

Очень похожа на пеночку-теньковку, но брюшко и бровь без желтого оттенка.

Гнездится в лесах и парках Центрального Кавказа и Кавказских Минеральных вод. Песня — отрывистый щебет, крик как у веснички и теньковки.


Пеночка-трещотка [573]
— *Phylloscopus sibilatrix*
 (Таблица 47)



Верх желто-зеленый; бровь, горло, зоб и бока желтые; низ груди и брюшко белые; хвост и крылья бурые с зеленоватыми продольными полосками. Ноги светлые. Характерен токовой полет, когда поющий самец перелетает трепещущим полетом с дерева на дерево, облетая гнездовой участок.

Обычна в лиственных лесах Европейской части России, юга Западной Сибири и Западного Кавказа; возможно, гнездится на Алтае. Выстилка лотка гнезда без перьев. Песня — громкое, постепенно ускоряющееся "сип-сип-сипсипи-сирр", крик — печальное "тюю-тюю".


Пеночка-таловка [574] — *Phylloscopus borealis*
 (Таблица 47)



Зеленовато-бурая сверху, брюшко и бровь желтовато-белые, на крыле две поперечных светлых полосы (из них одна нечеткая). Ноги светлые.

Обычна в лесах, кустарниках и кустарниковых тундрах на севере Европейской части России и Западной Сибири, почти всюду восточнее Енисея. Песня — громкое тонкое "тзи-тзи-тзи", крик — тихое "тзет", "цит" или "дрр".


Зеленая пеночка [575] — *Phylloscopus trochiloides*
 (Таблица 47)



Очень похожа на пеночку-таловку, но на крыле одна светлая полоска, бровь светло-серая, ноги темные.

Обитает в светлых лесах и высокогорных кустарниках средней полосы Европейской части, южной половины Си-

бири и Дальнего Востока. Гнездо обычно устраивает на склонах, откосах, боковых стенках вывороченных пней. Материал гнезда — зеленый мох; выстилка лотка — шерсть, тонкая солома, перьев нет. В кладке 5-6 белых яиц. Песня — громкое "ти-пситю-пситю-пси-ти-ти-пси...", более высокое в конце, крик — тихое "пии" или "пюйль".




Желтобрюхая пеночка
[576] — *Phylloscopus nitidus*
(Таблица 47)

Верх желтовато-зеленый, брюхо и бровь желтые. Крыло с одной светлой полос-

кой или без полос.


Гнездится в лиственных лесах и арчевниках Кавказа. Песня как у зеленой пеночки, крик — резкое "принь".



Пеночка-зарничка
[577] — *Phylloscopus inornatus*
(Таблица 47)

Очень похожа на пеночку-таловку [574], но мельче; над глазом широкая светло-желтая полоса. На крыле две светлых поперечных полосы.

Гнездится в лесах и лесотундрах Северного Урала, Зауралья, большей части Сибири и Охотского побережья. Образует групповые поселения. Песня — короткое, очень высокое звенящее "вить-вить-тжии", крик — тихое "вить".




Корольковая пеночка
[578] — *Phylloscopus proregulus*
(Таблица 47)

Верх оливково-зеленый, голова буроватая; бровь, полоса вдоль темени и над-

хвосте ярко-желтые; крыло и хвост бурые с продольными зеленоватыми полосками; на крыле две желтых поперечных полосы; брюхо желтовато-белое. От корольков [612-614] отличается желтым надхвостом и тем, что полоска на темени узкая, не ограничена темным; кроме того, гораздо более изящным сложением.

Гнездится на деревьях в темнохвойных и пойменных лесах южной половины Сибири и Дальнего Востока, осенью изредка залетает в Европейскую часть России. Песня — громкие звучные трели, крик — звонкое "твит", совсем не похожее на голос королька.


Светлоголовая пеночка
[579] — *Phylloscopus*
occipitalis
(Таблица 47)



Верх серо-зеленоватый, брюхо светлое, подхвосте желтое, брови желтовато-белые, поперек крыла неясная светлая полоска, темя темное со светлой зеленоватой продольной полосой.

Гнездится в разреженной тайге и смешанных лесах юга Дальнего Востока. Гнездо на земле, выстилка лотка без перьев. Песня — короткое звонкое "пичю-пичю-вин" или "цит-цит-ит... цяа", крик — звонкое "ци".


Толстоклювая пеночка
[580] — *Phylloscopus*
schwarzi
(Таблица 47)



Верх оливково-бурый без зеленого оттенка, брюшко светлое с охристым налетом на боках, бровь беловатая, крыло без светлых полос. Держится обычно в кронах деревьев и кустов.

Гнездится в светлых лесах, на зарастающих гарях юга Сибири и Дальнего Востока. Песня — короткая звучная трель, крик — тихий свист "твит" и грубое "цок". Во время исполнения песни дрожит всем телом. Иногда сидящая пти-

ца резко задирает хвост, подобно тому, как это делают соловьи и зарянки.




Бурая пеночка [581] —
Phylloscopus fuscatus
(Таблица 47)

Верх бурый без зеленоватого оттенка, брюхо буроватое, особенно бока, бровь охристая, надхвостье рыжеватое.

Держится обычно в подлеске.

Гнездится в горных лесах и стланиках южной половины Сибири и большей части Дальнего Востока. В кладке 4-6 белых яиц. Сидящая птица характерно подергивает хвостом в горизонтальном направлении. Песня — звонкие посвисты, заканчивающиеся трелью, крик — резкое "чек".




Индийская пеночка [582] —
Phylloscopus griseolus
(Таблица 47)

Верх буровато-серый, брюхо желтоватое с бурым налетом на боках, бровь ярко-желтая. Крыло без полос.

Крыло без полос.

Гнездится на поросших кустарником каменистых склонах гор Алтая, но очень редка. Песня — короткая трель, крик — потрескивание "трр" или "чильи".




Бледноногая пеночка [583] —
Phylloscopus tenellipes
(Таблица 47)

Верх зеленовато-бурый, темя темное, надхвостье рыжеватое, брюхо светлое с желтоватыми боками, бровь желтоватая, на крыле две размытых поперечных полосы, ноги светлые, розовые.

Верх зеленовато-бурый, темя темное, надхвостье рыжеватое, брюхо светлое с желтоватыми боками, бровь желтоватая, на крыле две размытых поперечных полосы, ноги светлые, розовые.

Обитает в лиственных и пойменных лесах юга Забайкалья, Приамурья и Приморья. Выстилка лотка без перьев. В кладке 5-6 чисто-белых яиц. Песня короткая, похожая на стрекотание кузнечика, крик — резкое "че-че-че".

Сахалинская пеночка
[584] — *Phylloscopus*
borealoides
(Таблица 47)



Очень похожа на бледноногую пеночку, но голова и зашеек темно-серые, спина и надхвостье зеленоватые.

Гнездится в лиственных лесах юга Сахалина и Курил. Выстилка лотка без перьев. В кладке 6-7 чисто белых яиц. Песня — чистое трех-четырёхсложное "цю...ци-цю-пи", крик — короткое металлическое "тю".


18.17.3. Род Пересмешки — *Hippolais*

Похожи на крупных пеночек, но отличаются более грубым голосом, широким в основании клювом и округлой головой. От славок [563-569] отличаются светлой бровью. Хвост прямой или чуть вырезанный, в отличие от сверчков [589-605] и камышевок. Поют, запрокинув голову.

Гнездятся на деревьях в лесах, садах и парках, в зарослях кустарников. В кладке 4-6 розоватых с темными пятнами яиц.


В России четыре вида.

Обыкновенная пересмешка [585] —
Hippolais icterina
(Таблица 47)



Верх зеленовато-серый, брюшко и бровь светло-желтые. Ноги темные, синеватые.


Гнездится в светлых лесах с густым подлеском, садах и парках Европейской части России и юга Западной Сибири. Песня — подражание другим птицам и гнусавые крики, крик — громкое металлическое "вет", "трэк" или "це-це-те-тевин".



Северная бормотушка
[586] — *Hippolais caligata*
(Таблица 47)

Верх буровато-серый, брюхо белое, бровь светло-серая.


Распространена от Финского залива до Байкала, вниз по Волге доходит до границ Астраханской обл. Гнездится на земле или кустах по опушкам, вырубкам, светлым лесам, садам и паркам. Песня — разнообразный треск, крик — резкое "чрэк".



Южная бормотушка
[587] — *Hippolais gamma*

Практически неотличима от северной бормотушки, но клюв длиннее и толще.

Гнездится в дельте Волги. Голос как у северной бормотушки.



Бледная пересмешка
[588] — *Hippolais pallida*
(Таблица 47)

Очень похожа на бормотушек, но светлее, брюхо с охристым налетом, бровь белая.

Гнездится на кустах в садах, парках и лесах в районе Адлера. Песня — однообразный треск, крик — резкое "чек".

18.17.4. Род Камышевки — *Acrocephalus*

Некоторые птицы этого рода совсем мелкие, другие достигают размеров скворца. Все они однотонной окраски, с удлинённым телом, покатым лбом, придающим голове заостренную форму, и ступенчатым хвостом. Поют, сидя на высокой травинке, верхушке тростника или торчащей ветке.

Песня включает громкий грубый треск. У некоторых видов песня звучит настолько причудливо, что кажется, будто в глубине тростников спряталось какое-то крупное и таинственное существо — водяной или кикимора.


Гнездо — глубокий конус между стеблями травы, тростника или в глубине куста.

В России десять видов.

Дроздовидная камышевка [589] — *Acrocephalus arundinaceus*

(Таблица 48)

Размером со скворца, сверху буровато-серая, снизу грязно-белая, бровь светлая.




Гнездится в прибрежных тростниках и ивняках запада и юга России от Калининграда и Финского залива до Приморья. В кладке 3-9 зеленоватых с бурыми крапинками яиц. Песня — трескучее "длин-длин-кар-р-ра-кар-ра-беч-вак-вак...", крик — резкое "черр".

Тростниковая камышевка [590] — *Acrocephalus scirpaceus*

(Таблица 48)

Размером с воробья, сверху светло-буроватая, снизу охристо-белая, надхвостье рыжеватое. Светлая бровь почти не заходит за глаз, ноги темно-бурые.

Гнездится в тростниках и кустарниках по прибрежным мелководьям запада и юга страны от Калининграда и Пскова до Оренбурга. В кладке 3-7 зеленоватых с бурыми и серыми пятнами яиц. Песня — набор свистов, треска и подражаний другим птицам, причем каждый звук повторяется 2-3 раза, например: "чиррук-чиррук-як-як-як...", крик — резкое "черр".




Болотная камышевка
[591] — *Acrocephalus*
palustris
(Таблица 48)

В полевых условиях практически неотличима от тростниковой камышевки, хотя

надхвостье не рыжеватое, а оливковое, ноги светло-розовые, коготь заднего пальца короче самого пальца.

Гнездится в зарослях бурьяна, прибрежных кустарниках, на опушках и вырубках средней полосы и юга Европейской части России, на Кавказе. Кладка как у тростниковой камышевки. Песня более музыкальная, с канареечными трелями, отдельные звуки обычно не повторяются. Крик — резкое "чек-чек-черр".




Садовая камышевка
[592] — *Acrocephalus*
dumetorum
(Таблица 48)

Очень похожа на болотную камышевку, но надхвостье не оливковое или

рыжеватое, а сероватое, ноги светло-бурые.

Гнездится в сыром мелколесье, садах и на опушках почти по всей лесной зоне на восток до Забайкалья. В кладке 4-6 розоватых с белыми пятнами яиц. Песня как у болотной камышевки, но не такая быстрая, крик — резкое "чек-чек", которое обязательно входит и в песню, заканчивая каждую строфу.



Индийская камышевка
[593] — *Acrocephalus*
agricola
(Таблица 48)


Похожа на болотную камышевку [591], но спинная сторона светло-рыжеватая

(особенно надхвостье), светлая бровь далеко заходит за глаз.

Гнездится в прибрежных тростниках Приазовья, низовий Волги, степного юга Сибири от Урала до Тувы. В кладке 4-

5 желтоватых или светло-оливковых с бурыми пятнами яиц. Песня как у болотной камышевки, крик — мягкое "чик".


Чернобровая камышевка
[594] — *Acrocephalus*
bistrigiceps
(Таблица 48)



Похожа на садовую камышевку [592], но над белой, далеко заходящей за глаз бровью проходит черная полоса.

Гнездится на высокотравных болотах и лугах юга Восточной Сибири и Дальнего Востока, местами (например, в долине Уссури) крайне многочисленна. В кладке 4-6 оливковых с бурими пятнами яиц. Песня — разнообразный треск, крик — резкое "черр".


Камышевка-барсучок
[595] — *Acrocephalus*
shoenobaenus
(Таблица 48)



Меньше воробья, верх рыжевато-бурый, на голове и спине размытые продольные пестрины, брюшко охристо-белое. Яркая светлая бровь далеко заходит за глаз. Поющая птица взлетает и снова садится.

Гнездится в высокой траве, тростниках и кустарниках на болотах и сырых лугах почти повсюду западнее Енисея. В кладке 4-6 желтовато-серых с бурими крапинками яиц. Песня — разнообразный треск, например "цири-цири-тере-тере-чип...чип...тр-тр-тр...килили-клилили-чи-чи-тере-тере", крик — тихое "тук", "чр-чр-чр" или "фюить-кли-кли".


Вертялая камышевка
[596] — *Acrocephalus*
paludicola
(Таблица 48)



Похожа на камышевку-барсучка, но верх с более резкими пестринами, до-

ходящими до надхвостья, темя желтое, ограничено темными полосками, бровь палевая.

Гнездится на травяных болотах средней полосы Европейской части России и юга Западной Сибири, но попадает на глаза гораздо реже, чем барсучок. В кладке 5-6 желтых с оливковыми пятнами яиц. Песня, как у барсучка, крик — тихое "так-так" или "трр-тр".




**Тонкоклювая
камышевка [597] —
*Acrocephalus
melanopogon*
(Таблица 48)**

Похожа на камышевку-барсучка [595], но спина,

верх головы и щеки темнее, а хвост шире, сидящая птица часто им покачивает. Поет, сидя с опущенным хвостом на стебле тростника.

Гнездится в прибрежных тростниках и кустарниках Предкавказья и дельты Волги. В кладке 4-6 зеленоватых с бурыми крапинками яиц. Песня — громкие свисты и треск, повторяемые по 4-6 раз, крик — тихое "черр".



**Толстоклювая
камышевка [598] —
Acrocephalus aedon
(Таблица 48)**

Похожа на других крупных камышевок [589-594], но с сильным утолщенным

клювом и длинным ступенчатым хвостом, белая бровь почти или совсем не заметна.

Гнездится в кустарниках по опушкам и вырубкам, в поймах рек на юге Сибири и Дальнего Востока от Новосибирска до Приморья. Часто сидит на верхушках кустов и небольших деревьев. Гнездо в кусте, в кладке 4-6 розоватых или желтоватых с бурыми полосками и завитками яиц. Песня громкая, с красивыми свистами, крик — резкое "чок-чок" или "чок-чок-черре-чок-чок".

18.17.5. Род Сверчки — *Locustella*


Очень мелкие птицы (только таежный сверчок [605] немного крупнее воробья) со ступенчатым хвостом.

Сверчки живут в высокой густой траве и кустарниках, строят гнезда на земле или на траве над самой землей. Очень скрытные птицы, которых гораздо легче услышать, чем увидеть. Вспугнутые, летят низко и на короткое расстояние.

Песня многих видов напоминает стрекотание кузнечика или сверчка. Иногда летним днем голос птички настолько сливается со звоном бесчисленных насекомых, что кажется, будто она просто молча раскрывает клюв.

Семь видов.


Обыкновенный сверчок
[599] — *Locustella*
naevia
(Таблица 48)



Сверху оливково-бурый с продольными темными пятнами, размытой (а не резкой, как у мелких пятнистых камышевок [595-597]) светлой бровью, снизу светло-буроватый с белыми горлом и брюшком. Молодые птицы снизу желтоватые.


Гнездится на высокотравных лугах с мелким кустарником и в мелколесье средней полосы и юга Европейской части России, Кавказа, Зауралья, юга Сибири к востоку до Тувы и, возможно, на Южных Курилах. В кладке 4-7 белых или розоватых с розовыми пятнами яиц. Песня очень длинная, похожа на быстрое стрекотание кузнечика: "зи-зи-зизизи...", крик — "чирр". Поющий самец иногда садится на верхушки стеблей.

Пятнистый сверчок
[600] — *Locustella*
lanceolata
(Таблица 48)



Очень похож на обыкновенного сверчка, но бока и грудь с темными пестринами. Во время пения взбегает на верхушку травинки.

Гнездится по сырым лугам с отдельными кустами на большей части лесной зоны Сибири и Дальнего Востока, изредка в северной тайге Урала и Европейской части России. В кладке 5-6 белых с серыми и красноватыми пятнами яиц. Голос как у обыкновенного сверчка, но песня включает резкое дребезжание и посвисты.




Певчий сверчок [601] —
Locustella certhiola
(Таблица 48)

Похож на обыкновенного сверчка [599], но отличается рыжеватым надхвостом. Хвост более темный

к концу, часто с белым кончиком. По бокам шеи иногда несколько темных точек.

Гнездится на сырых высокотравных лугах с отдельными кустами почти по всей лесной зоне восточнее Иртыша. В кладке 4-6 розовых с красно-бурыми пятнами яиц. Песня — набор свистов и трелей с глухим треском, крик — резкий двусложный треск. Поющий самец часто вылетает на открытые места, садится на верхушки стеблей или с песней взлетает в воздух и снова садится, описав дугу, как мелкие камышевки, на которых очень похож.



Охотский сверчок
[602] — *Locustella*
ochotensis
(Таблица 48)

Очень похож на певчего сверчка, но пятна на спине нечеткие, размытые.

Гнездится в высокотравье Охотского побережья, Камчатки, островов Сахалин, Монерон, Курильских и, возможно, Командорских, на пролете встречается в Приморье. В кладке 5-6 розовых с черноватыми полосками яиц. Песня — резкое скрежетание "виче-виче-вич". Во время пения взлетает и снова садится, описав дугу.


Иногда встречаются гибриды с певчим сверчком. На островах в заливе Петра Великого гнездятся более темные пти-

цы, которых некоторые зоологи считают самостоятельным видом островной сверчок — *Locustella pleskei*.

Речной сверчок [603] —
Locustella fluviatilis
(Таблица 48)

Сверху темный, оливково-бурый без пестрин, снизу буроватый, горло светлое, на шее и груди темные пестрины.


Гнездится в поймах рек и густом подлеске лесной зоны Европейской части России и Зауралья. В кладке 5-7 белых с серыми и бурыми крапинками яиц. Песня длинная, похожа на монотонное стрекотание кузнечика или треск электромоторчика: "зерзерзер...", причем отдельные звуки не сливаются, в отличие от обыкновенного [599], пятнистого [600] и соловьиного сверчков. Крик — грубое "чек".



Соловьиный сверчок
[604] — *Locustella*
luscinioides
(Таблица 48)


Похож на речного сверчка, но сверху светлее, с рыжеватым оттенком, снизу почти или совсем без пестрин, светлой брови почти нет.

Гнездится в сырых прибрежных ивняках и тростниковых зарослях юга Европейской части России и Западной Сибири. В кладке 4-5 белых с бурыми пятнами яиц. Песня — постепенно нарастающие жужжащие звуки "зиррррр", крик — резкое "чк".



Таежный сверчок
[605] — *Locustella*
fasciolata
(Таблица 48)

Самый крупный сверчок (чуть крупнее воробья), сверху оливково-бурый, снизу



сероватый, горло белое, надхвостье рыжеватое. Молодые птицы с рыжим брюшком. От камышевок [589-598] и пестрогрудок отличается темными боками.


Гнездится в высокотравье с кустарниками на опушках и гаях юга Сибири и Дальнего Востока от Новосибирска до Южных Курил. В кладке 4 белых с синевато-серыми крапинками яйца. Песня — короткое звучное "рути-тути", "пури-рури". Во время пения взбегает по ветке с земли на верхушку куста.

18.17.6. Род Пестрогрудки — *Bradypterus*

Очень мелкие лесные птицы, похожие на мелких камышевок и сверчков, но с закругленным хвостом. На груди и горле темные пестрины, у взрослых птиц почти незаметные. Молодые птицы с желтоватым брюшком. Очень скрытные, держатся в густой траве и нижней части кустов.

Гнездо в виде шалашика в густой траве или куче хвороста в лесу с густым подлеском, на поляне или в пойме горной реки. В кладке 4-6 розовых с фиолетово-бурыми пятнами яиц.


В России два редких вида.



Малая пестрогрудка
[606] — *Bradypterus*
thoracicus
(Таблица 48)

Сверху темно-бурая, снизу светлая, подхвостье рыжевато-бурое с белыми пестринами. Поет в глубине зарослей.

Гнездится на юге Сибири и в Приморье. Песня — резкое "трзи-трзи".



Сибирская пестрогрудка
[607] — *Bradypterus*
taczanowskii

Сверху рыжевато-бурая, снизу светлая с темными пятнами по бокам груди, подхвостье рыже-бурое. Поет

в сумерках и ночью.


Гнездится на юге Сибири и Хабаровского края. Песня — скрипучее "тзе-тзе-тзе".

18.17.7. Род Широкохвостки — *Cettia*

Очень мелкие птицы однотонной окраски с закругленным хвостом, которым часто покачивают.

Гнездятся в густых кустах или высокой траве над самой землей, в кладке 3-5 красно-бурых яиц. В России два вида.


Обыкновенная широкохвостка [608] — *Cettia cetti*
(Таблица 47)



Ржаво- или каштаново-бурая сверху, светлая снизу, с короткой белой бровью, широким хвостом. Начинает петь в укрытии, потом взбегают на верхушку травинки.

Гнездится в прибрежных кустарниках и мелком тростнике Восточного Предкавказья и низовий Волги. Песня — короткое звонкое "цит-цивит-цивой-цивой-цивойт", крик — громкое "цвит-цвит", "цвицц" или "тич-ич-чи".

Короткокрылая широкохвостка [609] — *Cettia diphone*
(Таблица 47)




Верх зеленовато- или буrowато-серый, брюхо светлое. Бровь длинная, светлая. Поет в кроне дерева или куста.

Гнездится в густой траве и кустарнике, на высокотравных лугах и в бамбуковых зарослях Приморья, юга Сахалина и Курил. Гнездо — шар с боковым входом. Песня — громкое булькающее "ку-гу-у-ук...тюли-тюли... ку-гу-ук...тюли-тюли", крик — резкое "чак".

18.17.8. Род Полосатые камышевки — *Megalurus*

В России один очень редкий вид.




Японская камышевка
[610] — *Megalurus*
pygmaeus
(Таблица 47)

Птица меньше воробья, сверху бурая с темными продольными полосками и белой бровью, снизу бежевая. Хвост закругленный. Поет, взлетая по крутой дуге, как камышевка-барсучок [595] и некоторые сверчки.

Возможно, гнездится в плавнях на озерах Ханка и Торейских в больших массивах тростников. Песня — трескучие трели, крик — резкое "чак".

18.17.9. Род Короткохвостки — *Urosphena*

Один дальневосточный вид.



Короткохвостка
[611] — *Urosphena*
squameiceps
(Таблица 47)

Очень мелкая птица, отличающаяся от других славковых непропорционально коротким хвостом. Обликом несколько напоминает крапивника [503], но хвост не задирает. Сверху коричнево-бурая с чешуйчатым рисунком на голове и шее, снизу белая (в отличие от крапивника). Бровь белая, через глаз темная полоска.

Обитает в глухих лесах на юге Дальнего Востока. Гнездо из зеленого мха с выстилкой из шерсти располагает на земле, в кладке 5-7 розовых с сиреневыми пятнами яиц. Кормится в основном на земле, собирая насекомых и передвигаясь не прыжками, а шагом. Песня похожа на стрекотание цикады, крик — стрекотание и тихое "чмок". Очень редко попадает на глаза даже там, где обычна.

18.18. Семейство Корольковые – *Regulidae*

Очень мелкие оливково-зеленоватые птички, отличающиеся от славковых мягким пушистым оперением (похожи на маленький шарик, особенно зимой). На темени яркое пятно.


Гнездятся и постоянно держатся в кронах деревьев, чаще хвойных. Зимой кочуют в лесах и лесостепях, нередко вместе с синицами. Гнездо — глубокая чашечка, в кладке 7-12 розовых с бурыми крапинками яиц. Питаются насекомыми, изредка ягодами, зимой также семенами хвойных деревьев.

В России три вида, из которых обычен только желтоголовый королек.

18.18.1. Род Корольки – *Regulus*

Желтоголовый королек
[612] — *Regulus regulus*
(Таблица 51)

Темя желтое, по бокам обычно с черными полосками, не соединяющимися на лбу.




Гнездится в лесах, чаще всего еловых, в Европейской части России, на Кавказе, юге Сибири к востоку до Прибайкалья и на юге Дальнего Востока, зимой кочует по южной половине и западу страны. Один из немногих видов, обычных в густых молодых ельниках. Песня — тихое звенящее "ци-фли-хин...ци-фли-хин", крик — тихое "ци-ци-ци".

Самая маленькая из птиц, гнездящихся в России.

Красноголовый королек
[613] — *Regulus ignicapillus*
(Таблица 51)

Лоб и бровь белые, темя оранжево-желтое, ограничено черными полосками, соединяющимися на лбу.



Гнездится в лесах Краснодарского края, Калининградской и Псковской областей, зимой встречается в районе Со-

чи. Песня — постепенно повышающийся тонкий свист "фи-фи-фи-фи-фью", крик — тихое "ци-ци-ци".

На о.Врангеля залетал американский королек — *Regulus calendula* [614], без темных и светлых полос на голове, с красным пятнышком на темени и белым горлом.

18.19. Семейство Мухоловковые — *Muscicapidae*

Мухоловки — в основном очень мелкие насекомоядные птицы с широким клювом и короткими ногами. Хвост прямой или немного вырезанный. Часто сидят на выступающих сухих ветках, вспархивая за пролетающими насекомыми и вновь возвращаясь. Райские мухоловки [626, 627] крупнее и легко узнаются по яркой окраске и длинному, особенно у самцов, хвосту. Гнездятся в лесах, садах и парках.


В России встречаются мухоловковые четырех родов, все перелетные.

18.19.1. Род Серые мухоловки — *Muscicapa*

Сверху однотонные, буровато-серые, снизу светлые с серовато-бурным налетом на груди. На ветке сидят почти вертикально, опустив крылья и мелко трепеща ими.

Гнездо в развилке ствола, за отставшей корой, на ветке или в дупле, в кладке 3-6 зеленоватых с ржавчатыми пятнами яиц.

В России четыре вида.




Серая мухоловка
[615] — *Muscicapa
striata*
(Таблица 49)

На груди, лбу и темени темные струйчатые пестрины.

Гнездится в садах, парках, лесах, на опушках в Европейской части России и на юге Сибири к востоку до Читы. В

зеленых провинциальных городках порой встречается на бульварах и в скверах. Обычный обитатель вывешенных на опушке скворечников. Голос — громкое "тсить".


Сибирская мухоловка
[616] — *Muscicapa*
sibirica
(Таблица 49)



Очень похожа на серую мухоловку, но верх головы без пестрин, горло белое, грудь буроватая, на крыле узкая светлая полоска.

Гнездится в тайге южной половины Сибири и Дальнего Востока на запад до Алтая. Голос — тихое потрескивание.


Пестрогрудая мухоловка
[617] — *Muscicapa*
griseisticta
(Таблица 49)



Очень похожа на сибирскую мухоловку, но пестрины на груди четкие, а не размытые.

Гнездится в тайге юго-востока Якутии и юга Дальнего Востока. Голос — громкое "сиит" или "титтит".

Ширококлювая мухоловка [618] —
Muscicapa latirostris
(Таблица 49)



Похожа на других серых мухоловок, но грудь без темных пестрин, вокруг глаза узкое белое кольцо.


Гнездится в основном в лиственных лесах юга Сибири и Дальнего Востока на запад до Оби, изредка залетает в Европейскую часть России. Голос — звонкое "сиит-сит".

18.19.2. Род Пестрые мухоловки — *Ficedula*

Самцы сверху черно-белые или серые с черно-белым хвостом, снизу белые, желтые или рыжие. Самки и молодые птицы сверху бурые, снизу белые, реже желтоватые.

Гнездятся в дуплах, таежная мухоловка [621] — на основаниях толстых веток.

В России семь видов.




Мухоловка-пеструшка
[619] — *Ficedula*
hypoleuca
(Таблица 49)

Самец сверху черный с белыми полосками на лбу и крыле, снизу белый. У

самки черный цвет заменен серовато-бурым.

Гнездится в светлых лесах и парках на восток до Красноярска (на Кавказе встречается только на пролете). Обычна в высокоствольных березняках, старых дубравах, липняках. Охотно занимает вывешенные в лесу дуплянки. В кладке 5-7 голубых яиц. Песня — звонкая трель "пичи-пичи-кули-личи" или "цитру-цитру-три-крути-крути-три", крик — звонкое "пии".




Мухоловка-белошейка
[620] — *Ficedula*
albicollis
(Таблица 49)

Очень похожа на мухоловку-пеструшку, но по бокам шеи белые полоски,

иногда соединяющиеся на затылке, надхвостье светлое, самки серые почти без буроватого оттенка.

Гнездится в высокоствольных лесах юга Европейской части России и Краснодарского края. Кавказских птиц, отличающихся белыми полосками по бокам хвоста, некоторые зоологи считают самостоятельным видом **полуошейниковая мухоловка** — *Ficedula semitorquata*. Кладка и голос, как у пеструшки.


Таежная мухоловка
[621] — *Ficedula*
mugimaki
 (Таблица 49)



У самца верх черный, бровь, полоса на крыле и брюшко белые, горло и грудь рыжие. Самки и молодые птицы сверху серые без белых полос на крыле, снизу рыжеватые с белым брюшком, хвост серый (в отличие от малой мухоловки [624]).

Гнездится в высокоствольной тайге южной половины Сибири и Дальнего Востока на запад до Алтая, в кладке 4-8 оливковых с коричневыми пятнами яиц. Песня — звонкая трель, крик — сухое скрипучее потрескивание.


Желтоспинная мухоловка
[622] — *Ficedula*
zanthopygia
 (Таблица 49)



Самец сверху черный, брюхо и надхвостье ярко-желтые, бровь и полоса на крыле белые. Самки и молодые птицы серо-оливковые с желтоватыми надхвостьем и низом, белой полосой на крыле.


Гнездится в пойменных лесах Приамурья, Приморья и, возможно, юго-восточного Забайкалья. В кладке 4-7 белых с кирпично-красными пятнами яиц. Песня — быстрая трель "пипипитью-пиу-фы", крик — короткий посвист.

Японская мухоловка
[623] — *Ficedula*
parcissina
 (Таблица 49)



Очень похожа на желтоспинную мухоловку, но ярче, у самца бровь желтая, у самок и молодых птиц надхвостье такое же серо-оливковое, как и спина, крыло без белой полосы.

Гнездится в пойменных зарослях островов Сахалин (юг), Монерон, Кунашир и Шикотан. Песня — трехсложный свист и щебет, крик — быстрый посвист.



Малая мухоловка
[624] — *Ficedula parva*
(Таблица 49)


Серая сверху, серовато-белая снизу, хвост белый с черным рисунком в виде буквы "Т", у самца рыжее

горло, самка сверху с буроватым оттенком.

Гнездится в высокоствольных лесах почти по всей лесной зоне, на Кавказе. По поймам рек проникает в лесотундру. В кладке 5-6 желтых или зеленоватых с розовыми пятнами яиц. Песня — звонкая трель, крик — сухой треск "трр" или посвисты "хи-ли".

18.19.3. Род Синие мухоловки — *Cyanoptila*

В России один дальневосточный вид.



Синяя мухоловка
[625] — *Cyanoptila cyanomelana*
(Таблица 49)

Самец очень яркий, синий с черным горлом и грудью, белым брюшком. Самка

и молодые птицы серовато-бурые с рыжим надхвостом, буроватыми боками и светлыми горлом и брюшком.

Гнездится в Приморье, Южном Приамурье, на острове Кунашир и, возможно, на Сахалине в густых лесах и по берегам таежных рек. Гнезда на скалах, в пнях и дуплах. В кладке 4-5 розоватых яиц. Песня — набор красивых трелей.

18.19.4. Род Райские мухоловки — *Terpsiphone*


Этих птиц очень легко узнать по черной голове с острым хохлом и длинному клиновидному хвосту, который

у самцов заканчивается парой узких перьев, вдвое длиннее, чем сама птица. Клюв, ноги и кольцо вокруг глаза голубые.

Гнездятся в широколиственных лесах, гнездо — маленькая чашечка в развилке тонкой ветки, сплетенная из лубяных волокон. В кладке 2-5 розоватых с коричневыми пятнами яиц.

В России два дальневосточных вида.

Райская мухоловка
[626] — *Terpsiphone*
paradisi
(Таблица 49)



Голова с зеленым отливом, верх рыжий, брюхо серовато-белое. Некоторые самцы белые с черной головой.

Гнездится в Приморье и южном Приамурье. Песня — красивый низкий свист "и-тю-лю-лю-гу", крик — резкое "четтрх-четр" или "джзи-джзи".


В Южное Приморье залетает японская черная райская мухоловка — *Terpsiphone atrocaudata* [627], (Таблица 49), самец сверху темно-фиолетовый, самка бурая, голос — трехсложный щебет, затем тихий тройной свист.

18.20. Семейство Белоглазковые — *Zosteropidae*

Очень мелкие насекомоядные птицы, похожие на пеночек [570-584], но с белым кольцом из мелких перышек вокруг глаза. Сверху зеленые, грудь и подхвостье желтые, брюшко белое.

Гнездятся в пойменных и смешанных лесах, гнездо — глубокая чашечка на ветке дерева, в кладке 2-6 голубоватых яиц. Осенью кочуют в кустарниковом подлеске, по опушкам, вдоль лесных дорог, иногда вместе с синицами и пеночками.


В России два перелетных дальневосточных вида.

18.20.1. Род Белоглазки — *Zosterops*

Буробокая белоглазка
[628] — *Zosterops*
erythropleura
(Таблица 47)

Сверху желтоватая; бока белые, у самца с ярким каштановым пятном.

Гнездится в Приамурье и Приморье, на пролете обычна в Южном Приморье. Голос — звонкое "циплии".



Японская белоглазка
[629] — *Zosterops*
japonica
(Таблица 47)

Сверху яркая, с оливковым оттенком; бока коричневые без резких бурых пятен.

Гнездится на крайнем юге Сахалина. Довольно редка. Голос — звонкое "ци" или "чуи?"

18.21. Семейство Древесницевые — *Parulidae*

Мелкие насекомоядные птицы с желтыми тонами в окраске. На Чукотку залетают (чаще поздней весной и в конце лета) 3 или 4 североамериканских вида.

Речная древесница [630] — *Seiurus noveboracensis*, сверху оливково-бурая, снизу серо-желтая с резкими темными пестринами, сливающимися в продольные полосы, бровь охристая, ходит, "кивая" головой, держится обычно на земле у воды, голос громкий и звонкий.

Малая древесница [631] — *Wilsonia pusilla*, похожа на пеночку [570], но брюхо, бока головы и лоб ярко-желтые, у самца черная шапочка, часто ловит насекомых в воздухе, голос — постепенно понижающееся "пиньканье".

Миртовая древесница [632] — *Dendroica coronata*, спинная сторона темно-серая или буроватая с черными пестри-

нами; темя, плечо и надхвостье ярко-желтые, хвост с белыми пятнами. брюшко и горло белые. грудь у самца черная, вокруг глаза узкое белое кольцо.

На Чукотку возможны залеты также желтой древесницы — *Dendroica petechia*, желтоватой с ярко-желтой в красновато-коричневых пестринах грудью. Песня состоит из 6-7 свистовых нот, самая высокая из которых 2-я.


Во время подготовки книги к печати появились неподтвержденные сведения о встрече на Чукотке еще одного североамериканского вида, рыжешапочной древесницы — *Vermivora celata* (Таблица 46). Она желто-зеленой окраски с желтой бровью, размытыми пестринами на груди и небольшим красно-коричневым пятнышком на темени. голос — быстрое пошелкивание.

18.22. Семейство Ремезовые — *Remizidae*

Очень мелкие, заметно меньше воробья, насекомоядные птицы. В России один перелетный вид.

18.22.1. Род Ремезы — *Remiz*

Ремез [633] — *Remiz pendulinus*
(Таблица 51)



Очень мелкая, заметно мельче воробья, птица. Спинная сторона коричневая, брюшко охристо-белое. Голова белая с широкой черной полосой, проходящей через глаз, реже черная или коричневая; горло иногда черное.

Распространен в Средней полосе (где редок) и на юге Европейской части России, на юге Сибири к востоку до Забайкалья, местами в Приамурье. Зимой изредка встречается в Предкавказье. Обитает в пойменных лиственных лесах с зарослями тростника или ивы. Держится в кронах деревьев.

Распространен в Средней полосе (где редок) и на юге Европейской части России, на юге Сибири к востоку до Забайкалья, местами в Приамурье. Зимой изредка встречается в Предкавказье. Обитает в пойменных лиственных лесах с зарослями тростника или ивы. Держится в кронах деревьев. Гнездо представляет собой овальный мешок со входом в виде короткой трубки в верхней части и свито из травы и растительного пуха (ив, тополей, рогоза). Помещается постройка между тонких свисающих ветвей деревьев, часто над во-

дой. Строительство такого сложного сооружения занимает около двух недель. В кладке 5-10 белых яиц. Голос — тонкий свист "тсии".


18.23. Семейство Синицевые — *Paridae*

Мелкие и очень мелкие лесные птицы плотного сложения с коротким острым клювом и контрастной окраской головы.

Гнездятся обычно в дуплах. В кладке 3-13 белых с красноватыми пятнами яиц, за лето часто бывает две-три кладки. Осенью и зимой кочуют стайками, обычно состоящими из синиц нескольких видов, поползней, пищух, дятлов; в это время обычны в садах, парках и поселках. Питаются в основном насекомыми, семенами растений. В морозные дни часто ночуют, забравшись под снег у корней деревьев или кустарников, а обычно проводят ночь в дуплах и других укрытиях.

В России десять видов.

18.23.1. Род Синицы — *Parus*



Большая синица
[634] — *Parus major*
(Таблица 50)

Голова черная с белыми щеками и затылком, спинная сторона зеленоватая (реже голубоватая), брюшко яр-

ко-желтое с черной продольной полосой, более широкой у самцов.


Гнездится в лесах и парках Европейской части России, Кавказа, юга Сибири и Приамурья. Чаше других синиц поселяется рядом с человеком. Обычный посетитель кормушек в городских парках. Кое-где к декабрю синицы уже приучаются брать корм с протянутой ладони. Песня — громкий перезвон "ци-ци-ци-пи", "ин-чи-ин-чи", крик — звонкое "пинь-пинь-чрррж". Похожая на размеренный звон колокольчика песенка большой синицы — первый признак приближения весны на хмурых обледеневших улицах больших городов. Обычно ее можно услышать в первый солнечный день февраля.

Малая синица [635] —
Parus minor
 (Таблица 50)

Очень похожа на большую синицу, но зашеек зеленоватый, остальная спина серая, брюшко белое.

Гнездится на юге Дальнего Востока, на зиму почти все птицы улетают на юг.


В районах, пограничных с Казахстаном, возможны встречи среднеазиатской серой синицы — *Parus bokharensis*. Она похожа на большую и малую синиц, но спина серая без зеленых тонов, брюшко светло-серое с черной продольной полоской.



Лазоревка [636] —
Parus caeruleus
 (Таблица 50)

Спина зеленая, крылья и хвост голубые, голова белая с голубой шапочкой и черными ошейником и полосой через глаз, брюшко желтое.


Гнездится в лиственных и смешанных лесах Европейской части России и Кавказа, осенью и зимой часто появляется в населенных пунктах в стаиках больших синиц. К марту покидает общие стаи и держится парами. Песня — короткая журчащая трель, крик — звонкое "ци-ци-циррзь".




Белая лазоревка [637] —
Parus syanus
 (Таблица 50)

Спинная сторона серовато-голубая, крылья и хвост голубые; брюшко, голова, две широкие полосы на крыле и полосы по краям хвоста белые; через глаз проходит голубая или черная полоска.

Распространена от Европейской части России (где редка) до юга Сибири и Дальнего Востока. Гнездится в смешанных



и лиственных лесах, чаще всего пойменных. Песня — короткая трель, крик — звонкое "ци-ци-ци-тррж".



Московка [638] —


Parus ater

(Таблица 50)

Спинная сторона серая, голова черная с белыми щеками (ограниченными снизу черным) и затылком, брюшко светло-серое без

черной продольной полосы.

Гнездится в хвойных, реже густых смешанных лесах почти по всей лесной зоне, кроме севера Сибири. Редко посещает кормушки и почти никогда не залетает в населенные пункты. Песня — звонкое "ци-пи, ци-пи" или "ти-ти-туй", крик — тонкое "цит".




Тиссовая синица

[639] — *Parus varius*

(Таблица 50)

Спинная сторона серая, голова черная с охристыми щеками, лбом и затылком, брюшко и зашеек коричнево-рыжие.

Гнездится в темнохвойных лесах Южных Курил. Песня — медленное "ци-ци-шш" с ударением на последний слог, крик — резкое "ции".



Пухляк [640] — *Parus*

montanus

(Таблица 50)


Спинная сторона серая, верх головы и подбородок черные, щеки и брюшко серовато-белые (у северных птиц щеки чисто-белые),

причем щеки не ограничены снизу черной полосой; на крыле обычно размытое светлое пятно.

Гнездится по всей лесной зоне, кроме Кавказа и Южных Курил, местами в лесотундре и лесостепи, но предпочитает

хвойные леса. Умеет самостоятельно выдалбливать дупла с входом неправильной формы в деревьях с мягкой прогнившей древесиной. Песня — сухое "ци-ци-ци", реже звонкое шепетание. крик — звонкое "циээ" или "дзее".

Черноголовая ганчка
[641] — *Parus palustris*
 (Таблица 50)



Почти неотличима от пухляка, но черная шапочка на голове с синим блеском и не заходит на затылок, клюв короче и толще, крыло однотонное, щеки всегда сероватые.

Гнездится в лиственных, пойменных, реже смешанных лесах (часто заболоченных), садах и парках Европейской части России, Кавказа, юга Сибири (на запад до Алтая) и Дальнего Востока. Зимой иногда посещает кормушки. Голос — звонкое "ци-ци-чжжээ-чжээ", "пинь-трр" или печальный свист "пю-юй-пюй-пюй", у кавказских птиц — громкая трель.

Сероголовая ганчка
[642] — *Parus cinctus*
 (Таблица 50)




Спинная сторона серовато-бурая, щеки и брюшко белые, бока с явным рыжеватым оттенком; горло буро-черное, причем черный цвет почти отграничивает снизу белые щеки.

Гнездится в тайге севера Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока (кроме юга), в горах Алтая, Саян, Тувы, местами в лесотундре, в суровые зимы изредка появляется в Средней полосе. Гнездится в дуплах, но сама их не долбит, а занимает естественные или уже готовые дупла дятлов или других синиц. Одна из немногих насекомоядных птиц, рискующих зимовать у северной границы тайги. Довольно молчалива, голос похож на голос пухляка.

На севере Дальнего Востока возможны встречи канадской ганчки — *Parus hudsonicus*, очень похожей на сероголовую

гаичку, но с коричневой шапочкой и более ярким рыжим оттенком на боках.



Хохлатая синица
[643] — *Parus cristatus*
(Таблица 50)

На голове большой острый полосатый хохол, спинная сторона серовато-бурая; горло, затылок и полоска

через глаз черные, голова и брюшко белые с буроватым налетом. Стайками встречается редко.

Гнездится в основном в светлых хвойных и смешанных лесах Европейской части России и Южного Зауралья. В последние годы численность заметно снизилась. Голос — громкое "ци-ци-тррч".


18.24. Семейство Поползневые — *Sittidae*

Мелкие лесные птицы, способные легко передвигаться по стволам деревьев. Клюв острый, сильный, хвост короткий, прямой. Спинная сторона голубовато-серая, брюшная светлая, палевая или рыжая, через глаз проходит черная полоска.

Питаются насекомыми, реже семенами, орехами и желудями. Гнездятся в дуплах, осенью и зимой часто кочуют в стаях синиц. В кладке 5-8 белых с красноватыми пятнами яиц.

В России три вида, из них обычен и широко распространен только обыкновенный поползень.

18.24.1. Род Поползни — *Sitta*



Обыкновенный поползень
[644] — *Sitta europaea*
(Таблица 51)


Верх головы серый, брюхо охристое, белое с рыжими боками, бока хвоста черно-белые.

Гнездится и зимует почти по всей лесной зоне, на Кавказе. Занимая дупла дятлов, вход обмазывает глиной, чтобы сделать его более узким и недоступным для хищников. Очень редко строит гнезда в щелях скал в тайге. Кормится обычно на толстых стволах деревьев, двигаясь вниз головой. Часто посещает кормушки, в городских парках приучается брать корм с протянутой ладони. На зиму запасает семена деревьев в трещинах коры. Значительная часть этих запасов впоследствии достается синицам.

Благодаря своеобразной манере движения поползень избегает конкуренции с товарищами по стайкам — синицами и пищухами. Ползая вниз по стволу, он достает мелких насекомых в основном из трещин коры, открывающихся сверху; в то время как синицы — из открывающихся вбок; а пищухи — вниз.

Песня — громкий повторяющийся посвист "тюии", крик — звонкое "тьоч-тьоч-тьоч" или "тцит".


Черноголовый поползень [645] — *Sitta krueperi*
(Таблица 51)



Верх головы в основном черный (у молодых птиц темно-серый), брюхо светлое, на зобу поперечное каштановое пятно, бровь обычно белая.

Гнездится в густых хвойных лесах Западного Кавказа. Кормится обычно на боковых ветках. Песня — громкий печальный прерывистый свист, крик — громкое "чшшш-чшшш".

Рыжегрудый поползень [646] — *Sitta villosa*
(Таблица 51)



Верх головы черный, брюхо палевое или рыжеватое, горло белое.

Гнездится на юге Приморья в глухих лесах. Очень редок. Голос — тихое "чи-чи-чи".

В период подготовки книги к печати поступило сообщение о встрече на о. Врангеля залетного канадского пополз-

ня — *Sitta canadensis*. Он очень похож на черноголового поползня [645], но белая бровь более яркая.

В безлесных горах Дагестана и Алтая может быть встречен скалистый поползень — *Sitta tephronota* (Таблица 51), похожий на обыкновенного поползня [644], но хвост однотонно-серый, низ белый, бока рыжеватые. Гнездится в нишах скал, обмазывая вход глиной, реже строит глиняные гнезда в виде кувшина с трубкой-входом. Песня — громкая нисходящая трель, крик — громкое "чир!"

18.25. Семейство Пищуховые — *Certhiidae*


Мелкие, заметно мельче воробья, птицы с тонким, длинным, изогнутым книзу клювом. Крылья широкие. Хорошо лазают снизу вверх по деревьям и скалам, опираясь на хвост. Гнездятся в разнообразных укрытиях. В кладке 3-8 белых с красноватыми пятнами яиц.

Питаются преимущественно насекомыми. Оседлы или совершают недалекие кочевки. В России три вида.

18.25.1. Род Пищухи — *Certhia*

Сверху коричневые с беловатыми продольными пестринами, снизу белые. Лесные птицы, кормятся на стволах деревьев, ползая по ним снизу вверх по спирали и опираясь на жесткие перья хвоста.

Гнездятся за отставшей корой, в трещинах стволов деревьев, реже в дупле. Часто кочуют в стаях синиц.



Обыкновенная пищуха
[647] — *Certhia familiaris*
(Таблица 51)


Бока чисто-белые, надхвостье чуть красноватое, коготь заднего пальца длиннее

самого пальца.

Гнездится и зимует по всей лесной зоне, кроме северных районов, в хвойных лесах Кавказа. Встречается в старых пар-

ках. Легче всего найти ее зимой там, где кормится стайка синиц. Ползущая по стволу пищука иногда подпускает человека вплотную. Песня — звонкая быстрая трель, крик — тихое "тсии".

Короткопалая пищука
[648] — *Certhia*
brachydactyla
(Таблица 51)




Очень похожа на обыкновенную пищуку, но бока с буроватым налетом, надхвостье бурое, коготь заднего пальца короче самого пальца.

Гнездится и зимует в лиственных лесах окрестностей Сочи. Песня — тихая трель, крик — твердое звонкое "крути-верти" или "циит".

18.25.2. Род Стенолазы — *Tichodroma*

Краснокрылый стенолаз
[649] — *Tichodroma*
muraria
(Таблица 51)



Серый с черными в белых пятнах крыльями и хвостом, на крыльях широкая малиново-красная полоса. Горло летом черное, зимой белое. В полете напоминает большую яркую бабочку. Кормится на скалах и камнях, изредка на стенах зданий, перепархивая с места на место.

Гнездится в высокогорьях и глухих тенистых ущельях Кавказа и (очень редко) Центрального Алтая в расщелинах скал, зимой откочевывает в предгорья и иногда появляется на обрывистых берегах Азовского моря. Голос — низкий свист "циуу".

18.26. Семейство Вьюрковые — *Fringillidae*

Мелкие птицы плотного сложения с крепким, довольно толстым клювом. Питаются в основном семенами и плодами растений, но птенцов почти все выкармливают насекомыми.

Большинство видов гнездится на деревьях или кустарниках в лесах и редколесьях, но некоторые — на земле в высокогорьях или каменистых степях и пустынях. У многих выюровых песня заканчивается характерным жужжащим звуком.

Очень популярны как клеточные певчие птицы.


В России 12 родов.

18.26.1. Род Выюрки — *Fringilla*

Лесные птицы размером с воробья, крылья черные или темно-бурые с двумя белыми полосками. Кормятся обычно на земле, поют в кронах.

Гнездо — аккуратная постройка из соломы, веточек, зеленого мха — маскируется снаружи кусочками лишайников или бересты, лоток выстлан перьями и шерстью. Располагается гнездо на деревьях. В кладке 4-7 зеленоватых с краснофиолетовыми крапинами яиц. Осенью и зимой иногда встречаются огромными стаями.

В России два вида.



Зяблик [650] — *Fringilla coelebs*

(Таблица 52)

У самца весной верх головы синеовато-серый, спина каштановая, щеки и брюхо красновато-коричневые,

надхвостье зеленоватое; осенью верх головы буроватый. Самка и молодые птицы серые с зеленоватым надхвостьем.

Одна из самых многочисленных птиц в лесах и парках Европейской части России, гнездится на Кавказе и на юге Сибири к востоку до Предбайкалья, зимой обычен в предгорных лесах Кавказа. В некоторых местах весной можно одновременно слышать несколько десятков поющих птиц. Песня — громкая трель с резким окончанием: "фьит-фьит-ля-ля-ви-чиу-кик". Крик — звонкое "пиньк-пиньк", часто слышное на лету, и громкое "рюю"; у птиц с Кавказа и из Карелии — короткий свист.


Крик "ррюю" служит сигналом тревоги. Во многих книгах можно прочитать, что, по народной примете, зяблики "рюмят"

к дождю. Действительно, они кричат так перед дождем, но лишь тогда, когда тучи затянут небо и в лесу станет темно, так что уже и без них ясно: лучше из дому не выходить.

Юрок [651] — *Fringilla montifringilla*
(Таблица 52)

У самца в весеннем наряде голова, спина, крылья и хвост черные; горло, надхвостье, полосы на крыле и брюхо белые; грудь и широкая полоса на плечах оранжевые. У дальневосточных птиц полосы на крыле часто коричневые, а не белые. Самка и молодые птицы окрашены более тускло.

Обычен повсюду в тайге и лесотундре, кроме Забайкалья и юга Дальнего Востока. Зимует на Кавказе и юге Сибири. Песня — негромкое скрипучее щебетание, заканчивающееся резким "чжжж", крик — протяжное "кевк", в полете — резкое "чи-чи" или "вжя".



18.26.2. Род Щеглы — *Carduelis*


Птицы размером с воробья или меньше с вырезанным хвостом и ярко-желтыми полосками на крыльях. В кладке 3-6 голубых с фиолетовыми или буроватыми пятнами яиц. Вне периода гнездования кочуют небольшими стайками. Полет волнообразный. Часто поют, сидя на проводах или вершине дерева.

В России пять видов.


Щерол [652] — *Carduelis carduelis*
(Таблица 52)

Передняя часть головы ярко-красная, верх головы черный, щеки и надхвостье белые, спина каштановая.

Молодые птицы без красного на голове, с мелкими пестринами на спине и груди.




Гнездится на деревьях по опушкам лесов (сплошных лесных массивов избегает), садах и парках. Распространен в Европейской части России, Западной Сибири и на Кавказе. Зимой кочует по открытым местам в районах гнездования. Кормится на кустах чертополоха, репейника. Часто стайки щеглов залетают в города, где их можно увидеть на заросших бурьяном пустырях. Песня — красивые звонкие трели. крик — звонкое "пить-пили-пить".



Седоголовый щегол
[653] — *Carduelis*
caniceps
(Таблица 52)

Очень похож на щегла, но голова серая с красной передней частью.

Гнездится и зимует на юге Сибири от Томска до Забайкалья.



Обыкновенная зеленушка
[654] — *Carduelis*
chloris
(Таблица 52)


Птица размером с воробья, с толстым светлым клювом, хвост вырезанный,

черный с желтыми пятнами по бокам. Самец зеленый сверху, желто-зеленый снизу, верх головы и щеки серые. Самка и молодые птицы буроватые (от самки обыкновенной чечевицы [670] отличаются более толстым светлым клювом и желтыми пятнами на хвосте).

Гнездится в лесах (преимущественно смешанных и лиственных) в Европейской части России и на Кавказе. Зимует в местах гнездования и Предкавказье. Гнездо на дереве или кусте. Осенью и зимой встречается стайками, часто вместе с другими вьюрковыми или воробьями. В это время нередко появляется в городах и поселках.

Песня — журчащая трель, заканчивающаяся резким "вжж", крик — громкая трель или гнусавое "твии".


Китайская зеленушка
[655] — *Carduelis sinica*
 (Таблица 52)



Немного похожа на зеленушку [654], но окраска каштаново-коричневая, голова сероватая, клюв розовый.

Гнездится и частично зимует в Забайкалье и на юге Дальнего Востока в лиственных и смешанных лесах. Голос — журчащая трель.

Чиж [656] — *Carduelis spinus*
 (Таблица 52)



Очень мелкая птичка плотного сложения, зеленоватая с желтыми полосками на крыльях и по бокам основания хвоста. У самцов шапочка, горло, хвост и крылья черные, щеки и грудь желтоватые. Бока в темных пестринах, клюв острый, заметно тоньше, чем у чечеток и канареечных вьюрков [657-662].

Распространен в хвойных лесах Европейской части России, Кавказа, юга Сибири и Дальнего Востока. Гнездится высоко на деревьях. Зимой кочует стайками почти по всей стране, часто по березнякам и ольшаникам, иногда вместе с чечетками. Песня — журчащая трель, крик — звонкое "тилли-тии".


Гнездо чижа очень трудно найти, в связи с чем в некоторых районах существует поверье, что он кладет в гнездо "кашечек-невидимку".

18.26.3. Род Чечетки — *Acanthis*

Птицы заметно меньше воробья, очень плотного сложения, серо-бурой окраски, с вырезанным хвостом.

Гнездятся в тайге и открытых ландшафтах. В кладке 4-6 голубых с красновато-бурыми пятнами яиц. Осенью и зимой кочуют плотными стайками и часто попадают на глаза. Кормятся на деревьях, кустах и на земле.

В России четыре вида.



Обыкновенная чечетка
[657] — *Acanthis*
flammea
(Таблица 52)

Верх серо-бурый с черными пестринами, брюшко светлое с пестринами на

боках, горло черное, хвост темный, на лбу яркая малиновая шапочка. У самца грудь часто малиновая.

Гнездится на кустах и низко на деревьях в тундре и тайге, зимой кочует по всей стране. Найдя березу с большим количеством сережек, чечетки облепляют ее и кормятся иногда по два-три дня на одном дереве. Песня — тихий щебет, крик — звонкое "че-чет" и "пи-ю-ии".




Пепельная чечетка
[658] — *Acanthis*
hornemannii
(Таблица 52)

Похожа на обыкновенную чечетку, но светлее, надхвостье белое, у самцов

грудь нежно-розовая.

Распространена в тундре и лесотундре, на Командорах. Гнезда строит на кустах или на земле между камнями. Зимой кочует до Средней полосы на юг, часто в стаях обыкновенной чечетки. Голос как у обыкновенной чечетки.



Горная чечетка [659] —
Acanthis flavirostris
(Таблица 52)


Похожа на обыкновенную чечетку [657], но голова без малиновой шапочки, горло белое, у самцов

надхвостье розовое. В полете кажется светлой.

Гнездится на кустах на северо-западе Кольского полуострова, в горах Кавказа, Алтая и Тувы, в дюнах Нижнего Поволжья, зимой встречается также на северо-западе Европей-

ской части России, в основном по открытым местам. Песня — щебет, крик — звонкое "пии-тити" и металлическое "твии".

Коноплянка [660] —
Acanthis cannabina
(Таблица 52)



Спинная сторона буровато-коричневая без пестрин, снизу светлая. На крыле и боках хвоста размытые светлые пятна, горло светлое, надхвостье белое. У самца летом на лбу и боках груди ярко-красные пятна, голова сероватая.

Распространена в Европейской части России, на Кавказе и юге Сибири, доходя на востоке до Алтая. Гнездится на опушках и в кустах в лесостепях, степях и культурном ландшафте. Зимует в основном в степной зоне, реже в Средней полосе. Песня — набор свистов и трелей, крик — щебетание "тк-тк-тк" и "цвии", часто слышное в полете.


18.26.4. Род Канареечные вьюрки — *Serinus*

Очень мелкие птицы с коротким толстым (в отличие от чижа [656]) клювом. Надхвостье желтое или оранжевое.

Кормятся в основном на земле, гнездятся на кустах и деревьях (чаще хвойных), в трещинах скал. В кладке 3-5 голубоватых с коричневыми пятнами яиц. Песня — звонкие трели, крик — журчащее "чирлит".


В России два вида.

Канареечный вьюрок
[661] — *Serinus serinus*
(Таблица 52)



Желто-зеленый, с бурыми крыльями и хвостом без светлых пятен. На спине, боках, у самок — на груди темные пестрины. Брюшко белое.

Гнездится в культурном ландшафте запада Европейской части России, постепенно расселяется на восток. Зимой встречается в Калининградской области.



Королевский вьюрок [662] — *Serinus pusillus*
(Таблица 52)

Голова и грудь черные, остальное оперение оранжевое с густыми темными пестринами (в природе кажется почти черным), брюхо светлое, у взрослых на темени алая шапочка.

Гнездится в горах Кавказа на высотах 1500-3000 м над уровнем моря, зимует в предгорьях и горных степях.


Канарейки, которых содержат в клетках, происходят от канарского вьюрка — *Serinus canaria*, обитающего на одноименных островах.

18.26.5. Род Горные вьюрки — *Leucosticte*

Мелкие птицы темной буровато-серой окраски с довольно длинным, глубоко вырезанным хвостом. От завирушек [504-510] отличаются также толстым клювом. Ноги черные. Встречаются обычно стайками, даже в период гнездования.

Гнездятся под камнями, в трещинах скал и норах в высокогорьях и тундрах. Иногда строят гнезда выше снеговой линии, чаще на северных склонах, а за кормом летают далеко вниз. Зимой частично откочевывают в предгорья, но многие остаются в высокогорьях, по свободным от снега склонам. В кладке 3-5 белых яиц. Птенцов выкармливают незрелыми семенами альпийских трав. Ночуют в пещерах, собираясь в плотные кучи, порой по несколько сотен птиц сразу. Голос — негромкое "чпр".

В России пять видов.




Сибирский вьюрок [663] — *Leucosticte arctica*
(Таблица 54)

Крылья, хвост и зашеек серебристо-серые, остальное оперение темно-бурое с розовыми пятнами.

Гнездится на Алтае, в Саянах и Прибайкалье в горах выше границы леса.

Дальневосточный вьюрок [664] — *Leucosticte pustulata*
(Таблица 54)



Темно-бурый с розоватыми плечами, черными лбом и щеками, коричневым верхом головы и затылком, брюхо в розоватых пятнах.


Гнездится в горных и каменистых прибрежных тундрах Северо-Восточной Сибири, Чукотки, Камчатки и Северных Курил, зимой встречается в Забайкалье и на юге Дальнего Востока по открытым местам и морским побережьям.

Американский вьюрок [665] — *Leucosticte tephrocotis*
(Таблица 54)

Очень похож на дальневосточного вьюрка, но крупнее (почти со скворца), голова серая с черным лбом.

Гнездится и зимует на Командорских островах.


Жемчужный вьюрок [666] — *Leucosticte brandti*
(Таблица 54)



Похож на дальневосточного вьюрка [664], но светлее, основная окраска светло-серая, на сгибе крыла и надхвостье розоватые перья, весной лоб черный.

Редкий вид Центрального Алтая, гнездится выше 2000 м над уровнем моря.

Гималайский вьюрок [667] — *Leucosticte nemoricola*
(Таблица 54)



Спина, плечи и бока с черными продольными пестринами, у молодых птиц

голова рыжеватая, остальное оперение буровато-серое без розовых пятен, на крыле светлые полосы.


Гнездится в горах Алтая, Саян и Тувы выше границы леса.

18.26.6. Род Пустынные вьюрки — *Bucanetes*

Птицы размером с воробья, песочного цвета; брюхо, надхвостье, бока темени и концы крыльев розоватые.

Гнездятся в полупустынях в щелях скал, среди камней, в кладке 5 голубых с черными пятнами яиц. Крик — частое "кэ-кэ-кэ".

В России два вида.




Монгольский вьюрок
[668] — *Bucanetes*
mongolicus

Темя серое.

Гнездится и зимует в сухих горных степях Алтая и Тувы, в холодное время

года нередко появляется в поселках.



Краснокрылый вьюрок
[669] — *Bucanetes*
sanguinea
(Таблица 54)

Более темный, чем монгольский вьюрок, темя буро-черное.


Гнездится в горах зарубежной Азии, зимой изредка встречается в предгорьях Восточного Кавказа.

18.26.7. Род Чечевицы — *Carpodacus*

Величиной с воробья (большая чечевица — со скворца), с массивным клювом, взрослые самцы красные или розовые, самки и молодые птицы буровато-серые.

Гнездятся на кустах или в скалах, в кладке 3-6 голубоватых с темными пятнами яиц. В России четыре вида, из которых в европейской части встречается только обыкновенная чечевица.


Обыкновенная чечевица
[670] — *Carpodacus erythrinus*
(Таблица 53)



Самец сверху буро-серый с ярко-красными головой, горлом и грудью, самки и молодые птицы зеленовато-серые, крылья и хвост темные, брюшко (а у дальневосточных птиц иногда и грудь) белое. Спина почти без пестрин.

Гнездится в кустарниках, по опушкам и высокогорьям по всей территории лесной и лесостепной зон, на Кавказе. Перелетный вид. Голос — тихий свист, похожий на фразу "Ты Витю видел?" и мягкое "чуи".

Сибирская чечевица [671]
— *Carpodacus roseus*
(Таблица 53)



Самец малиново-розовый с бурой спиной и белыми полосами на крыле, светлой головой; самки и молодые птицы красновато-серые. Надхвостье красное, брюшко белое.

Гнездится в горной тайге (чаще у края леса) от Алтая и долины Енисея до Сахалина. Зимой кочует в пойменных и лиственных лесах до Томска на западе и Приморья на юге. Встречается реже, чем обыкновенная чечевица. Голос — тихий свист.


Арчовая чечевица
[672] —
Carpodacus rhodochlamys
(Таблица 53)



Самец сиренево-розовый с буроватой спиной и свет-

лой бровью, самки и молодые птицы серые с пестринами на спине.

Гнездится в кустарниках по альпийским лугам в горах Центрального Алтая и Тувы, зимует в лесном поясе гор. Песня — протяжные свисты "чьиу-чифью", крик — резкое "чжэй".




Большая чечевица
[673] — *Carpodacus*
rubicilla
(Таблица 53)

Самец малиново-красный в белых точках, самка и молодые птицы серые.

Гнездится в горах Центрального и Восточного Кавказа, Алтая и Тувы на высотах 2000-3000 м над уровнем моря, зимует на Кавказе в зарослях облепихи не ниже 1000 м над уровнем моря, в Сибири — в пойменных лесах предгорий. Песня — громкие раскатистые свисты, крик — тихое "фьюин".

18.26.8. Род Урагусы — *Uragus*

Один азиатский вид.



Урагус [674] — *Uragus*
sibiricus
(Таблица 53)

Мелкая птица с очень длинным узким хвостом, черным с белыми полосками по бокам, и коротким

толстым клювом. Самцы розово-серые с темными пестринами и светлой головой, самки серо-бурые. На крыле две белые полосы.

Гнездится на юге Сибири и Дальнего Востока в пойменных лесах и кустарниках, в кладке 4-5 сине-зеленых с темными пятнами яиц. Зимой кочует до Урала на западе. Песня — набор трелей, крик — звонкое "пи-ю-инь".

18.26.9. Род Щуры — *Pinicola*

Один таежный вид.

Щур [675] — *Pinicola enucleator*
(Таблица 53)



Птица размером со скворца, плотного сложения, с толстым, коротким, чуть крючковатым клювом и сравнительно длинным вырезанным хвостом. У самцов голова, спина и грудь малиновые, брюшко серое, крылья и хвост темно-бурые, на плече узкие белые полосы. У самок и молодых птиц малиновый цвет заменен грязно-желтым. Кормится обычно на деревьях.

Гнездится на большей части таежной зоны в тайге и горных стланиках, в кладке 3-5 голубых с темными крапинками яиц. Зимой кочует стайками по всей стране, кроме Кавказа и Севера. Питается семенами хвойных деревьев и ягодами. Голос — мелодичные свисты "пьюю-лии".


18.26.10. Род Клесты — *Loxia*

Птицы немного крупнее воробья, с перекрещивающимся клювом и относительно коротким вырезанным хвостом. Самцы красные или красно-малиновые, самки зеленоватые, молодые птицы серые в пестринах.

Гнездятся высоко на деревьях в хвойных лесах, питаются семенами хвойных деревьев. Массовое гнездование связано со временем раскрытия шишек, когда семена становятся легко доступны, вот почему клесты часто гнездятся во второй половине зимы, несмотря на морозы. В кладке 3-5 голубоватых с темными крапинками яиц.

Клесты умеют ловко подвешиваться к шишкам вниз головой. В таком положении птица за считанные секунды извлекает из шишки семена, но только те, которые легко достать. Сброшенные клестами шишки долго сохраняются под снегом, и оставшиеся в них семена служат подкормкой белкам и другим животным. Песня — громкий щебет и свист, крик — звонкое "кле", все время слышное из летящей стайки.


Три вида.



Клест-еловик [676] —
Loxia curvirostra
(Таблица 53)

Крылья и хвост бурые, клюв не очень толстый.


Гнездится по большей части таежной зоны, а также на Кавказе, в основном (но не всегда) в темнохвойных лесах. Осенью и зимой кочует по всей стране, особенно широко в годы неурожая еловых и пихтовых семян.



Клест-сосновик [677] —
Loxia pytyopsittacus
(Таблица 53)

Очень похож на клеста-еловика, но клюв очень мощный, самец с рыжеватым оттенком.

Гнездится преимущественно в сосняках на севере Европейской части России и юге Западной Сибири, зимой кочует до Енисея на востоке. Голос ниже и громче, чем у еловика, с которым изредка образует смешанные стайки.



Белокрылый клест [678] —
Loxia leucoptera
(Таблица 53)

На крыле две белых полосы, у самки грудь в темных пестринах.

Гнездится в основном в лиственничной, реже еловой и кедровой тайге на большей части таежной зоны, кочует до лесостепных боров на юг; обычно не такими большими стаями, как клест-еловик. Большая часть птиц остается на зиму в северной тайге. Голос выше, чем у других клестов; как правило, крик повторяется 3-5 раз подряд. Характерны также полифонические свисты, похожие на свист снегиря, но громче и грубее.

18.26.11. Род Снегири — *Pyrrhula*.

Птицы размером с воробья, очень плотного сложения, голубовато-серые сверху с черными шапочкой, подбородком, крыльями и хвостом, белыми надхвостьем и полосой на крыле. У самцов бывает красная грудь или щеки. Молодые птицы без черной шапочки.

Гнездятся на деревьях в лесах, преимущественно хвойных, зимой широко кочуют. В кладке 4-6 голубых с красноватыми крапинками яиц. Кормясь ягодами, выедают из них семена, а мякоть плодов выбрасывает. Песня — скрипучие звуки, крик — мелодичный печальный свист "фьюю".

В России три вида.


Обыкновенный снегирь
[679] — *Pyrrhula*
pyrrhula
(Таблица 53)



Полоса на крыле чисто-белая; щеки и грудь у самцов красные (на Кавказе и большей части лесной зоны) или красно-розовые (у птиц из Магаданской обл., с Камчатки и Северных Курил); у самок и молодых птиц — буровато-серые.


Гнездится и зимует почти по всей лесной зоне, кроме юга Дальнего Востока. Летом снегирь обитает как в густых лесах, так и в редколесьях на краях гарей и вырубок, но держится очень скрытно и редко попадает на глаза. Зато зимой не заметить разноцветную стайку снегирей просто невозможно.

Уссурийский снегирь
[680] — *Pyrrhula*
griseiventris
(Таблица 53)



Полоса на крыле белая; у самцов щеки красные, грудь бледно-розовая (у птиц с Южных Курил серая); у самок и молодых птиц щеки светлые, грудь буровато-серая.

Гнездится и зимует на всем Дальнем Востоке.




Серый снегирь [681] —
Pyrrhula cineracea
(Таблица 53)

Полоса на крыле светло-серая, грудь и щеки у самцов серые, у самок буроватые.

Гнездится на юге Сибири и Дальнего Востока. Зимой кочует вплоть до Урала, изредка долетая до Подмосковья.

18.26.12. Род Дубоносы — *Coccothraustes*

Один вид.



Обыкновенный дубонос
[682] — *Coccothraustes*
coccothraustes
(Таблица 40)

Птица размером со скворца, коричневая с очень массивным голубовато-серым (зимой палевым) клювом. У самок мелкий поперечный рисунок на голове и боках. Крылья черные с широкими белыми полосами, вокруг глаз и основания клюва черная полоска, конец хвоста белый.

Гнездится по югу лесной зоны на деревьях в лиственных и смешанных лесах, в кладке 3-7 зеленоватых с темными пятнами и завитками яиц. Зимой кочует маленькими стайками почти повсюду, кроме севера страны, но держится в кронах деревьев и редко попадает на глаза. Песня — грубый треск, крик — тихое металлическое "цик".

18.26.13. Род Черноголовые дубоносы — *Eophona*


Размером со скворца, серые с массивным желтым клювом. Хвост и крылья черные, на сгибе крыла белая полоска.

Гнездятся в смешанных и широколиственных лесах, в кладке 3-6 голубых с темными пятнами яиц. С августа по

апрель кочуют большими стаями, держась в кронах деревьев. Такую стаю иногда удастся издали обнаружить по шелка- нью разгрызаемых орехов и резкому ореховому запаху.

В России два вида.


**Большой черноголовый
дубонос [683] —
Eophona personata
(Таблица 40)**



Крылья и шапочка на го- лове черные, щеки серые.

Обитает на юге Дальне- го Востока в смешанных лесах с примесью кедра, пихты, ели. Часть птиц зимует на юге Приморья. Довольно редок. Гнез- да устраивает на деревьях. В летнем питании преобладают насекомые и мелкие улитки, в другое время — семена деревь- ев. Песня — звонкие флейтовые свисты, крик — тихое "так".

**Малый черноголовый
дубонос [684] —
Eophona migratoria
(Таблица 40)**



У самцов концы крыль- ев белые, вершина клюва, голова и щеки черные, у са- мок крылья и голова серые. Бока рыжеватые, в полете видны светлое надхвостье и узкая белая полоса по заднему краю крыла.

Обычен на юге Дальнего Востока. Гнездится по опушкам пойменных лесов, в разреженных дубняках, культурных ланд- шафтах. Гнезда строит в основном на лиственных породах (чаще на вязах). В кладке до 6 голубовато-зеленых с темны- ми пятнами яиц. Перелетный вид. Летом основной корм — насекомые. Кормясь семенами деревьев, нередко висит на ветке вниз спиной. Песня — свист, крик — громкое "тэк".

18.27. Семейство Ткачиковые — *Polceidae*

Из наших птиц к этому семейству относятся воробьи и похожие на них птицы, населяющие открытые ландшафты и

населенные пункты. Клюв у них довольно толстый, приспособленный к питанию семенами, но птенцов они выкармливают насекомыми. Кормятся в основном на земле, реже на кустах и деревьях.


Гнездятся в скалах, дуплах, нишах стен, различных укрытиях, норах; часто колониями. В России четыре рода, из которых в европейской части обычны только полевой и домовый воробьи [685, 686].

18.27.1. Род Воробьи — *Passer*

Самцы сверху буроватые с темными пестринами, снизу серые с черным горлом, на крыле узкая белая полоска. Самки окрашены так же или более однотонно. По земле передвигаются прыжками.

В кладке 4-8 белых или сероватых с темными пятнами яиц. Часто гнездятся в довольно неожиданных местах, например, в стенках гнезд орлов, грифов, аистов и других крупных птиц. Обычно же гнезда расположены в нишах стен, скворечниках, под крышами. Голос — всем известное чирикание.

В России четыре вида.




Полевой воробей
[685] — *Passer*
montanus
(Таблица 54)

Верх головы каштановый, спина сероватая, щека серая или белая с черным пятном в виде запятой.

Гнездится и зимует почти по всей стране по окраинам городов, в деревнях и поселках, на юге — в лесах и кустарниках. Голос сравнительно высокий.

Полевой воробей ловит массу вредных насекомых, но осенью стаи воробьев могут наносить довольно значительный ущерб садам и виноградникам. В 50-х годах в Китае была проведена массовая кампания по истреблению полевого воробья. На следующий же год урожай был практически уничтожен насекомыми.

Домовый воробей
[686] — *Passer*
domesticus
 (Таблица 54)




У самца верх головы и щеки серые, зашеек коричневый; самка и молодые птицы однотонные, буровато-серые с более темным верхом головы, размытой полосой через глаз, темными в пестринах спиной и крыльями.

Гнездится и зимует на большей части территории страны в населенных пунктах преимущественно городского типа, в норах других птиц на обрывистых склонах; на Кавказе — в скалистых предгорьях. Вслед за цивилизацией постепенно расселяется на северо-восток. По-видимому, еще несколько столетий назад встречался только на Кавказе. Подобно городской ласточке и галке, домовый воробей — преимущественно горная птица, для которой большой город представляет собой нечто вроде огромного нагромождения скал.

Продвижение на север непросто дается воробью. В Сибири он жестоко страдает от морозов, когда ночует в щелях стен и под крышами. В конце зимы там встречается много бесхвостых птичек — результат обморожения. Но два-три выводка, которые он успевает выкормить за лето, восполняют потери.


В районах, пограничных с Азербайджаном, может быть встречен индийский воробей — *Passer indicus*, гнездящийся в зарубежной Азии и Африке. Он очень похож на домового воробья, но чуть светлее, у самца щеки белые. Перелетный вид, гнездится колониями в норах или шарообразных гнездах на деревьях.

Черногрудый воробей
[687] — *Passer*
hispaniolensis
 (Таблица 54)



У самца верх головы каштановый, щеки и брюшко белые, грудь черная. Самки похожи на самок домового воробья, но на боках размытые темные пестрины.

Гнездится и частично зимует в равнинном Дагестане.



Рыжий воробей [688] —
Passer rutilans
(Таблица 54)

Верх головы у самца коричнево-рыжий, щеки светло-серые без черного пятна, самка и молодые птицы сверху рыжеватые с белой полоской на крыле и светлой бровью.


Гнездится на юге Сахалина, островах Монерон и Южных Курильских. Перелетный вид.

18.27.2. Род Каменные воробьи — *Petronia*

Похожи на самку домового воробья [686], но окраска более светлая, по краю широкого хвоста проходит узкая белая полоса. Очень подвижны, быстро бегают среди камней.

Гнездятся в щелях скал и между камнями в сухих каменистых степях, в кладке 4-7 зеленовато-белых с темными пятнами яиц.

В России два вида.



Каменный воробей
[689] — *Petronia*
petronia
(Таблица 54)

На спине и боках темные пестрины, над глазом белая и черная полоски, на груди небольшое желтое (реже белое) пятно.

Гнездится и зимует в Предкавказье, Нижнем Поволжье, на Алтае, в Туве и Забайкалье. Голос — звонкое "ги-ю-ип" и быстрое чирикание.

В Дагестан залетает **короткопалый воробей — *Petronia brachydactyla* [690]**, (Таблица 54), однотонной буровато-серой окраски, белая полоса на хвосте более заметная, голос — протяжное чирикание.


Гнездится в зарубежной Азии.

18.27.3. Род Снежные воробьи — *Montifringilla*

Буроватые с черно-белыми крыльями и хвостом, черным горлом. Населяют каменистые ландшафты. Встречаются обычно стайками.

В России два вида.


Снежный воробей
[691] — *Montifringilla*
nivalis
(Таблица 54)



Серовато-бурая сверху и белая снизу птица с черно-белыми крыльями, в полете кажется белой с черными пятнами. Горло у взрослых самцов черное. От пуночки [719] отличается серой головой и довольно длинным хвостом, белым с черной продольной полосой. Клюв летом черный, зимой желтый.

Гнездится в высокогорьях Центрального и Восточного Кавказа и Алтая выше 1700 м над уровнем моря в норах и щелях скал, иногда в зоне вечных снегов, зимой спускается до 600 м над уровнем моря и часто появляется на окраинах поселков. Песня — резкие гнусавые звуки, крик — резкое чириканье.

Монгольский воробей
[692] — *Montifringilla*
davidiana
(Таблица 54)



Светло-песочный, крылья и хвост черные с белыми полосками, бока головы и брюшко белые, горло и основание клюва черные.

Гнездится в Алтае, Туве и в Южном Забайкалье. Гнезда в норах грызунов в каменистых степях, в кладке 5-6 белых яиц. Зимой кочует в местах гнездования. Голос — тихое щебетание.

18.28. Семейство Овсянковые — *Emberizidae*

Мелкие птицы, населяющие в основном открытые места, кустарники и камыши, реже леса. Клюв короткий, утолщенный и сжатый с боков.

Питаются растительной пищей и насекомыми. Кормятся в основном на земле, причем чаще ходят или бегают, а не прыгают, в отличие от воробьев. Самцы поют, сидя на верхней ветке куста, высокой травинке, скале или проводах.


В России семь родов.

18.28.1. Род Овсянки — *Emberiza*

В России встречается 25 видов этого рода, распространенных от тундр до пустынь. Самцы отличаются характерной для каждого вида окраской головы, самки и молодые птицы трудноразличимы. Просянка [717] и самки некоторых других видов похожи на жаворонков, но отличаются от них более толстым и коротким клювом, короткими ногами и сравнительно ровным, а не ныряющим полетом.

Гнезда из сухих стеблей и корешков трав, конского волоса делают на земле, реже на кустах. В кладке 4-6 белых, зеленоватых, сероватых или розовых с бурыми пятнами яиц.

В средней полосе Европейской части России встречается в основном обыкновенная овсянка [693], местами камышовая овсянка и дубровник [711, 709], а другие виды очень редки.



**Обыкновенная овсянка
[693] — *Emberiza
citrinella*
(Таблица 55)**

У самца голова, грудь и брюшко желтые с коричневыми полосками, спина и пятна по бокам груди коричневые, по бокам хвоста белые полосы. Самки желтовато-бурые с каштановым надхвостьем.

Гнездится на полянах, опушках, вырубках по лесной и лесостепной зонам на восток до водораздела Енисея и Лены, на Западном Кавказе. Зимой кочует в средней полосе и на юге



Таблица 1. 1 — краснозобая гагара (1а — летом, 1б — зимой); 2 — чернозобая гагара (2а — летом, 2б — зимой); 3 — голова белошейной гагары (3а — летом, 3б — зимой); 4 — белоклювая гагара (4а — летом, 4б — зимой, 4с — в полете); 5 — голова полярной гагары (5а — летом, 5б — зимой); 7 — серошекая поганка в полете; 30 — большой баклан (30а — взрослая птица, 30б — молодой, 30с — голова); 31 — голова уссурийского баклана; 32 — хохлатый баклан; 33 — берингов баклан (33а — взрослая птица, 33б — голова, 33с — в полете); 34 — голова краснолицего баклана; 36 — малый баклан.




Таблица 2. 11 — белоспинный альбатрос (11а — взрослая птица, 11б — молодой); 12 — темноспинный альбатрос (12а — сверху, 12б — снизу); 13 — черноногий альбатрос; 14 — глупыш (14а — светлая форма, 14в — темная форма, 14с и 14д то же, в полете); 21 — пестрый тайфунник (21а — сверху, 21б — снизу); 22 — бонинский тайфунник (22а — сверху, 22б — снизу); 23 — тайфунник Соландра (23а — сверху, 23б — снизу).




Таблица 3. 11 — клюв альбатроса; 14 — клюв глупыша; 15 — обыкновенный буревестник (15а — сверху, 15b — снизу); 16 — тонкоклювый буревестник (16а — сверху, 16b — снизу, 16с — клюв); 17 — серый буревестник (17а — сверху, 17b — снизу); 18 — буллеров буревестник (18а — сверху, 18b — снизу); 19 — бледноногий буревестник; 20 — пестролицый буревестник (20а — сверху, 20b — снизу, 20с — сидящая птица); 23 — клюв тайфунника Соландра; 24 — сизая качурка (24а — птица на воде; 24b — в полете, 24с — ее клюв); 25 — северная качурка (25а — сидящая птица, 25b — в полете); 26 — малая качурка (26а — сидящая птица, 26b — в полете).




Таблица 4. 28 — кудрявый пеликан (28а — сидящая птица, 28б — в полете); 29 — розовый пеликан (29а — птица на воде, 29б — в полете); 37 — северная олуша (37а — сидящая птица; 37б — в полете); 39 — фрегат ариэль (39а — сидящая птица, 39б — в полете).




Таблица 5. 43 — серая цапля; 44 — рыжая цапля; 45 — большая белая цапля; 47 — малая белая цапля; 49 — египетская цапля; 50 — желтая цапля; 52 — обыкновенная кваква (52a — взрослая птица, 52b — молодая); 53 — зеленая кваква; 55 — выпь; 56 — волчок (56a — самец, 56b — самка); 57 — амурский волчок (57a — самец, 57b — самка); 58 — китайский волчок; 60 — колпица; 61 — каравайка; 62 — красноногий ибис.




Таблица 6. 66 — лебедь-кликун (66а — взрослый, 66б — молодой); 67 — малый лебедь; 68 — голова американского лебедя; 69 — лебедь-шипун; 70 — серый гусь; 71 — гуменник; 72 — белолобый гусь; 73 — пискулька; 74 — сухонос; 75 — горный гусь; 76 — белый гусь (76а — белая форма, 76б — голова голубой формы); 78 — белошей; 79 — черная казарка; 81 — белошекая казарка; 82 — канадская казарка; 83 — краснозобая казарка.



Таблица 7. 84 — огарь; 85 — пеганка; 86 — хохлатая пеганка (86a — самец, 86b — самка); 99 — красноносый нырок (99a — самец, 99b — самка); 100 — красноголовый нырок (100a — самец, 100b — самка); 102 — Бэров нырок; 103 — хохлатая чернеть (103a — самец, 103b — самка); 104 — морская чернеть (104a — самец, 104b — самка); 111 — турпан (111a — самец, 111b — самка); 112 — голова горбоносого турпана (самец); 113 — синьга (113a — самец, 113b — самка); 114 — голова американской синьги (114a — самец, 114b — самка); 115 — пестроносый турпан (самец); 117 — морянка (117a — самец летом, 117b — самец зимой, 117c — самка); 118 — обыкновенный гоголь (118a — самец, 118b — самка); 119 — исландский гоголь (самец); 120 — малый гоголь (самец).



Таблица 8. 87 — кряква (87a — самец, 87b — самка); 88 — черная кряква; 89 — серая утка; 90 — связь (90a — самец, 90b — самка); 92 — шилохвость (92a — самец, 92b — самка); 93 касатка (93a — самец, 93b — самка); 94 — чирок-клоктун (94a — самец, 94b — самка); 95 — чирок-свистунок (95a — самец, 95b — самка); 96 — чирок-трескунок (96a — самец, 96b — самка); 97 — мраморный чирок; 98 — широконоска (98a — самец, 98b — самка); 101 — белоглазый нырок; 121 — мандаринка (121a — самец, 121b — самка).




Таблица 9. 6 — чомга (6а — летом, 6б — голова чомги зимой); 7 — серошекая поганка (7а — взрослая, 7б — молодая); 8 — красношекая поганка (8а — летом, 8б — зимой); 9 — черношейная поганка (9а — летом, 9б — зимой); 10 — малая поганка; 107 — обыкновенная гага (107а — самец, 107б — самка); 108 — гага-гребенушка (108а — самец, 108б — голова самки); 109 — очковая гага (109а — самец, 109б — самка); 110 — сибирская гага (110а — самец, 110б — самка); 116 — каменушка (116а — самец, 116б — голова самки); 122 — длинноносый крохаль (122а — самец, 122б — самка); 123 — чешуйчатый крохаль (самец); 124 — большой крохаль (124а — самец, 124б — самка); 125 — луток (125а — самец, 125б — самка); 126 — савка (126а — самец, 126б — самка).




Таблица 10. 128 — беркут (128а — взрослый, 128b — молодой); 129 — могильник; 130 — степной орел; 131 — большой подорлик; 132 — малый подорлик; 133 — хохлатый орел; 142 — орлан-белохвост (142а — взрослая птица, 142b — молодой); 143 — белоплечий орлан; 144 — орлан-долгохвост; 160 — бородач; 161 — стервятник; 162 — черный гриф; 163 — белоголовый сип.




Таблица 11. 127 — скопа; 133 — орел-карлик (133а — светлая форма, 133б — темная форма); 135 — канюк (135а — светлая форма, 135б — темная форма); 136 — курганник; 137 — мохноногий канюк; 138 — зимняк; 139 — ястребиный сарыч; 140 — осоед (140а — светлая форма, 140б — темная форма); 141 — хохлатый осоед; 146 — черный коршун; 147 — красный коршун; 153 — змеяед.




Таблица 12. 148 — тетеревятник (148а — средневропейская форма, 148b — северо-восточная форма, 148с — молодой); 149 — тювик; 150 — перепелятник (150а — самец, 150b — самка); 151 — малый перепелятник; 152 — голова китайского перепелятника; 154 — полевой лунь (154а — самец, 154b — самка); 155 — луговой лунь (155а — самец, 155b — самка); 156 — степной лунь (156а — самец, 156b — самка); 157 — пегий лунь (157а — самец, 157b — самка); 158 — болотный лунь (158а — самец, 158b — самка, 158с — голова молодой птицы); 159 — голова самца азиатского луня.




Таблица 13. Хищные птицы в полете: 128 — беркут (128а — взрослый, 128b — молодой); 129 — могильник; 130 — степной орел; 131 — большой подорлик; 132 — малый подорлик; 133 — орел-карлик (133а — светлая форма, 133b — темная форма); 142 — орлан-белохвост (142а — взрослый, 142b — молодой); 143 — белоплечий орлан; 144 — орлан-долгохвост.




Таблица 14. Хищные птицы в полете: 127 — скопа; 134 — хохлатый орел; 135 — канюк (135a — светлая форма, 135b — темная форма); 136 — курганник; 137 — мохноногий канюк; 138 — зимняк; 139 — ястребиный сарыч; 140 — осоед; 141 — хохлатый осоед; 146 — черный коршун; 147 — красный коршун; 153 — змеяед (153a — светлая форма, 153b — темная форма).




Таблица 15. Хищные птицы в полете: 148 — тетеревятник; 154 — полевой лунь (154а — самец, 154б — самка); 155 — луговой лунь (155а — самец, 155б — самка); 156 — степной лунь (156а — самец, 156б — самка); 157 — пегий лунь (157а — самец, 157б — самка); 158 — болотный лунь (158а — самец, 158б — самка); 159 — азиатский лунь (159а — самец, 159б — самка); 160 — бородач; 161 — стервятник; 162 — черный гриф; 163 — белоголовый сип; 167 — сапсан.




Таблица 16. 165 — кречет (165a — темная форма, 165b — светлая форма); 166 — балобан (166a — европейско-сибирская форма, 166b — алтайская форма); 167 — сапсан (167a — взрослый, 167b — молодой); 168 — чеглок; 169 — дербник (169a — самец, 169b — самка); 170 — кобчик (170a — самец, 170b — самка); 171 — амурский кобчик (самка); 172 — пустельга (172a — самец, 172b — самка); 173 — степная пустельга (самец).



Таблица 17. 174 — рябчик; 175 — азиатская дикуша; 180 — белая куропатка (180a — самец летом, 180b — зимой); 181 — тундрная куропатка (181a — самец летом, 181b — самка летом, 181c — голова самца зимой); 184 — серая куропатка (184a — самец, 184b — самка, 184c — в полете); 185 — бородастая куропатка; 186 — кеклик.




Таблица 18. 176 — тетерев (176a — самец, 176b — самка); 177 кавказский тетерев (самец); 178 — глухарь (178a — самец, 178b — самка); 179 — каменный глухарь (самец); 187 — кавказский улар; 188 — алтайский улар; 189 — фазан (189a — самец кавказской формы, 189b — самец дальневосточной формы, 189c — самка).



Таблица 19. 40 — белый аист; 41 — голова дальневосточного аиста (41a — взрослого, 41b — молодого); 42 — черный аист; 65 — розовый фламинго; 190 — серый журавль; 191 — канадский журавль; 192 — черный журавль; 193 — даурский журавль; 194 — японский журавль; 195 — стерх; 196 — красавка; 211 — дрофа; 212 — стрепет (212a — самец, 212b — самка); 213 — джек.



Таблица 20. 197 — коростель; 198 — водяной пастушок; 199 — обыкновенный погоныш; 200 — малый погоныш (200a — самец, 200b — самка); 201 — погоныш-крошка; 202 — красноногий погоныш; 203 — большой погоныш; 204 — белокрылый погоныш.



Таблица 21. 182 — перепел; 183 — голова немого перепела; 205 — камышница; 206 — рогатая камышница; 207 — белогрудый пастушок; 208 — султанка; 209 — лысуха; 210 — пятнистая трехперстка.




Таблица 22. 214 — авдотка; 215 — чибис; 217 — кречетка; 218 — белохвостая пигалица; 219 — украшенный чибис; 235 — шилоклювка; 236 — ходулочник; 237 — кулик-сорока; 279 — большой веретенник (279a — летом, 279b — зимой); 280 — малый веретенник; 281 — большой кроншнеп; 283 — средний кроншнеп; 284 — тонкоклювый кроншнеп; 285 — кроншнеп-малютка; 301 — бегунок.



Таблица 23. 220 — золотистая ржанка (220а — взрослая, 220b — молодая); 221 — бурокрылая ржанка; 223 — тулес (223а — взрослый, 223b — молодой); 224 — галстучник; 227 — малый зуек; 229 — морской зуек; 230 — монгольский зуек; 231 — большесклювый зуек; 232 — каспийский зуек; 234 — хрустан (234а — взрослый, 234b — молодой); 238 — круглоносый плавунчик (238а — голова самца летом, 238b — голова самца зимой, 238с — самка летом); 239 — плосконосый плавунчик (239а — самец, 239b — самка); 240 — камнешарка (240а — взрослая, 240b — молодая); • — черная камнешарка; 298 — степная тиркушка; 299 — луговая тиркушка; 300 — восточная тиркушка.




Таблица 24. 241 — чернозобик (241a — летом, 241b — зимой); 242 — краснозобик (242a — летом, 242b — зимой); 243 — кулик-воробей (243a — летом, 243b — зимой); 244 — длиннопалый песочник; 246 — белохвостый песочник; 247 — перепончатопалый песочник; 249 — песочник-красношейка; 250 — кулик-лопатень; 251 — дутыш; 252 — острохвостый песочник; 253 — Бэрдов песочник; 254 — песчанка (254a — летом, 254b — зимой); 255 — морской песочник; 257 — исландский песочник (257a — летом, 257b — зимой); 258 — большой песочник; 260 — желтозобик; 261 — грязовик; 262 — турухтан (262a — самец, 262b — самка).




Таблица 25. 264 — черныш; 265 — фифи; 266 — поручейник; 267 — травник; 268 — шеголь (268a — летом, 268b — зимой); 269 — большой улит; 270 — охотский улит; 272 — перевозчик; 274 — мородунка; 275 — сибирский пепельный улит; 277 — американский бекасовидный веретенник; 278 — азиатский бекасовидный веретенник; 288 — бекас; 289 — дупель; 292 — азиатский бекас; 293 — горный дупель; 294 — гаршнеп; 295 — вальдшнеп.



Таблица 26. 216 — серый чибис; • — шпорцевый чибис; 225 — американский галстучник; •• — большой плавунчик; 245 — песочник-крошка; 248 — малый песочник; 256 — берингский песочник; 259 — бонапартов песочник; 271 — желтоногий улит; ••• — пегий улит; 273 — пятнистый перевозчик; 287 — таитянский кроншнеп; 291 — японский бекас; 296 — цветной бекас; 297 — фазанохвостая якана.



Таблица 27. 302 — длиннохвостый поморник; 303 — короткохвостый поморник (303a — светлая форма, 303b — темная форма); 304 — средний поморник (светлая форма); 305 — большой поморник; 306 — голова антарктического поморника; 309 — серебристая чайка (309a — взрослая, 309b — молодая); 310 — южная серебристая чайка; 311 — северная серебристая чайка; 312 — клуша; 313 — морская чайка; 314 — тихоокеанская чайка; 315 — чернохвостая чайка; 317 — бургомистр; 319 — черноголовый хохотун.




Таблица 28. 307 — белая чайка; 308 — сизая чайка; 320 — озерная чайка (320a — взрослая птица летом, 320b — голова молодой птицы летом, 320c — птица в зимнем наряде); 322 — черноголовая чайка (322a — взрослая, 322b — молодая); 323 — реликтовая чайка (323a — взрослая птица летом, 323b — голова зимой); 325 — голова бонапартовой чайки; 326 — морской голубок (326a — взрослый, 326b — молодой); 327 — малая чайка (327a — взрослая, 327b — молодая); 328 — вилохвостая чайка (328a — взрослая, 328b — молодая); 329 — розовая чайка (329a — взрослая, 329b — молодая); 330 — обыкновенная моевка (330a — взрослая, 330b — молодая); 331 — красноногая моевка.



Таблица 29. 332 — речная крачка (332a — взрослая, 332b — молодая, 332c — ныряющая за рыбой); 333 — полярная крачка (333a — взрослая, 333b — молодая); 334 — малая крачка (334a — взрослая, 334b — молодая); 335 — камчатская крачка; 336 — пестроносая крачка (336 — взрослая, 336b — молодая); 337 — чайконосная крачка (337a — взрослая, 337b — молодая); 338 — чеграва (338a — взрослая, 338b — молодая); 339 — черная крачка (339a — взрослая, 339b — молодая); 340 — белокрылая крачка; 341 — белошекая крачка.



Таблица 30. 342 — тонкоклювая кайра; 343 — толстоклювая кайра; 344 — гагарка; 345 — люрик; 346 — обыкновенный чистик (346а зимой, 346b — летом); 348 — очковый чистик; 349 — длинноклювый пыжик; 350 — короткоклювый пыжик; 351 — обыкновенный старик; 354 — большая конюга; 355 — малая конюга; 356 — конюга-крошка; 357 — белобрюшка; 358 — тупик-носорог; 359 — тупик; 360 — голова ипатки; 361 — топорок.




Таблица 31. 362 — сизый голубь (362a — сидящая птица, 362b — в полете); 363 — скалистый голубь (363a — сидящая птица, 363b — в полете); 364 — клинтух (364a — сидящая птица, 364b — в полете); 365 — вахирь; 366 — зеленый голубь; 367 — обыкновенная горлица; 368 — большая горлица; 369 — кольчатая горлица; • — малая горлица; 371 — сиджа (371a — самец, 371b — самка); 372 — чернобрюхий рябок; 373 — белобрюхий рябок.




Таблица 32. 379 — филин; 380 — рыбный филин; 381 — белая сова (381a — самец, 381b — самка); 382 — бородатая неясыть; 383 — длиннохвостая неясыть; 384 — серая неясыть (384a — серая форма, 384b — рыжая форма).




Таблица 33. 385 — ушастая сова; 386 — болотная сова; 387 — ястребиная сова; 388 — сплюшка; 389 — уссурийская совка; 390 — ошейниковая совка; 391 — северная иглоногая сова; 392 — мохноногий сыч; 393 — домовый сыч; 394 — воробыный сычик; 395 — обыкновенная сипуха;



Таблица 34. 374 — обыкновенная кукушка (374a — серая форма, 374b — рыжая форма); 376 — индийская кукушка; 377 — малая кукушка; 378 — ширококрылая кукушка; 396 — обыкновенный козодой; 397 — большой козодой; • — буланный козодой; 403 — обыкновенный зимородок; 405 — малый пегий зимородок; 406 — ошейниковый зимородок; 408 — золотистая шурка (408a — взрослая, 408b — молодая); 409 — зеленая шурка; 410 — сизоворонка; 411 — ширококорот; 412 — удог.




Таблица 35. 413 — желна; 414 — седой дятел (414a — самец, 414b — голова самки); 415 — зеленый дятел; 416 — трехпалый дятел (416a — самец, 416b — голова самки); 417 — большой пестрый дятел (417a — самец, 417b — голова самки, 417c — голова молодой птицы); 418 — голова сирийского дятла; 419 — средний пестрый дятел; 420 — белоспинный дятел; 421 — рыжебрюхий дятел (421a — самец, 421b — голова самки); 422 — малый пестрый дятел (422a — самец, 422b — голова самки); 423 — большой острокрылый дятел; 424 — малый острокрылый дятел; 425 — вертишейка.




Таблица 36. 398 — черный стриж (398а — сидящая птица, 398б — в полете); 399 — белопоясный стриж; 400 — белобрюхий стриж (400а — сидящая птица, 400б — в полете); 401 — колючехвостый стриж; 426 — деревенская ласточка (426а — сидящая птица, 426б — в полете); 427 — рыжепоясничная ласточка; 429 — городская ласточка (429а — сидящая птица, 429б — в полете); 432 — береговушка (432а — сидящая птица, 432б — в полете); 433 — скалистая ласточка.



Таблица 37. 434 — полевой жаворонок; 436 — юла; 437 — серый жаворонок; 438 — малый жаворонок; • — двупятнистый жаворонок; 439 — хохлатый жаворонок; 440 — степной жаворонок; 441 — белокрылый жаворонок; 442 — монгольский жаворонок; 443 — черный жаворонок (443a — самец летом, 443b — самец зимой, 443c — самка); 444 — рогатый жаворонок (444a — самец, 444b — самка); •• — пустынный жаворонок; 719 — пуночка (719a — летом, 719b — зимой); ••• — солончаковый жаворонок.




Таблица 38. 445 — лесной конек; 446 — луговой конек; 447 — пятнистый конек; 448 — сибирский конек; 450 — краснозобый конек (450a — самец, 450b — самка); 451 — степной конек; 452 — полевой конек; 453 — горный конек; 455 — белая трясогузка (самцы: 455a — европейская форма, 455b — южная форма, 455c — камчатская форма; 455d — самка); 457 — желтая трясогузка (457a — самец сероголовой формы, 457b — голова самца черноголовой формы, 457c — самка); 458 — желтоголовая трясогузка (458a — самец, 458b — самка); 459 — желтолобая трясогузка (самец); 460 — горная трясогузка (460a — самец, 460b — самка); 461 — древесная трясогузка.




Таблица 39. 462 — серый личинкост; 463 — короткопалый буюльбуюль; 464 — серый сорокопут; 465 — клинохвостый сорокопут; 466 — чернолобый сорокопут; 467 — обыкновенный жулан (467a — самец, 467b — самка); 468 — сибирский жулан; 469 — буланный сорокопут; 470 — японский сорокопут; 471 — тигровый сорокопут; 472 — красноголовый сорокопут; 473 — обыкновенный свиристель; 474 — японский свиристель.



Таблица 40. 475 — обыкновенная иволга (475a — самец, 475b — самка); 476 — китайская иволга; 477 — ржавчатый трупиял (весной); 478 — обыкновенный скворец (478a — осенью, 478b — весной); 479 — розовый скворец (479a — взрослый, 479b — молодой); 480 — серый скворец; 481 — малый скворец (481a — самец, 481b — самка); 482 — японский скворец; 483 — китайский скворец; 484 — майна; 485 — черный дронго; 486 — индийский дронго; • — монгольская сойка; 682 — обыкновенный дубонос; 683 — большой черноголовый дубонос; 684 — малый черноголовый дубонос (684a — самец, 684b — самка).




Таблица 41. 487 — ворон (487a — сидящая птица, 487b — в полете); 488 — серая ворона; 489 — черная ворона (489a — сидящая птица, 489b — в полете); 490 — голова большеклювой вороны; 491 — грач (491a — взрослый, 491b — голова молодой птицы, 491c — в полете); 492 — обыкновенная галка (492a — сидящая птица, 492b — в полете); 493 — даурская галка (493a — взрослая, 493b — молодая); 494 — клушица; 495 — альпийская галка; 496 — кедровка; 497 — кукушка; 498 — сойка (498a — сибирская форма, 498b — европейская форма, 498c — голова птицы кавказской формы); 499 — сорока; 500 — голубая сорока.




Таблица 42. 504 — лесная завирушка; 505 — японская завирушка; 506 — черногорлая завирушка; 507 — сибирская завирушка; 508 — бледная завирушка; 509 — альпийская завирушка; 510 — гималайская завирушка; 522 — золотистый дрозд; 524 — белозобый дрозд (524a — самец, 524b — самка); 525 — черный дрозд (525a — самец, 525b — самка); 532 — белогорлый дрозд (532a — самец, 532b — самка); 533 — пестрый каменный дрозд (533a — самец, 533b — самка); 534 — синий каменный дрозд (534a — самец кавказской формы; 534b — самец дальневосточной формы, 534c — самка).




Таблица 43. 511 — рябинник; 512 — деряба; 513 — белобровик; 514 — певчий дрозд; 515 — рыжий дрозд; 516 — бурый дрозд (516a — самец, 516b — самка); 517 — чернозобый дрозд (517a — самец, 517b — самка); 518 — краснозобый дрозд; 519 — сизый дрозд; 521 — бледный дрозд (521a — самец, 521b — самка); 523 — сибирский дрозд (523a — самец, 523b — самка); 526 — белобрюхий дрозд; 527 — малый дрозд; 530 — пестрый дрозд.




Таблица 44. 402 — охристый колибри (402а — самец, 402б — самка); 535 — обыкновенная каменка (535а — самец, 535б — самка); 536 — каменка-плетанка (536а — самец степной формы, 536б — самец кавказской формы, 536с — самка); 537 — чернопегая каменка (537а — самец, 537б — самка); 538 — каменка-плясунья; 539 — пустынная каменка (539а — самец, 539б — самка); • — златогузая каменка; 540 — луговой чекан; 541 — черноголовый чекан (541а — самец, 541б — самка); 543 — черный чекан (543а — самец, 543б — самка).




Таблица 45. 544 — обыкновенная горихвостка (544a — самец европейско-сибирской формы, 544b — самец кавказской формы, 544c — самка); 545 — горихвостка-чернушка (самцы, варианты окраски); 546 — сибирская горихвостка (546a — самец, 546b — самка); 547 — краснобрюхая горихвостка (547a — самец, 547b — самка); 548 — красноспинная горихвостка (548a — самец, 548b — самка); 549 — зарянка (549a — взрослая птица, 549b — голова молодой птицы); 554 — японская зарянка; 555 — синехвостка (555a — самец, 555b — самка); 556 — синий соловей (556a — самец, 556b — самка).




Таблица 46. 550 — обыкновенный соловей; 551 — южный соловей; 552 — соловей-красношейка (552a — самец, 552b — самка); 553 — соловей-свистун; 557 — варакушка (557a, 557b, 557c — самцы, варианты окраски, 557d — самка); 558 — тугайный соловей; 563 — садовая славка; 564 — серая славка; 565 — славка-завирушка; 566 — славка-черноголовка (566a — самец, 566b — самка); 567 — пустынная славка; • — рыжешапочная древесница.




Таблица 47. 570 — пеночка-весничка; 571 — пеночка-теньковка; 573 — пеночка-трещотка; 574 — пеночка-таловка; 575 — зеленая пеночка; 577 — пеночка-зарничка; 578 — корольковая пеночка; 579 — светлоголовая пеночка; 580 — толстоклювая пеночка; 581 — бурая пеночка; 582 — индийская пеночка; 583 — бледноногая пеночка; 585 — обыкновенная пересмешка; 586 — северная бормотушка; 588 — бледная пересмешка; 608 — обыкновенная широкохвостка; 609 — короткокрылая широкохвостка; 610 — японская камышевка; 611 — короткохвостка; 628 — буробокая белоглазка; 629 — японская белоглазка.




Таблица 48. 589 — дроздовидная камышевка; 590 — тростниковая камышевка; 591 — болотная камышевка; 592 — садовая камышевка; 593 — индийская камышевка; 594 — чернобровая камышевка; 595 — камышевка-барсучок; 596 — вертялая камышевка; 597 — тонкоклювая камышевка; 598 — толстоклювая камышевка; 599 — обыкновенный сверчок; 600 — пятнистый сверчок; 601 — певчий сверчок; 602 — охотский сверчок; 603 — речной сверчок; 604 — соловьиный сверчок; 605 — таежный сверчок; 606 — малая пестрогрудка.



Таблица 49. 615 — серая мухоловка; 616 — сибирская мухоловка; 617 — пестрогрудая мухоловка; 618 — ширококлювая мухоловка; 619 — мухоловка-пеструшка (619a — самец, 619b — самка); 620 — мухоловка-белошейка (самец); 621 — таежная мухоловка (621a — самец, 621b — самка); 622 — желтоспинная мухоловка (622a — самец, 622b — самка); 623 — японская мухоловка (самец); 624 — малая мухоловка (624a — самец, 624b — самка); 625 — синяя мухоловка (625a — самец, 625b — самка); 626 — райская мухоловка (626a — самец, 626b — самка); 627 — черная райская мухоловка (самец).




Таблица 50. 501 — обыкновенная оляпка (501a — европейская форма, 501b — южносибирская форма, 501c — голова молодой птицы); 502 — бурая оляпка (502a — взрослая птица, 502b — молодая); 503 — крапивник; 634 — большая синица; 635 — малая синица; 636 — лазоревка; 637 — белая лазоревка; 638 — москковка; 639 — тиссовая синица; 640 — пухляк; 641 — черноголовая гаичка; 642 — сероголовая гаичка; 643 — хохлатая синица.




Таблица 51. 559 — ополовник (559a — северная форма, 559b — южная форма); 560 — усатая синица (560a — самец, 560b — самка); 562 — бурая сutora; 612 — желтоголовый королек; 613 — красноголовый королек; 633 — ремез (633a — каспийская форма, 633b — европейская форма, 633c — сибирская форма); 644 — обыкновенный поползень (644a — северная форма, 644b — кавказская форма); 645 — черноголовый поползень; • — скалистый поползень; 647 — обыкновенная пищуха (647a — сидящая птица, 647b — схема движения по стволу дерева); 648 — короткопалая пищуха; 649 — краснокрылый стенолаз (649a — летом, 649b — зимой).




Таблица 52. 650 — яблник (650a — самец, 650b — самка); 651 — юрок (651a — самец, 651b — самка); 652 — шегол (652a — взрослый самец, 652b — молодой); 653 — седоголовый шегол; 654 — обыкновенная зеленушка (654a — самец, 654b — самка); 655 — китайская зеленушка; 656 — чиж (656a — самец, 656b — самка); 657 — обыкновенная чечетка (657a — самец, 657b — самка); 658 — пепельная чечетка; 659 — горная чечетка; 660 — коноплянка (660a — самец, 660b — самка); 661 — канареечный выюрок; 662 — королевский выюрок (662a — взрослый самец, 662b — молодая птица).




Таблица 53. 670 — обыкновенная чечевица (670a — самец, 670b — самка); 671 — сибирская чечевица (671a — самец, 671b — самка); 672 — арчевая чечевица (672a — самец, 672b — самка); 673 — большая чечевица (673a — самец, 673b — самка); 674 — урагус (674a — самец, 674b — самка); 675 — шур (675a — самец, 675b — самка); 676 — клест-еловик (676a — самка, 676b — самец); 677 — клест-сосновик (самец); 678 — белокрылый клест (самец); 679 — обыкновенный снегирь (679a — самец, 679b — самка); 680 — уссурийский снегирь (самец); 681 — серый снегирь (самец).




Таблица 54. 663 — сибирский вьюрок; 664 — дальневосточный вьюрок; 665 — американский вьюрок; 666 — жемчужный вьюрок; 667 — гималайский вьюрок; 669 — краснокрылый вьюрок; 685 — полевой воробей; 686 — домовый воробей (686a — самец, 686b — самка); 687 — черногрудый воробей (самец); 688 — рыжий воробей (688a — самец, 688b — самка); 689 — каменный воробей; 690 — короткопалый воробей; 691 — снежный воробей (691a — самец, 691b — самка); 692 — монгольский воробей; 726 — белохолая овсянка.




Таблица 55. 693 — обыкновенная овсянка (693а — самец, 693б — самка); 694 — садовая овсянка; 695 — каменная овсянка; 696 — огородная овсянка (696а — самец, 696б — самка); 697 — седоголовая овсянка (697а — самец, 697б — самка); 698 — сизая овсянка; 706 — рыжая овсянка (706а — самец, 706б — самка); 707 — желчная овсянка (707а — самец, 707б — самка); 708 — черноголовая овсянка (708а — самец, 708б — самка); 709 — дубровник (709а — самец, 709б — самка); 710 — желтогорлая овсянка; 715 — желтобровая овсянка; 717 — просьянка.





Таблица 56. 699 — горная овсянка; 700 — овсянка Годлевского; 701 — красноухая овсянка (701a — самец, 701b — самка); 702 — овсянка Янковского; 703 — белошапочная овсянка (703a — самец, 703b — самка); 704 — ошейниковая овсянка; 705 — овсянка-крошка; 711 — камышевая овсянка (711a — самец, 711b — самка); 712 — полярная овсянка (712a — самец, 712b — самка); 713 — овсянка-ремез (713a — самец, 713b — самка); 714 — черногорлая овсянка (714a — самец, 714b — самка); 716 — рыжешейная овсянка; 718 — лапландский подорожник (718a — самец, 718b — самка); 721 — обыкновенная саванная овсянка; 727 — серый юнко.

страны по полям и лугам, часто в поселках. В начале XX века обыкновенная овсянка зимовала в основном в Средней полосе, питаясь овсом у конюшен и постоялых дворов. С переходом транспорта и сельского хозяйства на механическую тягу стала в значительном количестве улетать на юг. Песня — звонкое "зинь-зинь-зинь-зиин...щик", крик — звонкое "чик".


Садовая овсянка
[694] — *Emberiza hortulana*
(Таблица 55)



У самца голова и грудь зеленовато-серые, горло желтоватое, по бокам хвоста белые полосы. Самки коричневатые с беловатым низом, желтоватым горлом, сероватой головой и пестринами на груди. Надхвостье коричневое, клюв светлый, вокруг глаза узкое белое кольцо, заметное только вблизи.

Гнездится в степных районах Европейской части России, Кавказа и юга Сибири на восток до Байкала. Перелетный вид. Песня — громкое "тью-тью-тюрр", не такое быстрое, как у обыкновенной овсянки, крик — тихое "чик".


Каменная овсянка
[695] — *Emberiza buchanani*
(Таблица 55)



Голова и спина серые, горло, "усы", брюшко и полосы по бокам хвоста белые, грудь и бока коричневатые без пестрин.

Гнездится в горных степях Алтая на высотах 1000-2500 м над уровнем моря. Перелетный вид. Песня — звонкая трель, крик — тихое "чик".


В Тульскую обл. залетала южноевропейская огородная овсянка — *Emberiza cirius* [696], (Таблица 55). У самца верх головы зеленоватый; щеки, горло и полоска через глаз черные; грудь и бока головы желтые. У самки голова, грудь и брюшко желтоватые с темными пестринами, надхвостье коричневое. Песня — дрожащий металлический свист, крик — тихое "сип".



Седоголовая овсянка [697] — *Emberiza spodocephala*
(Таблица 55)

У самца голова и шея темно-серые, горло черное, верх бурый, грудь и брюшко желтоватые, по бокам хвоста белые полосы. У самки голова и верх сероватые, бока в темных пестринах. Клюв бурый.


Гнездится по опушкам, вырубкам и сырым лугам с кустарниками на юге Сибири и Дальнего Востока на запад до долины Енисея. Перелетный вид. Песня — громкое "ти-ти-ти", крик — тихое металлическое "тик".



Сизая овсянка [698] — *Emberiza variabilis*
(Таблица 55)

Самец темно-серый с черными пестринами на спине, самки серые с ржавым налетом на спине и белым брюшком. От завирушек [504-510] отличается толстым светлым клювом.

Гнездится в кустарниках на Камчатке, Курилах, Сахалине и острове Монерон. Перелетный вид. Песня — короткое "юи-цииие-цииие", крик — тихое циканье.



Горная овсянка [699] — *Emberiza cia*
(Таблица 56)

У самца голова серая с белыми и черными полосками, грудь серая, остальное оперение буровато-коричневое, по бокам хвоста белые полосы; самки с такими же полосками, но голова и брюшко буроватые (в отличие от самок обыкновенной овсянки [693]). Горло белое, клюв темный, надхвостье каштановое.


Гнездится по кустарникам в безлесных горах Кавказа и Алтая до высоты 3000 м над уровнем моря. Зимой обычна в пред-

горьях, например, на Кавказских минеральных водах. Песня — короткое щебетание "ци-ци-ци", крик — негромкое "шиит".

Овсянка Годлевского
[700] — *Emberiza*
godlewskii
(Таблица 56)

Очень похожа на горную овсянку, но полосы на голове коричневые.


Гнездится в безлесных горах Южной Сибири от Алтая до Забайкалья. Зимой кочует до Бийска и Томска на север.



Красноухая овсянка
[701] — *Emberiza*
cioides
(Таблица 56)

У самца верх головы, пятно по бокам головы, полоса через глаз, поперечная полоса на груди и бока каштановые без пестрин, верх коричневый, бровь, горло, брюшко и полосы по бокам хвоста белые. Самка окрашена более тускло.

Гнездится и зимует по безлесным горным склонам юга Сибири и Дальнего Востока. Песня — звонкая трель, крик — тихое металлическое "цик".





Овсянка Янковского
[702] — *Emberiza*
jankowskii
(Таблица 56)

Верх головы, спина и надхвостье рыжевато-бурые, брюшко белое, "усы" черные, поперек брюшка яркое коричневое пятно.

Гнездится и зимует по безлесным холмам Хасанского района Приморья. Песня — короткая трель, крик — тихое "цик".

Численность в последние десятилетия резко сократилась. Занесена в Красную книгу России.






Белошапочная овсянка
[703] — *Emberiza*
leucoscephala
(Таблица 56)

У самца верх головы, ошейник, пятно под глазом и брюшко белые; верх,

горло, грудь и бока головы коричневые; хвост с белыми полосками. Самка окрашена более тускло, но светлая шапочка обычно все же заметна, надхвостье каштановое.

Гнездится по вырубкам и опушкам по всей лесной зоне Сибири и Дальнего Востока. Перелетный вид. Песня — звонкое "тинь-тинь-тии", понижающееся к концу, крик — тихое металлическое "чик".



Ошейниковая овсянка
[704] — *Emberiza fucata*
(Таблица 56)

Голова и шея серые с бурыми пятнами, спинная сторона коричневая с черными пестринами, брюш-

ко светлое, поперек груди рыжая полоса и цепочка черных пятен, горло белое, щеки и пятно на плече каштановые.

Гнездится по высокотравным лугам и вырубкам Забайкалья и юга Дальнего Востока. Перелетный вид. Песня — короткая трель, голос — тихое циканье.




Овсянка-крошка
[705] — *Emberiza pusilla*
(Таблица 56)

Голова буровато-рыжая с черной полосой над глазом, спина сероватая, остальной верх бурый, брюш-

ко белое с бурыми пестринами, полосы по бокам хвоста белые. От самок других овсянок отличается четкими пестринами на груди и боках.

Гнездится в южной тундре, лесотундре и тайге севера Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. Осенью встречается в предгорьях юга Сибири и Дальнего Востока. Песня — звонкое "ти-ти-ти-тиирч", крик — резкое "шиик".


Рыжая овсянка [706] —
Emberiza rutila
(Таблица 55)



У самца голова, горло, спина и надхвостье каштаново-рыжие, хвост и крылья бурые, брюшко бледно-желтое. Самки рыжевато-бурые с желтовато-белым низом и каштановым надхвостьем. Клюв темный, бока в темных пестринах, хвост без белых полос.

Гнездится в сырой лиственничной тайге юга Восточной Сибири и Дальнего Востока. Перелетный вид. Песня — звонкое "тей-тей-теей-йо-йо-йой-си-си-си", крик — тихое "тик".


Желчная овсянка
[707] — *Emberiza*
bruniceps
(Таблица 55)



Похожа на рыжую овсянку, но надхвостье, зашеек и брюшко ярко-желтые, спина зеленоватая. Самки серые. Клюв темный.

Гнездится в степных кустарниках на востоке Нижнего Поволжья, залетает в районы, пограничные с Казахстаном. Перелетный вид. Песня — звонкое "чуть-чуть-чуть-триурири", крик — тихое циканье.

Черноголовая овсянка
[708] — *Emberiza*
melanocephala
(Таблица 55)



У самца голова черная, спинная сторона и бока рыжевато-коричневые, горло,

ошейник и брюшко ярко-желтые. Самки сверху желтовато-серые, снизу желтовато-белые без пятен на боках, с желтым подхвостом. Хвост темный без белых полос, надхвостье каштановое.


Гнездится в холмистых степях и оврагах Предкавказья и Нижнего Поволжья. Перелетный вид. Песня — громкое "ти-ти-титиури", крик — тихое циканье.



Дубровник [709] —
Emberiza aureola
(Таблица 55)

У самца весной и летом горло и бока головы черные, полоска поперек зоба и верх каштаново-коричневые, на плечах белая полоса, брюшко желтое. У самок и самцов осенью каштановый цвет заменен буро-серым, бока головы бурые, брюхо желтоватое.

Гнездится на лугах и болотах с кустарниками, гарях, поймах и опушках почти повсюду от лесотундры до лесостепи. Встречается даже в черте Москвы, но всегда в небольшом количестве. Перелетный вид. Песня — звонкое "филю-филю-фили-фили-фили-тью-тью", крик — тихое циканье.



Желтогорлая овсянка
[710] — *Emberiza*
elegans
(Таблица 55)

На голове короткий хохолок. Характерно что, в отличие от других хохлатых

птиц, желтогорлая овсянка при возбуждении хохол прижимает, а не топорщит. У самца верх головы, полоса через глаз и большое пятно на зобе черные, крылья и хвост бурые, спина коричневая с темными продольными пестринами, надхвостье серое, брюшко и полоски по бокам хвоста белые, горло и бровь желтые. Самки более тусклые, черный цвет заменен бурым, клюв светлый, хвост без белых полос.

Гнездится по долинам лесных рек, полянам и вырубкам юга Дальнего Востока. Перелетный вид. Песня — красивая трель, голос — тихое "тик".


Камышовая овсянка
[711] — *Emberiza*
schoeniclus
 (Таблица 56)



У самца голова и горло черные с белой полосой от клюва к zobу, спина рыже-вато-серая в бурых пестринах, хвост бурый с белыми полосками по бокам, брюшко и ошейник белые. Зимой щеки белые. У самки голова буро-серая с бурыми пестринами, такие же пестрины на груди, горло и бровь белые, от клюва вниз черная полоска, надхвостье серое. По бокам хвоста белые полосы.

Распространена почти повсюду от южных тундр до степей, от западных границ России до Лены, на юге Дальнего Востока и Камчатке. Зимой встречается в равнинном Дагестане. Гнездится в тростниковых и кустарниковых зарослях по болотам и берегам водоемов. Песня — громкое "шри-ши-ти-ти-ти", крик — тихое "цик-цик".


Полярная овсянка
[712] — *Emberiza pallasi*
 (Таблица 56)



Похожа на камышовую овсянку, но мельче (меньше воробья), у самки брюшко и бока головы рыжеватые, у самца спина серая без рыжего оттенка.

Гнездится в равнинных и горных тундрах Сибири и Охотского побережья, в горных степях Южной Сибири, в тайге по Вилюю и Нижнему Амуру. Зимой встречается в Приморье. Песня — негромкая трель, крик — тихое "ци-си".


Овсянка-ремез [713] —
Emberiza rustica
 (Таблица 56)



У самца голова черная, бровь, горло, полосы по бокам хвоста и брюхо белые, спинная сторона и

полоса поперек груди рыжевато-коричневые, крылья и пестрины на спине бурые. Самки, а также самцы осенью окрашены более тускло, черный цвет заменен бурым с темными пестринами.


Гнездится в лесотундре и тайге севера Европейской части России, Сибири (кроме Забайкалья) и севера Дальнего Востока, на пролете обычна на юге Дальнего Востока. Песня — короткая звонкая трель, крик — тихое "тик".



**Черногорлая
овсянка [714] —
*Emberiza
tristrami*
(Таблица 56)**

Голова и горло черные; вдоль темени, над глазом и по бокам горла тонкие белые полосы; остальное оперение рыжевато-бурое с темными пестринами. У самки черный цвет заменен темно-бурым, горло светлое. Надхвостье каштановое.

Гнездится в подлеске темнохвойной тайги Приамурья и Приморья. Перелетный вид. Песня — звонкая трель, крик — тихое циканье.




**Желтобровая
овсянка [715] —
*Emberiza
chrysophrys*
(Таблица 55)**

Похожа на желтогорлую овсянку [710], но горло белое, на груди нет черного пятна, бровь желтая. На груди темные продольные пестрины (в отличие от желтогорлой овсянки).

Распространена в центральных районах Восточной Сибири, на пролете встречается в Забайкалье и Приамурье. Обитает в подлеске таежных лесов. Гнездо иногда располагается на дереве. Песня — звонкая трель, крик — нежный свист.


Рыжешейная овсянка
[716] — *Emberiza*
yessoensis
 (Таблица 56)



У самца голова полностью черная, верх рыжеватый в черных пестринах, брюшко охристо-белое. У самки голова черно-бурая с пестринами, надхвостье каштановое (в отличие от самок камышовый и полярной овсянок [711, 712]). По бокам хвоста белые полосы.

Гнездится на болотах Южного Приморья, Приамурья и о. Кунашир. Часть птиц зимует в Хасанском районе Приморья. Песня — тихая двусложная трель, крик — протяжное циканье.

Просьянка [717] —
Emberiza calandra
 (Таблица 55)




Заметно крупнее воробья, спинная сторона серовато-бурая с темными и светлыми продольными пестринами, брюхо светлое в бурых пестринах. Клюв очень толстый, серого цвета. От самок других овсянок отличается также хвостом без белых полос и тяжелым полетом.

Гнездится в полях, лугах и степях с кустарниками в бассейне Нижнего Дона и Предкавказье. Зимой кочует до Воронежа и Омска на север. Песня — короткая сухая трель, крик — резкое "цип".

18.28.2. Род Подорожники — *Calcaricus*

В России один вид.

Лапландский подорожник [718] — *Calcaricus*
lapponicus
 (Таблица 56)



Мелкая птица, похожая на овсянок [693-716], но с более коротким хвостом и

длинным прямым когтем заднего пальца. Самцы легко узнаются по черным голове и груди, белым бокам шеи и бровям, яркому каштаново-рыжему пятну на затылке; сверху они коричневато-серые с черными пестринами, снизу белые. Зимой от черного цвета головы остаются отдельные пестрины на белом фоне, тоже достаточно заметные. У самок верх головы черно-бурый с рыжей полосой посередине и светлыми — по бокам, затылок рыжеватый, крылья коричневатые, горло и брюхо белые.


Распространен по всей тундровой зоне, на севере Дальнего Востока, в горах Северного Урала, Путораны. Гнездится на земле в равнинных и горных тундрах. В кладке 4-6 бурых с черно-бурыми пятнами яиц. Зимой встречается на юге страны по открытым местам, часто в стаях овсянок, пуночек и жаворонков. Песня — звонкие трели, крик — печальный короткий свист. Часто поет на лету.

18.28.3. Род Пуночки — *Plectrophenax*

Мелкие птицы плотного сложения, очень светлой окраски. Самец белый, осенью с рыжеватым верхом. Самка сверху серая, снизу грязно-белая. Молодые птицы похожи на самок, но голова и грудь темные. В полете крылья белые с черными концами, хвост белый с черным треугольником. Часто поют на лету.

Обитают в сухих каменистых тундрах. Гнезда устраивают на земле в каменистых россыпях и других укрытиях. В кладке 4-7 зеленоватых с черными пятнами яиц. Зимой кочуют по открытым местам.

Два вида.



Пуночка [719] —
Plectrophenax nivalis
(Таблица 37)

У самца летом спина черная, у самца зимой и самок на плече темно-серая полоска, середина хвоста черная.


Гнездится по всей тундровой зоне, на островах Арктики, Камчатке, на Командорах и Северных Курилах. Зимой

может быть встречена по всей территории страны, но чаще в Средней полосе и на юге. Голос — звонкая нисходящая трель.

**Белая пуночка [720] —
*Plectrophenax
hyperboreus***

Летом у самца спина, а у самки голова белые, у самца зимой и у самки плечи без темно-серой полосы, середина хвоста серая.

Гнездится на островах Аляски, зимой кочует по Восточной Чукотке. Голос — мягкий долгий щебет.




**18.28.4. Род Саванные овсянки —
*Ammodramus***

В России один очень редкий вид.

**Обыкновенная саванная
овсянка [721] —
*Ammodramus
sandwichensis*
(Таблица 56)**

Тусклой окраски, сверху серо-бурая с темными продольными пестринами (крупными на спине, мелкими на темени и затылке), брюхо белое с темными пестринами на боках и груди, полоса вдоль темени и бровь желтоватые, хвост сравнительно короткий, клюв светлый. От овсянки-крошки [705] отличается буроватой, а не серой спиной и тем, что пестрины на спине сливаются в полосы; от самки лапландского подорожника [718] — отсутствием каштаново-рыжего пятна на затылке.



Очень редко гнездится на Чукотском полуострове и, возможно, на острове Врангеля. Гнезда на земле в сухих тундрах, в кладке 3-6 белых с коричневыми пятнами яиц. Песня — 2-6 коротких свистов, затем 1-2 коротких трели.

18.28.5. Род Воробьиные овсянки — *Spizella*

Спинная сторона бурая с рыжими и темными пестринами, бока оливковые, брюхо светлое, на крыле две белых полосы, на голове каштановая шапочка. Внешне напоминают воробьев [685-688], но по земле ходят, а не прыгают. На Чукотку и остров Врангеля залетают два североамериканских вида:

Воробьиная овсянка [722] — *Spizella passerina*, с черной полосой через глаз и белой бровью, светлым клювом и ногами. голос — быстрые посвисты;

Древесная овсянка [723] — *Spizella arborea*, с коричневой полосой через глаз, черным пятнышком на груди, темным надклювьем и ногами, желтым подклювьем и белыми боками хвоста, голос — двусложный дрожащий свист.

18.28.6. Род Серощекие овсянки — *Zonotrichia*

Спинная сторона серовато-коричневая, брюхо белое, клюв розовый, хвост темный без белых полос. На Чукотский п-ов и о. Врангеля залетают три североамериканских вида:

Пестрогрудая овсянка [724] — *Zonotrichia iliaca*, с шоколадно-бурыми без пестрин спиной и головой, белыми в черных пестринах теменем, грудью, горлом и боками, черным пятном на груди, голос — чистая трель, начинающаяся с 2-3 посвистов;

Чернобровая овсянка [725] — *Zonotrichia atricapilla*, голова светло-серая с зеленовато-желтым теменем, окаймленным широкой черной полосой, серым горлом и затылком, на крыле две белых полосы, голос — 3-5 нисходящих посвистов;

Белохолая овсянка [726] — *Zonotrichia leucophrys* (Таблица 54), у самца голова светло-серая с черной полосой через глаз, белой бровью и белым теменем, окаймленным широкой черной полосой (у молодых птиц белый цвет заменен рыжим), на крыле две белых полосы, голос — чистый свист и жужжащие трели.

На остров Врангеля и Чукотский полуостров залетал также **серый юнко** — *Junco hyemalis* [727], (Таблица 56), аспидно-серый без пестрин с белыми боками хвоста и брюшком, темной продольной полосой на горле, розовым клювом, у самки спина с буроватым оттенком, голос — короткая трель.

Любой из шести перечисленных американских видов [721-726] может гнездиться на нашей территории, но пока гнездование известно только для обыкновенной саванной овсянки.

Примечание. Многие зоологи относят белолобую ласточку, разноголосого дрозда, синехвостку, толстоклювую камышевку, тонкоклювую камышевку, малую мухоловку, обеих зеленушек, чижа, краснокрылого вьюрка и монгольского земляного воробья к самостоятельным родам соответственно *Petrochelidon*, *Ixoreus*, *Tarsiger*, *Phragmaticola*, *Luscinola*, *Siphia*, *Chloris*, *Spinus*, *Rhodopchys* и *Pyrgilauda*; а розового, серого и трех других наших дальневосточных скворцов — к родам *Pastor*, *Spodiopsar*, *Sturnia*.

Иногда обыкновенную и даурскую галок выносят в род *Coloeus*, сибирского дрозда относят к роду Земляные дрозды — *Zoothera*, а короткохвостку — к роду Широкохвостки — *Cettia*.

Во многих справочниках оляпок выделяют в самостоятельное семейство Оляпковые — *Cinclidae*, ополовника и близкие виды зарубежной фауны — в семейство Длиннохвостые синицы — *Aegithalidae*, корольков включают в семейство Славковые — *Sylvidae*, райских мухоловок — в семейство Монарховые — *Monarchidae*, а краснокрылого стенолаза — в семейство Поползневые — *Sittidae*.

Рекомендуемая литература

Беме Р.Л., Флинт В.Е. Пятиязычный словарь названий животных (птицы). — М., "Руссо", 1994.

Дементьев Г.П., Гладков Н.А. (ред.) Птицы Советского Союза. Изд. "Советская наука", Т.1-6, — М., 1951-54.

Иванов А.И. Каталог птиц СССР. — Л., "Наука", 1976.

Иванов А.И., Штегман Б.К. Краткий определитель птиц СССР. Л., "Наука", 1978.

Ильичев В.Д., Михеев А.В. и др. Жизнь Животных. Т.6 — М., "Просвещение", 1986.

Ильичев В.Д., Флинт В.Е. (ред.) Птицы СССР, Т.1-5, — М., "Наука", 1990.

Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. Изд-во Лен. ун-та, 1981.

Потапов Р.С. Тетеревиные. Изд-во Лен. ун-та, 1989.

Пукинский Ю.Б. Жизнь сов. Изд-во Лен. ун-та, 1977.

Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. — М., "Наука", 1990.

Флинт В.Е., Беме Р.Л. и др. Птицы СССР. — М., "Мысль", 1968.

Bruun B.B., Singer A. The Hamlin Guide to birds of Britain and Europe. London, 1985.

Указатель русских названий

- Авдотка**, 162
Аист белый, 55
— дальневосточный, 56
— черный, 56
Альбатрос белоспинный, 37
— странствующий, 38
— темноспинный, 38
— черноногий, 38
- Баклан берингов**, 51
— большой, 50
— краснолицый, 51
— малый, 52
— очковый, 52
— уссурийский, 50
— ушастый, 52
— хохлатый, 51
Балобан, 129
Бегунок, 200
Бекас, 194
— азиатский, 196
— цветной, 198
— японский, 196
Белобрюшка, 228
Белоглазка буробокая, 370
— японская, 370
Белошей, 77
Беркут, 107
Бормотушка северная, 352
— южная, 352
Бородач, 126
Бургомистр, 209
Буревестник бледноногий, 41
— буллеров, 41
— обыкновенный, 40
— пестролицый, 42
— пестрый, 42
— серый, 41
— тонкокловый, 41
Бюльбюль короткопалый, 294
- Вальдшнеп**, 197
Варакушка, 338
Веретенник азиатский бекасовидный, 190
— американский бекасовидный, 190
— большой, 191
— канадский бекасовидный, 190
— малый, 191
Вертишейка, 274
Волчок, 64
— амурский, 64
— китайский, 65
— коричневый, 65
Воробей домовый, 397
— индийский, 397
— каменный, 398
— короткопалый, 398
— монгольский, 399
— полевой, 396
— рыжий, 398
— снежный, 399
— черногрудый, 397
Ворон, 305
Ворона большешкловая, 307
— серая, 306
— черная, 307
Воронок восточный, 279
Вьюрок американский, 387
— гималайский, 387
— дальневосточный, 387
— жемчужный, 387
— канареечный, 385
— канарский, 386
— королевский, 388
— краснокрылый, 388
— монгольский,
— сибирский, 386
Выпь, 63
Вяхирь, 234
— японский, 234
- Гаичка канадская**, 375
— сероголовая, 375
— черноголовая, 375
Галстучник, 167
— американский, 167
Гага гребенушка, 93

- обыкновенная, 92
- очковая, 93
- сибирская, 94
- Гагара белоклювая, 29
- белошейная, 28
- краснозобая, 28
- полярная, 30
- чернозобая, 29
- Гагарка, 222
- Галка альпийская, 310
- даурская, 309
- обыкновенная, 308
- Гаршнеп, 197
- Глупыш, 39
- Глухарь, 138
- каменный, 139
- Гоголь исландский, 99
- малый, 99
- обыкновенный, 98
- Голубок морской, 212
- Голубь бурый, 234
- зеленый, 234
- сизый, 232
- скалистый, 233
- Горихвостка краснобрюхая, 333
- красноспинная, 334
- обыкновенная, 332
- сибирская, 333
- чернушка, 332
- Горлица большая, 235
- кольчатая, 236
- короткохвостая, 236
- малая, 236
- обыкновенная, 235
- Грач, 307
- Гриф черный, 127
- Грязовик, 183
- Гуменник, 74
- короткоклювый, 74
- Гусь белолобый, 74
- белый, 76
- горный, 76
- Росса, 76
- серый, 73
- Дербник, 131
- Джек, 160
- Дикуша азиатская, 136
- Древесница желтая, 371
- малая, 370
- миртовая, 370
- речная, 370
- рыжешапочная, 371
- Дрозд белобрюхий, 325
- белобровик, 320
- белогорлый, 327
- белозобый, 324
- бледный, 323
- бурый, 321
- деряба, 319
- золотистый, 323
- краснозобый, 322
- малый, 325
- оливковый, 323
- отшельник, 326
- певчий, 320
- пестрый, 326
- пестрый каменный, 327
- разноголосый, 326
- рыжий, 321
- рябинник, 319
- свэнсонов, 326
- сибирский, 324
- сизый, 322
- синий каменный, 328
- странствующий, 325
- чернозобый, 322
- черный, 324
- Дронго индийский, 304
- черный, 304
- Дрофа, 159
- Дубонос большой черноголо-
вый, 395
- малый черноголовый, 395
- обыкновенный, 394
- Дубровник, 406
- Дупель, 195
- горный, 196
- лесной, 195
- Дутыш, 179
- Дятел белоспинный, 271
- большой острокрылый, 273
- большой пестрый, 270
- зеленый, 269
- канадский пестрый, 273
- малый острокрылый, 273
- малый пестрый, 272
- рыжебрюхий, 272
- седой, 269
- сирийский, 271
- средний пестрый, 271
- трехпалый, 269
- Жаворонок белокрылый, 284
- двупятнистый, 285

— малый, 283
 — монгольский, 285
 — полевой, 281
 — пустынный, 285
 — рогатый, 286
 — серый, 283
 — солончаковый, 283
 — степной, 284
 — хохлатый, 283
 — черный, 285
 — японский, 282
 Желна, 268
 Желтозобик, 183
 Жулан обыкновенный, 296
 — сибирский, 297
 Журавль даурский, 150
 — канадский, 149
 — серый, 149
 — черный, 149
 — японский, 150
 Завирушка альпийская, 318
 — бледная, 317
 — гималайская, 318
 — лесная, 316
 — сибирская, 317
 — черногорлая, 317
 — японская, 316
 Зарянка, 334
 — японская, 337
 Зеленушка китайская, 383
 — обыкновенная, 382
 Зимняк, 113
 Зимородок большой пегий, 262
 — красный, 263
 — малый пегий, 263
 — обыкновенный, 262
 — ошейниковый, 263
 Змея, 122
 Зук большеклювый, 169
 — восточный, 170
 — каспийский, 169
 — крикливый, 167
 — малый, 167
 — монгольский, 168
 — морской, 168
 — уссурийский, 168
 Зяблик, 380

Ибис красноногий, 66
 — священный, 67
 — черноголовый, 67
 Иволга китайская, 300
 — обыкновенная, 300

Индейка дикая, 146
 Ипатка, 230
 Казарка американская, 78
 — белошеская, 79
 — канадская, 79
 — краснозобая, 80
 — черная, 78
 Кайра толстоклювая, 221
 — тонкоклювая, 221
 Каменка златогузая, 330
 — обыкновенная, 328
 — плешанка, 329
 — плясунья, 329
 — пустынная, 330
 — чернопега, 329
 Каменушка, 96
 Камнешарка, 175
 — черная, 175
 Камышевка барсучок, 355
 — болотная, 354
 — вертлявая, 355
 — дроздовидная, 353
 — индийская, 354
 — садовая, 354
 — толстоклювая, 356
 — тонкоклювая, 356
 — тростниковая, 353
 — чернобровая, 355
 — японская, 362
 Камышница, 156
 — рогатая, 156
 Канюк, 112
 Каравайка, 66
 Касатка, 85
 Качурка британская, 46
 — мадейская, 46
 — малая, 45
 — океаническая, 46
 — северная, 45
 — сизая, 45
 — темная, 46
 Кваква зеленая, 62
 — обыкновенная, 62
 — японская, 63
 Кедровка, 310
 Кеклик, 144
 Клест белокрылый, 392
 — еловик, 392
 — сосновик, 392
 Клинтух, 233
 Клуша, 207

- Клушица, 304
 Кобчик, 131
 — амурский, 132
 Козодой большой, 256
 — буланный, 256
 — обыкновенный, 256
 Колибри охристый, 260
 Колпица, 65
 — малая, 66
 Конек Годлевского, 288
 — гольцовый, 290
 — горный, 289
 — краснозобый, 288
 — лесной, 287
 — луговой, 287
 — полевой, 289
 — пятнистый, 287
 — сибирский, 288
 — скалистый, 290
 — степной, 289
 Коноплянка, 385
 Конюга большая, 227
 — крошка, 228
 — малая, 227
 Королек американский, 364
 — желтоголовый, 363
 — красноголовый, 363
 Коростель, 152
 Короткохвостка, 362
 Коршун красный, 118
 — черный, 118
 Крапивник, 315
 Красавка, 151
 Краснозобик, 176
 Крачка алеутская, 217
 — белокрылая, 219
 — белошекая, 220
 — камчатская, 217
 — малая, 217
 — пестроногая, 217
 — полярная, 216
 — речная, 216
 — темная, 218
 — чайконогая, 218
 — черная, 219
 Кречет, 129
 Кречетка, 164
 Кроншнеп большой, 192
 — дальневосточный, 192
 — малютка, 193
 — средний, 193
 — таитянский, 194
 — тонкокловый, 193
 — эскимосский, 194
 Крохаль большой, 101
 — длинноносый, 100
 — чешуйчатый, 101
 Кряква, 83
 — черная, 83
 Кукушка глухая, 241
 — индийская, 241
 — малая, 241
 — обыкновенная, 240
 — ширококрылая, 242
 Кукша, 311
 — канадская, 311
 Кулик-воробей, 176
 — лопатень, 179
 — сорока, 172
 — сорока черный, 172
 Курганник, 112
 — мохноногий, 113
 Курица банкивская, 146
 Куропатка белая, 141
 — бородастая, 144
 — серая, 143
 — тундряная, 141
 Лазоревка, 373
 — белая, 373
 Ласточка белолобая, 278
 — береговушка, 280
 — городская, 279
 — деревенская, 277
 — древесная, 279
 — рыжепоясничная, 278
 — скалистая, 280
 Лебедь американский, 72
 — кликун, 71
 — малый, 71
 — трубач, 71
 — черный, 73
 — шипун, 72
 Личинкоед серый, 293
 Лунь азиатский, 125
 — болотный, 125
 — луговой, 124
 — пегий, 124
 — полевой, 123
 — степной, 124
 Луток, 102
 Лысуха, 158
 Люрик, 222

Майна, 304

Мандаринка, 99

Могильник, 108

Моевка красноногая, 215

— обыкновенная, 214

Мородунка, 188

Морянка, 97

Московка, 374

Мухоловка белошейка, 366

— желтоспинная, 367

— малая, 368

— пестрогрудая, 365

— пеструшка, 366

— полуошейниковая, 366

— райская, 369

— серая, 364

— сибирская, 365

— синяя, 368

— таежная, 367

— черная райская, 369

— ширококлювая, 365

— японская, 367

Неясыть бородатая, 246

— длиннохвостая, 247

— серая, 247

Нырок белоглазый, 90

— бэров, 90

— красноголовый, 89

— красноносый, 88

Овсянка белохохлая, 412

— белшапочная, 404

— воробыная, 412

— Годлевского, 403

— горная, 402

— древесная, 412

— желтобровая, 408

— желтогорлая, 406

— желчная, 405

— каменная, 401

— камышовая, 407

— красноухая, 403

— крошка, 404

— обыкновенная, 400

— обыкновенная саванная, 411

— огородная, 401

— ошейниковая, 404

— пестрогрудая, 412

— полярная, 407

— ремез, 407

— рыжая, 405

— рыжешейная, 409

— садовая, 401

— седоголовая, 402

— сизая, 402

— чернбровая, 412

— черноголовая, 405

— черногорлая, 408

— Янковского, 403

Огарь, 81

Олуша красноногая, 53

— северная, 53

Оляпка бурая, 314

— мексиканская, 315

— обыкновенная, 314

Ополовник, 339

Орел карлик, 110

— степной, 108

— хохлатый, 111

Орлан белоголовый, 117

— белоплечий, 117

— белохвост, 116

— долгохвост, 117

Осоед, 115

— хохлатый, 115

Пастушок белогрудый, 157

— водяной, 153

Пеганка, 81

— хохлатая, 81

Пеликан кудрявый, 48

— розовый, 49

Пеночка бледноногая, 350

— бурая, 350

— весничка, 345

— желтобрюхая, 348

— зарничка, 348

— зеленая, 347

— индийская, 350

— кавказская, 346

— корольковая, 348

— сахалинская, 351

— светлоголовая, 349

— таловка, 347

— теньковка, 346

— толстоклювая, 349

— трещотка, 347

Перевозчик, 188

— пятнистый, 188

Перепел, 142

— немой, 143

- Перепелятник, 120
 — американский, 122
 — китайский, 121
 — малый, 121
 Пересмешка бледная, 352
 — обыкновенная, 351
 Песочник белохвостый, 177
 — берингийский, 181
 — большой, 182
 — бонапартов, 182
 — бэрдов, 180
 — длинноногий, 184
 — длиннопалый, 177
 — исландский, 182
 — красношейка, 178
 — крошка, 177
 — малый, 178
 — морской, 181
 — острохвостый, 180
 — перепончатопалый, 178
 Пестрогрудка малая, 360
 — сибирская, 360
 Песчанка, 180
 Пигалица белохвостая, 164
 Пискулька, 75
 Пищуха короткопалая, 379
 — обыкновенная, 378
 Плавунчик большой, 173
 — круглоносый, 173
 — плосконосый, 173
 Поганка красношейная, 33
 — малая, 34
 — серошекая, 33
 — черношейная, 34
 Погоньш белокрылый, 155
 — большой, 155
 — красноногий, 155
 — крошка, 154
 — малый, 154
 — обыкновенный, 154
 Подорлик большой, 109
 — малый, 109
 Подорожник лапландский, 409
 Поморник антарктический, 203
 — большой, 203
 — длиннохвостый, 201
 — короткохвостый, 202
 — средний, 202
 Поползень канадский, 377
 — обыкновенный, 376
 — рыжегрудый, 377
 — скалистый, 378
 — черноголовый, 377
 Поручейник, 186
 Просянка, 409
 Пуночка, 410
 — белая, 411
 Пустельга, 132
 — степная, 133
 Пухляк, 374
 Пыжик алеутский, 226
 — длинноклювый, 224
 — короткоклювый, 225
 Ремез, 371
 Ржанка американская, 166
 — бурокрылая, 165
 — золотистая, 165
 Рябок белобрюхий, 238
 — чернобрюхий, 237
 Рябчик, 135
 Савка, 102
 Саджа, 237
 Сапсан, 130
 Сарыч ястребиный, 114
 Сверчок обыкновенный, 357
 — островной, 359
 — охотский, 358
 — певчий, 358
 — пятнистый, 357
 — речной, 359
 — соловьиный, 359
 — таежный, 359
 Свиристель обыкновенный, 299
 — японский, 299
 Связь, 84
 — американская, 84
 Сизоворонка, 265
 Синехвостка, 337
 Синица большая, 372
 — малая, 373
 — серая, 373
 — тисовая, 374
 — усатая, 340
 — хохлатая, 376
 Синьга, 95
 — американская, 96
 Сип белоголовый, 128
 — бенгальский, 128
 — индийский, 128
 Сипуха обыкновенная, 253
 Скворец китайский, 303
 — малый, 303
 — обыкновенный, 301

— розовый, 302
 — серый, 302
 — японский, 303
 Скопа, 106
 Славка белоусая, 344
 — горная, 343
 — завирушка, 343
 — пустынная, 345
 — садовая, 342
 — серая, 343
 — черноголовка, 343
 — ястребиная, 344
 Снегирь обыкновенный, 393
 — серый, 394
 — уссурийский, 393
 Сова белая, 246
 — болотная, 248
 — северная иглоногая, 251
 — ушастая, 248
 — ястребиная, 249
 Совка ошейниковая, 251
 — уссурийская, 250
 Сойка, 312
 — монгольская, 313
 Сокол средиземноморский, 130
 Соловей-красношейка, 336
 — обыкновенный, 335
 — свистун, 336
 — синий, 338
 — тугайный, 339
 — южный, 336
 Сорока, 312
 — голубая, 313
 Сорокопут буланный, 297
 — клинохвостый, 296
 — красноголовый, 298
 — серый, 295
 — тигровый, 298
 — чернолобый, 296
 — японский, 297
 Сплюшка, 250
 Старик обыкновенный, 225
 — хохлатый, 226
 Стенолаз краснокрылый, 379
 Стервятник, 126
 Стерх, 151
 Стрепет, 160
 Стриж белобрюхий, 259
 — белопоясный, 259
 — колючехвостый, 259
 — черный, 258
 Султанка, 157
 Сутора бурая, 341

— тростниковая, 340
 Сухонос, 75
 Сыч домовый, 252
 — мохноногий, 252
 Сычик воробьиный, 253

Тайфунник белошей, 43
 — бонинский, 43
 — бульеров, 44
 — гавайский, 43
 — длинноклювый, 44
 — Кука, 44
 — пестрый, 43
 — Соландра, 43
 — чернокрылый, 44
 Тетерев, 137
 — кавказский, 138
 Тетеревятник, 119
 Тиркушка восточная, 200
 — луговая, 199
 — степная, 199
 Топорок, 230
 Травник, 186
 Трехперстка пятнистая, 158
 Трупиал ржавчатый, 301
 Трясогузка белая, 290
 — горная, 292
 — древесная, 293
 — желтая, 291
 — желтоголовая, 291
 — желтолобая, 292
 — камчатская, 291
 — японская белая, 291
 Тулес, 166
 Тупик, 229
 — носорог, 228
 Турпан, 95
 — горбоносый, 95
 — пестроносый, 96
 Турухтан, 184
 Тювик, 120

Удод, 266
 Улар алтайский, 145
 — кавказский, 145
 Улит американский пепельный, 189
 — большой, 187
 — желтоногий, 187
 — охотский, 187
 — пегий, 188
 — сибирский пепельный, 189
 Утка серая, 84
 Урагус, 390

Фазан, 146

Филин, 244

— американский, 245

— рыбный, 245

Фифи, 185

Фламинго розовый, 67

Фрегат ариэль, 53

Ходулочник, 171

Хохотун черноголовый, 209

Хрустан, 170

Цапля белокрылая, 61

— большая белая, 59

— большая голубая, 58

— египетская, 60

— желтая, 61

— желтоклювая, 60

— малая белая, 59

— рыжая, 58

— серая, 57

— средняя белая, 59

Цесарка обыкновенная, 146

Чайка белая, 204

— бонапартова, 212

— буроголовая, 211

— вилохвостая, 213

— китайская, 212

— малая, 213

— малая полярная, 209

— морская, 207

— озерная, 210

— Одуэна, 210

— реликтовая, 211

— розовая, 214

— северная серебристая, 206

— серебристая, 209

— серокрылая, 208

— сизая, 205

— тихоокеанская, 207

— черноголовая, 211

— чернохвостая, 208

— южная серебристая, 206

Чеглок, 130

Чеграва, 218

Чекан большой, 331

— луговой, 331

— черноголовый, 331

— черный, 331

Чернеть малая морская, 91

— морская, 91

— ошейниковая, 91

— хохлатая, 91

Чернозобик, 176

Черныш, 185

Чечевица арчовая, 389

— большая, 390

— обыкновенная, 389

— сибирская, 389

Чечетка горная, 384

— обыкновенная, 384

— пепельная, 384

Чибис, 163

— серый, 163

— украшенный, 164

— шпорцевый, 164

Чиж, 383

Чирок зеленокрылый, 86

— клоктун, 85

— мраморный, 87

— свистунок, 86

— трескунок, 87

Чистик обыкновенный, 223

— очковый, 224

— тихоокеанский, 223

Чомга, 32

Шилохвость, 85

Шилокловка, 171

Широконоска, 87

Широкорот, 265

Широкохвостка короткокры-

лая, 361

— обыкновенная, 361

Щегол, 381

— седоголовый, 382

— черноголовый, 382

Щеголь, 186

Щур, 391

Щурка зеленая, 264

— золотистая, 264

Юла, 282

Юнко серый, 412

Юрок, 381

Якана фазанохвостая, 198

Указатель латинских названий

- Acanthis cannabina*, 385
 — *flammea*, 384
 — *flavirostris*, 384
 — *hornemanni*, 384
Accipiter brevipes, 120
 — *gentilis*, 119
 — *nisus*, 120
 — *soloensis*, 121
 — *striatus*, 122
 — *virgatus*, 121
Acridotheres tristis, 304
Acrocephalus aedon, 356
 — *agricola*, 354
 — *arundinaceus*, 353
 — *bistrigiceps*, 355
 — *dumetorum*, 354
 — *melanopogon*, 356
 — *paludicola*, 355
 — *palustris*, 354
 — *scirpaceus*, 353
 — *shoenobaenus*, 355
Aegithalos caudatus, 339
Aegolius funereus, 252
Aegypius monachus, 127
Aethia cristatella, 227
 — *psittacula*, 228
 — *pusilla*, 228
 — *pygmaea*, 227
Aix galericulata, 99
Alauda arvensis, 281
 — *japonica*, 282
Alectoris chukar, 144
Alca torda, 222
Alcedo atthis, 262
Alle alle, 222
Amauornis phoenicurus, 157
Ammodramus sandwichensis, 411
Ammomanes deserti, 285
Anas acuta, 85
 — *americana*, 84
 — *angustirostris*, 87
 — *carolinensis*, 86
 — *clypeata*, 87
 — *crecca*, 86
 — *falcata*, 85
 — *formosa*, 85
 — *penelope*, 84
 — *platyrhynchos*, 83
 — *poecilorhyncha*, 83
 — *querquedula*, 87
 — *strepera*, 84
Anser albifrons, 74
 — *anser*, 73
 — *brachyrhynchus*, 74
 — *caerulescens*, 76
 — *canagicus*, 77
 — *cygnoides*, 75
 — *erythropus*, 75
 — *fabalis*, 74
 — *indicus*, 76
 — *rossi*, 77
Anthropoides virgo, 151
Anthus campestris, 289
 — *cervinus*, 288
 — *godlewskii*, 288
 — *gustavi*, 288
 — *hodgsoni*, 287
 — *littoralis*, 290
 — *pratensis*, 287
 — *richardi*, 289
 — *rubescens*, 290
 — *spinoletta*, 289
 — *trivialis*, 287
Aquila chrysaetus, 107
 — *clanga*, 109
 — *heliaca*, 108
 — *nipalensis*, 108
 — *pomarina*, 109
Apus apus, 258
 — *melba*, 259
 — *pacificus*, 259
Ardea cinerea, 57
 — *herodias*, 58
 — *purpurea*, 58
Ardeola bacchus, 61
 — *ralloides*, 61
Arenaria interpres, 175
 — *melanocephala*, 175
Asio flammeus, 248
 — *otus*, 248
Athene noctua, 252
Aythya affinis, 91
 — *baeri*, 90
 — *collaris*, 91
 — *ferina*, 89
 — *fuligula*, 91
 — *marila*, 91
 — *nyroca*, 90

- Bombycilla garrulus*, 299
 — *japonica*, 299
Bonasa bonasia, 135
Botaurus stellaris, 63
Brachyramphus brevirostris, 225
 — *marmoratus*, 224
Bradypterus taczanowskii, 360
 — *thoracicus*, 360
Branta bernicla, 78
 — *canadensis*, 79
 — *leucopsis*, 79
 — *nigricans*, 78
 — *ruficollis*, 80
Bubo bubo, 244
 — *virginianus*, 245
Bubulcus ibis, 60
Bucanetes mongolicus, 388
 — *sanguineus*, 388
Bucephala albeola, 99
 — *clangula*, 98
 — *islandica*, 99
Bulweria bulwerii, 44
Burhinus oedicephalus, 162
Butastur indicus, 114
Buteo buteo, 112
 — *hemilasius*, 113
 — *lagopus*, 113
 — *rufinus*, 112
Butorides striatus, 62

Calandrella cheleensis, 283
 — *cinerea*, 283
 — *rufescens*, 283
Calcarius lapponicus, 409
Calidris acuminata, 180
 — *alba*, 180
 — *alpina*, 176
 — *bairdii*, 180
 — *canutus*, 182
 — *ferruginea*, 176
 — *fuscicollis*, 182
 — *maritima*, 181
 — *mauri*, 178
 — *melanotos*, 179
 — *minuta*, 176
 — *minutilla*, 177
 — *ptilocnemis*, 181
 — *pusilla*, 178
 — *pygmaea*, 179
 — *ruficollis*, 178
 — *subminuta*, 177
 — *temminckii*, 177
 — *tenuirostris*, 182
Calonectris diomedea, 42
 — *leucomelas*, 42
Caprimulgus aegyptius, 256
 — *europaeus*, 256
 — *indicus*, 256
Carpodacus erythrinus, 389
 — *rhodochlamys*, 389
 — *roseus*, 389
 — *rubicilla*, 390
Carduelis caniceps, 382
 — *carduelis*, 381
 — *chloris*, 382
 — *sinica*, 383
 — *spinus*, 383
Catharacta maccormicki, 203
 — *skua*, 203
Catharus guttatus, 326
 — *minimus*, 325
 — *ustulatus*, 326
Cephus carbo, 224
 — *columba*, 223
 — *grylle*, 223
Cercotrichas galactotes, 339
Cerorhinca monocerata, 228
Certhya brachydactyla, 379
 — *familiaris*, 378
Ceryle lugubris, 262
 — *rudis*, 263
Cettia cetti, 361
 — *diphone*, 361
Charadrius alexandrinus, 168
 — *asiaticus*, 169
 — *dubius*, 167
 — *hiaticula*, 167
 — *leschenaultii*, 169
 — *mongolus*, 168
 — *morinellus*, 170
 — *placidus*, 168
 — *semipalmatus*, 167
 — *veredus*, 170
 — *vociferus*, 167
Chlamydotis undulata, 160
Chlidonias hybrida, 220
 — *leucoptera*, 219
 — *nigra*, 219
Ciconia boyciana, 56
 — *ciconia*, 55
 — *nigra*, 56
Cinclus cinclus, 314
 — *mexicanus*, 315
 — *pallasii*, 314
Circaetus gallicus, 122

- Circus aeruginosus*, 125
 — *cyaneus*, 123
 — *macrourus*, 124
 — *melanoleucus*, 124
 — *pygargus*, 124
 — *spilonotus*, 125
Clangula hyemalis, 97
Coccothraustes coccothraustes, 394
Columba eversmanni, 234
 — *janthina*, 234
 — *livia*, 232
 — *oenas*, 233
 — *palumbus*, 234
 — *rupestris*, 233
Coracias garrulus, 265
Corvus corax, 305
 — *cornix*, 306
 — *corone*, 307
 — *dauricus*, 309
 — *frugilegus*, 307
 — *macrorhynchus*, 307
 — *monedula*, 308
Coturnix coturnix, 142
 — *japonica*, 143
Crex crex, 152
Cuculus canorus, 240
 — *micropterus*, 241
 — *poliocephalus*, 241
 — *saturatus*, 241
Culicicapa ceylonesis, 413
Cursorius cursor, 200
Cyanopica cyana, 313
Cyanoptila cyanomelana, 368
Cygnus atratus, 73
 — *bewickii*, 71
 — *buccinator*, 71
 — *columbianus*, 72
 — *cygnus*, 71
 — *olor*, 72
Dendrocopos canicapillus, 273
 — *hyperythrus*, 272
 — *kizuki*, 273
 — *leucotos*, 271
 — *major*, 270
 — *medius*, 271
 — *minor*, 272
 — *syriacus*, 271
 — *villosus*, 273
Dendroica coronata, 370
 — *petechia*, 371
Delichon dasypus, 279
 — *urbica*, 279
Dendronanthus indicus, 293
Dicrurus hottentotus, 304
 — *macrocerus*, 304
Diomedea albatrus, 37
 — *exulans*, 38
 — *immutabilis*, 38
 — *nigripes*, 38
Dryocopus martius, 268
Egretta alba, 59
 — *eulophotes*, 60
 — *garzetta*, 59
 — *intermedia*, 59
Emberiza aureola, 406
 — *bruniceps*, 405
 — *buchanani*, 401
 — *calandra*, 409
 — *chrysophrys*, 408
 — *cia*, 402
 — *cirlus*, 401
 — *citrinella*, 400
 — *cioides*, 403
 — *elegans*, 406
 — *fucata*, 404
 — *godlewskii*, 403
 — *hortulana*, 401
 — *jankowskii*, 403
 — *leucocephala*, 404
 — *melanocephala*, 405
 — *pallasi*, 407
 — *pusilla*, 404
 — *rustica*, 407
 — *rutila*, 405
 — *schoeniclus*, 407
 — *spodocephala*, 402
 — *tristrami*, 408
 — *variabilis*, 402
 — *yessoensis*, 409
Eremophila alpestris, 286
Erithacus rubecula, 334
Eophona migratoria, 395
 — *personata*, 395
Euphagus carolinus, 301
Eurystomus orientalis, 265
Falcipecten falcipecten, 136
Falco amurensis, 132
 — *biarmicus*, 130
 — *cherrug*, 129
 — *columbarius*, 131
 — *gyrfalco*, 129
 — *naumanni*, 133

- peregrinus, 130
- subbuteo, 130
- tinnunculus, 132
- vespertinus, 131
- Ficedula albicollis*, 366
- hypoleuca, 366
- mugimaki, 367
- narcissina, 367
- parva, 368
- semitorquata, 366
- zanthopygia, 367
- Fratercula arctica*, 229
- corniculata, 230
- Fregata ariel*, 53
- Fringilla coelebs*, 380
- montifringilla, 381
- Fulica atra*, 158
- Fulmarus glacialis*, 39
- Galerida cristata*, 283
- Gallicrex cinerea*, 156
- Gallinago gallinago*, 194
- hardwickii, 196
- media, 195
- megala, 195
- solitaria, 196
- stenura, 196
- Gallinula chloropus*, 156
- Gallus gallus*, 146
- Garrulus glandarius*, 312
- Gavia adamsii*, 29
- arctica, 29
- immer, 30
- pacifica, 29
- stellata, 28
- Glareola maldivarum*, 200
- nordmanni, 199
- pratincola, 199
- Glaucidium passerinum*, 253
- Gorsachius goisagi*, 63
- Grus canadensis*, 149
- grus, 149
- japonensis, 150
- leucogeranus, 151
- monacha, 149
- vipio, 150
- Gypaetus barbatus*, 126
- Gyps bengalensis*, 128
- fulvus, 128
- indicus, 128
- Haematopus bachmani*, 172
- ostralegus, 172
- Halcyon coromanda*, 263
- pileata, 263
- Haliaeetus albicilla*, 116
- leucocephalus, 117
- leucoryphus, 117
- pelagicus, 117
- Hieraaetus pennatus*, 110
- Hierococcyx fugax*, 242
- Himantopus himantopus*, 171
- Hippolais caligata*, 352
- icterina, 351
- pallida, 352
- rama, 352
- Hirundapus caudacutus*, 259
- Hirundo daurica*, 278
- pyrrhonota, 278
- rustica, 277
- Histrionicus histrionicus*, 96
- Hydrobates pelagicus*, 46
- Hydrophasianus chirurgus*, 198
- Ixobrychus cinnamomeus*, 65
- eurythmus, 64
- minutus, 64
- sinensis, 65
- Junco hyemalis*, 412
- Junx torquilla*, 274
- Ketupa blakistoni*, 245
- Lagopus lagopus*, 141
- mutus, 141
- Lanius bucephalus*, 297
- collurio, 296
- cristatus, 297
- excubitor, 295
- isabellinus, 297
- minor, 296
- senator, 298
- sphenocercus, 296
- tigrinus, 298
- Larus argentatus*, 205
- audouinii, 210
- brevirostris, 211
- brunnicephalus, 211
- cachinnans, 206
- canus, 205
- crassirostris, 208
- eburnea, 204
- fuscus, 207
- genei, 212
- glaucescens, 208

— glaucoides, 209
 — heuglini, 206
 — hyperboreus, 209
 — ichthyaetus, 209
 — marinus, 207
 — melanocephalus, 211
 — minutus, 213
 — philadelphia, 212
 — relictus, 211
 — rosea, 214
 — ridibundus, 210
 — sabini, 213
 — saundersi, 212
 — schistisagus, 207
Leucosticte arctoa, 386
 — brandti, 387
 — nemoricola, 387
 — pustulata, 387
 — tephrocotis, 387
Limicola falcinellus, 183
Limnodromus griseus, 190
 — scolopaceus, 190
 — semipalmatus, 190
Limosa lapponica, 191
 — limosa, 191
Locustella certhiola, 358
 — fasciolata, 359
 — fluviatilis, 359
 — lanceolata, 357
 — luscinioides, 359
 — naevia, 357
 — ochotensis, 358
 — pleskei, 359
Loxia curvirostra, 392
 — leucoptera, 392
 — pytyopsittacus, 392
Lullula arborea, 282
Lunda cirrhata, 230
Luscinia akahige, 337
 — calliope, 336
 — cyane, 338
 — cyanurus, 337
 — luscinia, 335
 — megarhynchos, 336
 — sibilans, 336
 — svecica, 338
Lymnocyptes minima, 197
Lyrurus mlokosiewiczii, 138
 — tetrax, 137

Megalurus pryori, 362
Melanitta americana, 96
 — deglandi, 95

— fusca, 95
 — nigra, 95
 — perspicillata, 96
Melanocorypha bimaculata, 285
 — calandra, 284
 — leucoptera, 284
 — mongolica, 285
 — yeltoniensis, 285
Meleagris gallopavo, 146
Mergus albellus, 102
 — merganser, 101
 — serrator, 100
 — squamatus, 101
Merops apiaster, 264
 — superciliosus, 264
Micropalama himantopus, 184
Microscelis amaurotis, 294
Milvus migrans, 118
 — milvus, 118
Monticola saxatilis, 327
 — solitarius, 328
Montifringilla davidiana, 399
 — nivalis, 399
Motacilla alba, 290
 — cinerea, 292
 — citreola, 291
 — flava, 291
 — grandis, 291
 — lugens, 291
 — lutea, 292
Muscicapa griseisticta, 365
 — latirostris, 365
 — sibirica, 365
 — striata, 364

Neophron percnopterus, 126
Netta rufina, 88
Ninox scutulata, 251
Nipponia nippon, 66
Nucifraga caryocatactes, 310
Numenius arquata, 192
 — borealis, 194
 — madagascariensis, 192
 — minutus, 193
 — phaeopus, 193
 — tahitiensis, 194
 — tenuirostris, 193
Numida meleagris, 146
Nyctea scandiaca, 246
Nycticorax nycticorax, 62

Oceanites oceanicus, 46
Oceanodroma castro, 46

- *furcata*, 45
- *leucorhoa*, 45
- *monorhis*, 45
- *tristrami*, 46
- Oenanthe deserti*, 330
- *hispanica*, 329
- *isabellina*, 329
- *oenanthe*, 328
- *pleschanka*, 329
- *xanthoprymna*, 330
- Oriolus chinensis*, 300
- *oriolus*, 300
- Otis tarda*, 159
- *tetrax*, 160
- Otus bakkamoena*, 251
- *scops*, 250
- *sunia*, 250
- Oxyura leucocephala*, 102
- Pandion haliaetus*, 106
- Panurus biarmicus*, 340
- Paradoxornis heudei*, 340
- Parus ater*, 374
- *bokharensis*, 373
- *caeruleus*, 373
- *cinctus*, 375
- *cristatus*, 376
- *cyaneus*, 373
- *hudsonicus*, 375
- *major*, 372
- *minor*, 373
- *montanus*, 374
- *palustris*, 375
- *varius*, 374
- Passer domesticus*, 397
- *hispaniolensis*, 397
- *indicus*, 397
- *montanus*, 396
- *rutilans*, 398
- Pelecanus crispus*, 48
- *onocrotalus*, 49
- Perdix daurica*, 144
- *perdix*, 143
- Pernis apivorus*, 115
- *ptilorhynchus*, 115
- Pericrocotus divaricatus*, 293
- Perisoreus canadensis*, 311
- *inaustus*, 311
- Petronia brachydactyla*, 398
- *petronia*, 398
- Petrophila gularis*, 327
- Phalacrocorax aristotelis*, 51
- *auritus*, 52
- *carbo*, 50
- *filamentosus*, 50
- *pelagicus*, 51
- *perspicillatus*, 52
- *pygmaeus*, 52
- *urile*, 51
- Phalaropus fulicarius*, 173
- *lobatus*, 173
- *tricolor*, 173
- Phasianus colchicus*, 146
- Philomachus pugnax*, 184
- Phoenicopterus roseus*, 67
- Phoenicurus aureus*, 333
- *erythrogaster*, 333
- *erythronotus*, 334
- *ochruros*, 332
- *phoenicurus*, 332
- Phylloscopus borealoides*, 351
- *borealis*, 347
- *collybitus*, 346
- *fuscatus*, 350
- *griseolus*, 350
- *inornatus*, 348
- *lorenzii*, 346
- *nitidus*, 348
- *occipitalis*, 349
- *proregulus*, 348
- *sibilatrix*, 347
- *schwarzi*, 349
- *tenellipes*, 350
- *trochiloides*, 347
- *trochilus*, 345
- Pica pica*, 312
- Picoides tridactylus*, 269
- Picus canus*, 269
- *viridis*, 269
- Pinicola enucleator*, 391
- Platalea leucorodia*, 65
- *minor*, 66
- Plectrophenax hyperboreus*, 411
- *nivalis*, 410
- Plegadis falcinellus*, 66
- Pluvialis apricaria*, 165
- *dominica*, 166
- *fulva*, 165
- *squatarola*, 166
- Podiceps auritus*, 33
- *cristatus*, 32
- *griseigena*, 33
- *nigricollis*, 34
- Podoces hendersoni*, 313

- Porphyrio porphyrio*, 157
Porzana exquisita, 155
 — *fusca*, 155
 — *parva*, 154
 — *paykullii*, 155
 — *porzana*, 154
 — *pusilla*, 154
Prunella atrogularis, 317
 — *collaris*, 318
 — *fulvescens*, 317
 — *himalayana*, 318
 — *modularis*, 316
 — *montanella*, 317
 — *rubida*, 316
Pseudogyps bengalensis, 128
Pterocles alchata, 238
 — *orientalis*, 237
Pterodroma cookii, 44
 — *externa*, 43
 — *hypoleuca*, 43
 — *inexpectata*, 43
 — *longirostris*, 44
 — *nigripennis*, 44
 — *phaeopygia*, 43
 — *solandri*, 43
Ptychoramphus aleuticus, 226
Ptyonoprogne rupestris, 280
Puffinus bulleri, 41
 — *carneipes*, 41
 — *griseus*, 41
 — *puffinus*, 40
 — *tenuirostris*, 41
Pyrrhonorax graculus, 310
 — *pyrrhonorax*, 309
Pyrrhula cineracea, 394
 — *griseiventris*, 393
 — *pyrrhula*, 393

R
Rallus aquaticus, 153
Recurvirostra avosetta, 171
Regulus calendula, 364
 — *ignicapillus*, 363
 — *regulus*, 363
Remiz pendulinus, 371
Riparia riparia, 280
Rissa brevirostris, 215
 — *trydactyla*, 214
Rostratula bengalensis, 198

Saxicola caprata, 331
 — *insignis*, 331
 — *rubetra*, 331
 — *torquata*, 331
Scolopax rusticola, 197
Seiurus noveboracensis, 370
Selasphorus rufus, 260
Serinus canaria, 386
 — *pusillus*, 386
 — *serinus*, 385
Sitta canadensis, 378
 — *europaea*, 376
 — *krueperi*, 377
 — *tephronota*, 378
 — *villosa*, 377
Somateria fisheri, 93
 — *mollissima*, 92
 — *spectabilis*, 93
 — *stelleri*, 94
Spizaetus nipalensis, 111
Spizella arborea, 412
 — *passerina*, 412
Stercorarius longicaudatus, 201
 — *parasiticus*, 202
 — *pomarinus*, 202
Sterna albifrons, 217
 — *aleutica*, 217
 — *camchatica*, 217
 — *caspia*, 218
 — *fuscata*, 218
 — *hirundo*, 216
 — *nilotica*, 218
 — *sandvicensis*, 217
 — *paradisaca*, 216
Streptopelia decaocto, 236
 — *orientalis*, 235
 — *senegalensis*, 236
 — *tranquebarica*, 236
 — *turtur*, 235
Strix aluco, 247
 — *nebulosa*, 246
 — *uralensis*, 247
Sturnus cineraceus, 302
 — *philippensis*, 303
 — *roseus*, 302
 — *sinensis*, 303
 — *sturninus*, 303
 — *vulgaris*, 301
Sula bassana, 53
 — *sula*, 53
Surnia ulula, 249
Suthora webbiana, 341
Sylvia althaea, 343
 — *atricapilla*, 343

— borin, 342
 — communis, 343
 — curruca, 343
 — mystacea, 344
 — nana, 345
 — nisoria, 344
Synthliboramphus antiquus, 225
 — wumizusume, 226
Syrnhaptis paradoxus, 237
Tachybaptus ruficollis, 34
Tachycineta bicolor, 279
Tadorna cristata, 81
 — ferruginea, 81
 — tadorna, 81
Terpsiphone atrocaudata, 369
 — paradisi, 369
Tetrao parvirostris, 139
 — urogallus, 138
Tetraogallus altaicus, 145
 — caucasicus, 145
Threskiornis aethiopica, 67
 — melanocephala, 67
Tichodroma muraria, 379
Trenon sieboldii, 234
Tringa brevipes, 189
 — cinereus, 188
 — erythropus, 186
 — flavipes, 187
 — glareola, 185
 — guttifer, 187
 — hypoleucos, 188
 — incana, 189
 — macularia, 188
 — melanoleuca, 188
 — nebularia, 187
 — ochropus, 185
 — stagnatilis, 186
 — totnus, 186
Troglodytes troglodytes, 315
Tryngites subruficollis, 183
Turdus atrogularis, 322
 — cardis, 325
 — chrysolaus, 323
 — eunomus, 321
 — hortulorum, 322
 — iliacus, 320
 — merula, 324

— migratorius, 325
 — naumanni, 321
 — obscurus, 323
 — pallidus, 323
 — philomelos, 320
 — pilaris, 319
 — ruficollis, 322
 — sibiricus, 324
 — torquatus, 324
 — viscivorus, 319
Turnix tanki, 158
Tyto alba, 253

Upupa epops, 266
Uragus sibiricus, 390
Uria aagle, 221
 — lomvia, 221
Urosphena squameiceps, 362

Vanellus cinereus, 163
 — gregarius, 164
 — indicus, 164
 — leucurus, 164
 — spinosus, 164
 — vanellus, 163
Vermivora celata, 371

Wilsonia pusilla, 370

Zonotrichia atricapilla, 412
 — iliaca, 412
 — leucophrys, 412
Zoothera dauma, 326
 — naevia, 326
Zosterops erythropleura, 370
 — japonica, 370

БЁМЕ Рюрик Львович
ДИНЕЦ Владимир Леонидович
ФЛИНТ Владимир Евгеньевич
ЧЕРЕНКОВ Александр Евгеньевич

Птицы. Энциклопедия природы России (Под общей ред. В.Е.Флинта). Издание 2-е, дополненное и переработанное.

Редактор серии
А.А.Минин
Художественное оформление серии
Г.А. Бойко, В.М. Монетов
Научный редактор
Е.В. Ротшильд
Иллюстрации: Ю.В. Костин, С.Ю. Костин
Графика
А.Е. Зубков

Редакторы:
Н.Б.Комарова, Д.Л.Лопатников-Крашенинников, Е.Н.Наумова
Корректор Л.В.Позднякова
Верстка Н.М.Черловой


ISBN 5-87484-045-1

Подписано в печать 16.12.1997 г.
Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Таймс.
Печать высокая. Тираж 10000 экз.
Заказ № 963

Издательство «ABF», 117331, Москва, а/я 143,
тел. 935-26-79, Лицензия ЛР № 062931 от 18.08.93.
Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции
ОК-055-93, том 2. 953000 - книги, брошюры


Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО "Ярославский
полиграфкомбинат", 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Наименование перьев крыла и хвоста птиц



1 - первостепенные маховые перья; 2 - второстепенные маховые перья; 3 - перья крылышка; 4 - верхние кроющие перья крыла; 5 - плечевые перья; 6 - рулевые перья; 7 - верхние кроющие перья хвоста (надхвостье); 8 - нижние кроющие перья хвоста (подхвостье).

Наименование частей тела и оперения птиц



1 - надклювье; 2 - угол рта; 3 - подклювье; 4 - лоб; 5 - темя; 6 - затылок; 7 - затылок; 8 - плечо; 9 - спина; 10 - второстепенные маховые перья; 11 - поясница; 12 - верхние кроющие перья хвоста; 13 - рулевые перья; 14 - первостепенные маховые перья; 15 - подхвостье; 16 - задний палец; 17 - наружный палец; 18 - средний палец; 19 - внутренний палец; 20 - цевка; 21 - голень; 22 - брюшко; 23 - кроющие перья крыла; 24 - грудь; 25 - плечевые перья; 26 - щека; 27 - горло.